

Крок М Лікувальна справа
Дисципліни хірургічного профілю

1

Через падіння з драбини пацієнт отримав черепно-мозкову травму, непритомний, періодично виникає блювання. У неврологічному статусі визначаються менінгеальні симптоми. Як потрібно транспортувати пацієнта:

- A** У горизонтальному положенні на ношах, повернути голову хворого на бік
- B** У положенні сидячи
- C** У горизонтальному положенні лежачи на животі
- D** У горизонтальному положенні на м'якій поверхні, повернути голову хворого на бік
- E** У горизонтальному положенні, фіксувавши кінцівки лонгетами

2

Постраждалому перед транспортуванням до лікарні наклали джгут, але термін накладання закінчився раніше госпіталізації. Що робити з потерпілим?

- A** *Джгут послабити, кровотечу спинити пальцевим притисканням, після відновлення кровообігу в кінцівці знову накласти джгут
- B** Продовжити транспортування з накладеним джгутом
- C** Джгут зняти, накласти давлучу пов'язку
- D** Джгут зняти, ввести кровоспинні засоби
- E** Ввести серцеві і продовжити транспортування

3

Жінка М., 24 років звернулася на ФАП зі скаргами на біль в лівій половині грудної клітки, який виник після травми. Біль посилюється при кашлі, рухах. Під час огляду в ділянці 4 – 5 ребер зліва відмічається гематома, набряк м'яких тканин та відставання грудної клітки в акті дихання. При пальпації в ділянці 4 – 5 ребер різка болючість, відчувається хруст. Визначте діагноз:

- A** *Перелом 4 – 5 ребер
- B** Стиснення грудної клітки
- C** Перелом грудини
- D** Перелом ключиці
- E** Струс грудної клітки

4

Чоловік П., 42 роки звернувся на ФАП зі скаргами на біль, деформацію і порушення функції правої кінцівки після падіння на витягнуту руку. При обстеженні: рука знаходиться у відведеному положенні, пошкоджене плече опущене, хворий тримає руку зігнутою в лікті, передпліччя підтримує здоровою рукою. Під дзьобоподібним відростком пальпується вивихнута голівка. Визначте діагноз:

- A** *Вивих правого плеча
- B** Перелом плечової кістки
- C** Забій плечового суглоба
- D** Розтягнення зв'язок плечового суглоба
- E** Перелом акроміального відростка лопатки

5

Жінка Л., 73 роки звернулася на ФАП зі скаргами на біль в порожнині рота, особливо при прийомі їжі, втрату смаку їжі, неприємний запах з рота. При огляді: гіперемія, набряк слизової оболонки, невеликі кровоточиві виразки з нерівними краями на яснах. Визначте діагноз:

- A** *Стоматит
- B** Гінгівіт
- C** Червоний плоский лишай
- D** Лейкоплакія
- E** Нома

6

Чоловік С., 51 рік звернувся на ФАП зі скаргами на біль в горлі, що посилюється під час ковтання, загальну слабкість, головний біль, високу температуру тіла. При фарингоскопії на гіперемованій і набряклій слизовій оболонці мигдаликів відмічаються жовтувато-білі крапки розміром з голівку шпильки. Визначте діагноз:

- A** *Фолікулярна ангіна
- B** Катаральна ангіна

- C* Лакунарна ангіна
- D* Дифтерія глотки
- E* Виразково-плівчаста ангіна

7

Хвора 40 років звернулась до фельдшера ФАПу зі скаргами на різке почервоніння, закисання правого ока, що з'явилося сьогодні вранці після сну. Об'єктивно: слизова оболонка повік та очного яблука різко гіперемійована, набрякла, багато гнійного виділення. Поставте діагноз.

- A* *Гострий кон'юнктивіт правого ока
- B* Гострий приступ глаукоми
- C* Хронічний дакриоцистит
- D* Герпетичний деревовидний кератит
- E* Міопія середнього ступеню

8

Ви фельдшер швидкої допомоги. Виклик до хворого на рак гортані зі скаргами на затруднене дихання, нестачу повітря. При огляді дихання свистяче, акраціаноз, PS-96 за 1хв. Пацієнт займає вимушене сидяче положення. Ваші дії

- A* *Дати кисень, терміново госпіталізувати
- B* Провести інтубацію трахеї
- C* Ввести роторозширювач
- D* Ввести повітровід
- E* Ввести серцеві препарати

9

До фельдшера здоров пункту звернулася жінка 32 років, зі скаргами на появу бородавчастого утворення на лівій щоці, яке легко травмується і кровоточить. Консультацію якого фахівця потребує хвора ?

- A* *Онколога
- B* Дерматолога
- C* Хірурга
- D* Травматолога
- E* Терапевта

10

У хворого 67 років діагностовано початкова стадія старечої катаракти. Які методи лікування йому рекомендовані:

- A* *Медикаментозне
- B* Хірургічне
- C* Кріодеструкція
- D* Лазеротерапія
- E* Правильної відповіді немає

11

На ФАП з вулиці доставлено чоловіка 45 років без свідомості. При огляді: обличчя в крові, у тим'яній ділянці рана, що кровоточить. При обережній пальпації відчуються краї кісткових відломків. У рані стирчить кістка. Вкажіть попередній діагноз:

- A* *Відкрита черепно-мозкова травма
- B* Закрита черепно-мозкова травма
- C* Перелом основи черепа
- D* Стиснення головного мозку
- E* Забій голови

12

Пацієнтку готують до ургентної операції. За призначенням лікаря Вам необхідно підготувати препарати для премедикації. Який препарат є обов'язковим для її проведення ?

- A* *Атропін
- B* Анальгін
- C* Аміназин
- D* Клофелін
- E* Листенон

13

Чоловік випадково випив 100 мл метилового спирту. Через 2 години відчув нудоту,

головний біль, блимання в очах, наростаючу спрагу. Було блювання. Слизові оболонки гіперемійовані, з ціанотичним відтінком, зіниці розширені. Який антидот Ви застосуєте?

- A** *Етиловий спирт
- B** Вікасол
- C** Магнію оксид
- D** Атропіну сульфат
- E** Унітіол

14

Після купання у ставку у пацієнта з'явилась слезотеча, різі в очах, закисання очей. А вранці не зміг розплющити очі через склеювання вій. Для якого захворювання це характерно?

- A** *Кон'юктивіт
- B** Блефарит
- C** Дакріоцистит
- D** Виразка рогівки
- E** Катаракта

15

До фельдшера звернувся пацієнт зі скаргами на затуманення зору, райдужні кола при погляді на джерело світла, нудоту. Яке обстеження повинен провести фельдшер для встановлення діагнозу?

- A** *Вимірювання внутрішньо очного тиску
- B** Визначення світловідчуття
- C** Дослідження поля зору
- D** Визначення рефракції
- E** Дослідження гостроти зору

16

До вас звернулася хвора зі скаргами на періодичні запаморочення, порушення рівноваги. Ви запідозрили у неї лабіринтит. Лабіринтит – це запалення:

- A** *Внутрішнього вуха
- B** Середнього вуха
- C** Зовнішнього вуха
- D** Соскоподібного відростка
- E** Слухової труби

17

Для якого захворювання характерний симптомокомплекс: біль в оці, світлобоязнь, слезотеча, перикоріальна ін'єкція, наявність інфільтрату на рогівці?

- A** *Кератит
- B** Склерит
- C** Іридоцикліт
- D** Хоріодит
- E** Кон'юктивіт

18

Фельдшер запідозрив у пацієнта двосторонній гайморит. Які допоміжні методи обстеження слід провести для встановлення діагнозу?

- A** *Рентгенографія навколоносових пазух
- B** Флюорографія органів грудної порожнини
- C** Фарингоскопія
- D** Отоскопія
- E** Ларингоскопія

19

Фельдшер ФАПУ надає допомогу при відкритому переломі кісток гомілки з артеріальною кровотечею. Яка послідовність дій?

- A** *Зупинка кровотечі, знеболювання, асептична пов'язка, іммобілізація
- B** Пов'язка, зупинка кровотечі, іммобілізація, знеболювання
- C** Іммобілізація, пов'язка, зупинка кровотечі, знеболювання
- D** Пов'язка, іммобілізація, зупинка кровотечі, знеболювання
- E** Іммобілізація, зупинка кровотечі, пов'язка, знеболювання

20

На медпункт заводу звернувся хворий зі скаргами на безпричинну слабкість, апатію, схуднення, відразу до м'ясної їжі, наявність домішок слизу у калі. На Вашу думку, це:

A *Симптоми «малих ознак» злоякісної пухлини

B Симптоми розпаду пухлини

C Симптоми «плюс тканини»

D Симптоми передракових станів

E Безсимптомний період онкохвороб

21

До Вас на ФАП звернулася пацієнтка 47-ми років зі скаргою на появу втягнутого соска правої молочної залози. Про яку хворобу найімовірніше свідчить даний симптом?

A *Рак молочної залози

B Мастопатія

C Хронічний мастит

D Аденома молочної залози

E Екзема ареоли та соска молочної залози

22

На ФАП звернулася хвора зі скаргою на наявність безболісного шишкоподібного утворення під шкірою передньої поверхні стегна. Який метод обстеження є найбільш інформативний для діагностики цієї патології?

A *Біопсія

B Пальпація

C УЗД

D Комп'ютерна томографія

E Рентгенологічне дослідження

23

До Вас звернувся хворий зі скаргами на сльозотечу. Під час обстеження Ви виявили гіперемію кон'юнктиви, випинання у нижньо - внутрішньому куті орбіти, при натисканні на яке із нижньої слізної крапки виділяється гній. Яка проблема у хворого?

A *Дакріоцистит

B Кератит

C Блефарит

D Дакріаденіт

E Кон'юнктивіт

24

Хворому І – 56р показано провести оперативне втручання на органах черевної порожнини під ендотрахеальним наркозом. Що потрібно приготувати для інкубації трахеї ?

A *Ларингоскоп, ендотрахеальні трубки, електровідсмоктувач

B Шпателі, рото розширювач, зонд Блекмора

C Роторозширювач, розширювач трахеї Труссо, трахеостомічні трубки

D Катетер Фолея, венозний джгут, с-подібний повітропровід

E Корнцанг, затискач Більрота, термометр

25

До Вас звернувся хворий з циркулярною гіпсовою пов'язкою який скаржиться на сильні болі в нозі. При огляді – синюшність, набряк пальців, знижена чутливість пальців. Що Ви повинні зробити як фельдшер ?

A *Розрізати гіпсову лонгету вздовж, розвести краї, фіксувати бинтом, направити до травматолога

B Зняти гіпсову лонгету

C Провести знеболення

D Обробити шкіру пальців йодонатом

E Надати кінцівці підвищене положення

26

Хворий 52-х років скаржиться на сильний пульсуючий біль у правому вусі, який посилюється при жуванні. Об'єктивно: t_0 - 37,1°C, слух у нормі, при натисканні на козлик різко збільшується інтенсивність болю у вусі. Це симптоми:

- A** *Фурункулу зовнішнього слухового проходу
- B** Середнього катарального отиту
- C** Перехондриту вушної раковини
- D** Середнього гнійного отиту
- E** Дифузного гнійного лабіринтиту

27

Ви фельдшер здоровпункту. На здоровпункт звернулася хвора 40 років зі скаргами на наявність ущільнення в лівій молочній залозі. Об-но: В верхньо-зовнішньому квадраті лівій молочної залози пальпується утворення біля

3-х см в діаметрі, не болюча, без чітких контурів, підпахвові лімфовузли не збільшені, шкіра над пухлиною не змінена. Ваша тактика?

- A** * Направити до онколога
- B** Направити в фіз кабінет
- C** Порекомендувати масаж молочної залози
- D** Призначити антибіотики
- E** Накласти зігріваючий компрес

28

Які повинні бути рівні транспортної іммобілізації у потерпілих при переломі плечової кістки?

- A** * Пальці – лопатка здорової сторони
- B** Зап'ястя – лопатка здорової сторони
- C** Кисть - лопатка здорової сторони
- D** Передпліччя – плече здорової сторони
- E** Кисть – плечовий суглоб

29

Ви працюєте на фельдшерсько-акушерському пункті. До Вас звернувся пацієнт зі скаргами. Після обстеження пацієнта Ви встановили діагноз: Закритокутова глаукома. Гострий напад глаукоми. Оберіть групу препаратів, що використовують для лікування закритокутової глаукоми.

- A** * Міотики
- B** Гормональні препарати
- C** Антибіотики
- D** Мідріатики
- E** Вітамінні краплі

30

Ви працюєте фельдшером ФАПу, під час огляду у хворого 55 років з ішемічною хворобою серця раптово розвинулась клінічна смерть. Які ознаки характерні для клінічної смерті?

- A** * Відсутність пульсу, розширення зіниць, припинення дихання
- B** Відсутність пульсу, звуження зіниць
- C** Ослаблене дихання з частотою 5-8 за 1 хв.
- D** Бурхливе дихання з частотою понад 40 за 1 хв.
- E** Рожевий відтінок шкіри

31

Які прилади необхідні для вимірювання внутрішнього тиску на ФАПі при глаукомі?

- A** * Тонometr Маклакова
- B** Офтальмометр
- C** Периметр
- D** Щелева лампа
- E** Гоніоскоп

32

Ви фельдшер швидкої допомоги. У потерпілого в ДТП діагностовано відкритий перелом плеча, ускладнений артеріальною кровотечею. Вкажіть правильний порядок надання невідкладної допомоги ?

- A** * Джгут, знеболити, пов'язка, шина
- B** Джгут, шина, знеболити, пов'язка

- C** Знеболити, пов'язка, джгут, шина
- D** Пов'язка, знеболити, джгут, шина
- E** Шина, знеболити, джгут, пов'язка

33

На Фап звернувся чоловік, який під час бійки отримав перелом нижньої щелепи. Яка найбільш доцільна іммобілізуюча пов'язка в даному випадку?

- A** *"Вузечка"
- B** Бінокулярна
- C** Поворотна
- D** Хрестоподібна
- E** Чеpecь

34

Ви фельдшер швидкої допомоги прибули на виклик. При огляді потерпілого з колотою раною грудної клітки виявлено, що в момент видиху повітря заходить зі свистом у плевральну порожнину, а при вдиху – краї рани злипаються. Яке ускладнення найбільш вірогідне в даному випадку?

- A** * Клапанний пневмоторакс
- B** Відкритий пневмоторакс
- C** Закритий пневмоторакс
- D** Стиснення грудної клітки
- E** Змішаний пневмоторакс

35

Чоловік Д., 48 років, отримав травму грудної клітки. Турбують болі у правій половині грудної клітки, задишка, утруднення дихання. Фельдшер швидкої допомоги діагностував перелом УІ ребра. Як потрібно транспортувати потерпілого?

- A** * В напівсидячому положенні
- B** Лежачи на боці
- C** Лежачи на спині
- D** Лежачи на животі
- E** Сидячи

36

На уроці фізкультури учень 9 класу отримав закритий перелом верхньої третини плечової кістки. Фельдшер швидкої допомоги надає невідкладну допомогу. Який рівень транспортної іммобілізації при транспортуванні?

- A** * Від пальців пошкодженої кисті до лопатки здорової руки
- B** Від променево-зап'ясткового суглоба до плечового суглоба
- C** Від ліктьового суглоба до лопатки здорової руки
- D** Від пальців кисті до лопатки хворої руки
- E** Від пальців пошкодженої кисті до верхньої третини плеча

37

У хворого діагностовано перелом кісток тазу. Назвіть метод транспортування пацієнта?

- A** * У положенні «жаби»
- B** На щиті
- C** Сидячи в кріслі
- D** Лежачи на правому боці
- E** Лежачи на животі

38

Який метод транспортування хворого з підозрою на перелом хребта?

- A** * Лежачи на щиті
- B** Лежачи на правому боці
- C** В положенні «жаби»
- D** Лежачи на лівому боці
- E** Сидячи на кріслі

39

Які гігієнічні засоби порекомендує фельдшер для гігієни порожнини рота у дитини зі здоровими яснами і зубами?

- A** * Дитячі гігієнічні зубні паста
- B** Зубний порошок

C Лікувально-профілактичні зубні пасти
D Лікувально-профілактичні зубні еліксири
E Зубочистки

40

Назвіть ендемічне захворювання, яке характеризується порушенням мінералізації твердих тканин зубів і виникає внаслідок інтоксикації організму іонами фтору (концентрація фтору в питній воді 1,5 мг/л) *A* *Флюороз зубів

B Системна гіоплазія
C Мармурова хвороба
D Стирання зубів
E Гіперплазія емалі.

41

Фельдшер «Швидкої допомоги» прибув на виклик. У потерпілого рвана рана передньої черевної стінки, через яку назовні випали петлі тонкого кишечника та прядка великого сальника. Які дії категорично заборонені при наданні невідкладної допомоги?

A * Вправляти органи що випали
B Накладати асептичну пов'язку
C Проводити протишокову терапію
D Вводити кровозупинні препарати
E Прикладати холод до рани

42

У хворого є відкритий перелом кісток гомілки внаслідок удару переднім бампером легкового автомобілю. Який перелом при цьому найбільш вірогідний?

A * Багатоуламковий
B Вколочений
C Компресійний
D Відривний
E Гвинтоподібний

43

Під час проведення непрямого масажу серця грудина повинна продавлюватись приблизно на:

A *4-6 см
B 0,5-1 см
C 1-2 см
D 2-3 см
E 6-9 см

44

На вулиці під час проведення непрямого масажу серця ви відчули характерний хруст, що свідчить про перелом ребра. Ваші дії:

A * Продовжувати СЛР, правильно розташувавши руки на грудині
B Припинити реанімаційні міроприєємства та застосувати прекардіальний удар
C Константувати біологічну смерть потерпілого
D Перейти до прямого масажу серця
E Продовжувати СЛР, змістивши руки до неушкоджених ребер

45

У потерпілого Л. 29 років була констатована клінічна смерть. М/с проводить серцево-легеневу реанімацію. Що в першу чергу свідчить про ефективність закритого масажусерця?

A * Пульсація на сонній артерії
B Пасивні рухи грудної клітки
C Зниження температури тіла
D Відсутність свідомості
E Розширені зіниці

46

На місці дорожньо-транспортної пригоди виявлено потерпілу без свідомості, без дихання. Пульс і АТ не визначаються, зіниці на світло не реагують. Який термінальний стан у потерпілої?

- A** * Клінічна смерть
- B** Передагональний стан
- C** Агонія
- D** Колапс
- E** Травматичний шок

47

У пацієнта Р, 43 р. Через 20 хвилин після введення 32 ОД інсуліну виникла загальна слабкість, пітливість, тремтіння кінцівок, серцебиття. Це характерно для:

- A** * Стану гіпоглікемії
- B** Печінкової коми
- C** Гіперглікемічної коми
- D** Гіперосмолярної коми
- E** Гіперлактацедемічної коми

48

У хворого після введення пеніциліну через 5 хвилин раптово з'явилися різка слабкість, запаморочення, відчуття страху, ядуха, стиснення в грудній клітці, біль у животі. Стан хворого важкий. Шкіра бліда, волога. Пульс ниткоподібний, гіпотонія. Які першочергові дії фельдшера?

- A** * Місце ін'єкції обколоти 0,1% адреналіну гідрохлориду
- B** Ввести еуфілін
- C** Ввести 20% розчин кофеїну
- D** Покласти грілку
- E** Ввести строфантин

49

Проводячи реанімаційні міроприємства на протязі 5 хв., Ви відмітили звуження зіниць, порожевіння шкірних покривів, відсутність самостійних серцевих скорочень та самостійного дихання. Які ваші подальші дії?

- A** * Продовжувати реанімаційні міроприємства
- B** Припинити реанімацію
- C** Замінити дихання "рот до рота" ручними методами
- D** Припинити штучну вентиляцію легень, продовжити масаж серця
- E** Припинити реанімацію до повторного розширення зіниць

50

У пацієнта якого звільнили після обвалу спостерігається блідість шкірних покривів, ціаноз нігтів пальців ноги, вм'ятини на ділянках найбільшого здавлення, пульсація на нозі різко ослаблена. Вкажіть, що у пацієнта:

- A** * Синдром тривалого здавлювання
- B** Гангрена нижньої кінцівки
- C** Облітеруючий ендартеріт
- D** Облітеруючий атеросклероз
- E** Ниркова недостатність

51

Визначте діагноз хворому 50 років, який скаржиться на поступове зниження гостроти зору правого ока. Півроку тому був на прийомі в окуліста, було призначено закапування вітамінних крапель. Гострота зору ОД =0,1; гострота зору OS=0,8. Під час фокального обстеження під капсулою кришталика видно помутніння сірого кольору, яке сягає центру зіниці.

- A** * катаракта
- B** глаукома
- C** кон'юнктивіт **D** блефарит
- E** дакріоаденіт

52

На ФАП обратилась женщина 45 лет с жалобами на головные боли, туман перед глазами, частая смена очков за последний год, радужные круги при взгляде на источник света. Ваш диагноз?

- A** * Глаукома
- B** Иридоциклит
- C** Склерит

D Дакриоцистит
E Хориоретинит

53

Потерпілий був збитий вантажівкою. Фельдшер ШМД при обстеженні виявив на передній поверхні правого передпліччя глибоку рану, у глибині якої видно уламки обох кісток, сильна артеріальна кровотеча. Фельдшер зупинив кровотечу за допомогою джгута, ввів знеболюючі препарати. Яким буде наступний етап в наданні допомоги:

- A** *накладання асептичної пов'язки
- B** накладання холоду на місце травми
- C** іммобілізація пошкодженої кінцівки
- D** надання зручного положення
- E** транспортування до травматичного відділення

56

Після пожежі в задимленій хаті знайшли жінку без свідомості. Фельдшер ФАП у встановив, що жінка дихає, пульс на сонній артерії визначається, шкірні покриви рожеві, опіки відсутні. Виникла підозра на отруєння чадним газом. При наданні невідкладної допомоги антидотній терапії буде відповідати:

- A** *Проведення оксигенотерапії
- B** Введення серцевих глікозидів
- C** Введення лобеліну
- D** Введення бемегрідю
- E** Промивання шлунку содою

57

У хворого 42 років виявлено поранення черепа вибуханням головного мозку. Волосся навколо поранення обстрижене, шкіра оброблена йодонатом, на вибухання накладена стерильна серветка з ізотонічним розчином натрію хлориду. Що необхідно покласти навколо вибухання, щоб не відбулося здавлення головного мозку?

- A** *Ватно-марлевий бублик
- B** Шину Еланського
- C** Шину Крамера
- D** Шину Бакшеєва
- E** Стерильний ватно-марлевий тампон

58

Фельдшер прибув на місце автокатастрофи. Один з пасажирів у стані клінічної смерті. Є підозра на перелом хребта в шийній ділянці. Що слід робити в цьому випадку для забезпечення прохідності дихальних шляхів?

- A** *Вивести вперед нижню щелепу
- B** Опустити голову потерпілого
- C** Запрокинути голову потерпілого
- D** Повернути голову потерпілого
- E** Підкласти валік під лопатки

59

Фельдшер ШМД застосував джгут для зупинки артеріальної кровотечі. На який час максимально накладається джгут на кінцівку взимку?

- A** * 1 год.
- B** 0,5 год.
- C** 2 год.
- D** 2,5 год.
- E** 3 год.

60

Виклик фельдшера ШМД до потерпілої 35 років, 6 годин тому випила 100 мл столового оцту з суїцидним наміром. Скаржиться на слабкість, спрагу, біль у роті і епігастрії, слинотечу. Слизова оболонка гіперемійована. Перша допомога:

- A** *Промити шлунок холодною водою через зонд
- B** Викликати блювання
- C** Не промивати шлунок
- D** Промити шлунок розчином соди через зонд
- E** Промити шлунок розчином калія