

**Крок М Сестринська справа**  
**Медсестринство в акушерстві**

**1**

При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено: над входом в малий таз визначається округла, помірної щільності балотуюча частина плода. Спинка плода зліва. Якому визначенню за акушерською термінологією відповідають отримані дані акушерського дослідження?

- A** \*І позиція, головне передлежання
- B** II позиція, головне передлежання
- C** I позиція, сідничне передлежання
- D** II позиція, сідничне передлежання
- E** Поперечне положення

**2**

Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під наглядом медичної сестри. Яка тривалість раннього післяпологового періоду?

- A** \*2 години
- B** 3 години
- C** 6 годин
- D** 24 години
- E** 48 годин

**3**

Роділля знаходиться в пологовій залі. Завершився I період пологів. Які ознаки вказують на його завершення?

- A** \*Повне відкриття шийки матки
- B** Народження посліду
- C** Відкриття шийки матки на 3 см
- D** Постійний ниючий біль
- E** Народження плода

**4**

Породілля виписана з пологового будинку. Протягом якого терміну медсестра повинна зробити патронаж?

- A** \*Протягом 3 днів після виписки породіллі із пологового будинку
- B** Протягом 3-х тижнів після виписки породіллі із пологового будинку
- C** Протягом місяця після виписки породіллі із пологового будинку
- D** Протягом 3 місяців після виписки породіллі із пологового будинку
- E** Протягом 14 днів після виписки породіллі із пологового будинку

**5**

Медична сестра визначає достовірні ознаки вагітності. Який метод обстеження вона повинна застосувати?

- A** \*Прийоми Леопольда-Левицького
- B** Призначення сечі на наявність ХГ
- C** Вимірювання обводу живота
- D** Бімануальне обстеження
- E** Огляд шийки матки у дзеркалах

**6**

Вагітна М., 31 року, під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання ОЖ, що

дорівнює 90 см і ВСДМ - 30 см. Яка передбачувана маса плода?

- A** \*2700 г
- B** 3100 г
- C** 3000 г
- D** 2900 г
- E** 2500 г

**7**

Родільця Н., 26 років, поступила у акушерський стаціонар із нормальною пологовою діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку масою - 3200 г. Затискач, накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини, опустився на 10-12 см. Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому випадку?

- A** \*Альфельда
- B** Кюстнера-Чукалова
- C** Шредера
- D** Довженка
- E** Клейна

**8**

У вагітної А., 25 років, серцебиття плода - 130 уд/хв., вислуховується ліворуч нижче пупка і ближче до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції та передлежання плода:

- A** \*І позиція, передній вид, головне передлежання
- B** ІІ позиція, передній вид, головне передлежання
- C** І позиція, задній вид, тазове передлежання
- D** ІІ позиція, задній вид, головне передлежання
- E** І позиція, передній вид, тазове передлежання

**9**

Вагітна Л., 29 років, у терміні вагітності 32 тижні, звернулася до лікаря ж/к зі скаргами на швидку втомлюваність, спрагу. Вага жінки за тиждень збільшилась на 650 грамів. Вкажіть допустиму прибавку ваги за тиждень:

- A** \*350 грамів
- B** 250 грамів
- C** 450 грамів
- D** 550 грамів
- E** 650 грамів

**10**

У післяпологовому відділенні медична сестра здійснює І етап сестринського процесу. Що із нижчепереліченого належить до суб'єктивного обстеження пацієнтки?

- A** \*Бесіда з породіллею
- B** Вимірювання температури
- C** Визначення частоти пульсу
- D** Оцінка характеру лохий
- E** Визначення рівня гемоглобіну в крові

**11**

Вагітна 25 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримали дані: 26-28-31-20. Який таз у жінки?

- A** \*Нормальний
- B** Чоловічий

- C* Плоскорихітичний
- D* Простий плоский
- E* Загальнорівномірнозвужений

**12**

Вагітна 20 років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що спинка плода розташована праворуч. Вкажіть позицію плода:

- A* \*Друга
- B* Перша
- C* П'ята
- D* Четверта
- E* Третя

**13**

У вагітної до початку пологової діяльності відійшли навколоплідні води. Про яке відходження вод йде мова?

- A* \*Передчасне
- B* Ранне
- C* Своєчасне
- D* Запізніле
- E* -

**14**

Вагітна, у терміні 7 тижнів, скарги на блювання 4-6 разів на добу, нудоту, відразу до їжі. Вкажіть пріоритетну проблему у даної пацієнтки:

- A* \*Блювання вагітної
- B* Відраза до продуктів харчування
- C* Порушення засвоєння їжі
- D* Порушення режиму сна
- E* Отруєння

**15**

Пацієнтка 20 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на затримку менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем установлена вагітність 7-8 тижнів.

Назвати документ, який оформляється при взятті на облік по вагітності:

- A* \*Індивідуальна карта вагітної і породіллі
- B* Обмінна карта
- C* Амбулаторна карта
- D* Історія пологів
- E* Контрольна карта диспансерного спостереження

**16**

У пологовий будинок госпіталізовано роділлю, яка народжує вперше у терміні вагітності 38-39 тижнів із кровотечею зі статевих шляхів. При піхвовому дослідженні: шийка матки згладжена, відкрита на один поперечний палець, внутрішнє вічко повністю закрито губчастою тканиною. Яка патологія спостерігається у роділлі?

- A* \*Центральне передлежання плаценти
- B* Бокове передлежання плаценти
- C* Крайове передлежання плаценти
- D* Низьке прикріплення плаценти
- E* Шийна вагітність

**17**

Першороділля 20 років на третій день після термінових пологів скаржиться на підвищення температури до 39°C, озноб, біль унизу живота, гнійно-кров'янисті виділення зі статевих шляхів. Яке ускладнення виникло у породіллі?

- A** \*Післяпологовий ендометрит
- B** Лохіометра
- C** Аднексит
- D** Перитоніт
- E** Післяпологова виразка

**18**

Під час огляду вагітної медична сестра виміряла зовнішні розміри тазу, вони дорівнюють 25-29-30-20. Який висновок відносно тазу зробила медична сестра?

- A** \*Нормальний таз
- B** Простий плоский таз
- C** Плоскорохітичний таз
- D** Загальнозвужений таз
- E** Поперечнозвужений таз

**19**

До пологового будинку госпіталізовано жінку у терміні вагітності 37-38 тижнів. ВСДМ - 40 см. Над входом в малий таз визначається велика частина, що балотує, та багато дрібних частин. Вислуховується чітке серцебиття плода зліва нижче пупка - 136/хв., та праворуч вище пупка - 140/хв. Про що йде мова?

- A** \*Багатоплідна вагітність
- B** Гідроцефалія плода
- C** Гігантський плід
- D** Розгинальне передлежання
- E** Тазове передлежання

**20**

У роділлі відійшли навколоплідні води при розкритті шийки матки на 4 см. Як називають таке відходження навколоплідних вод?

- A** \*Ранне
- B** Вчасне
- C** Передчасне
- D** Запізніле
- E** Високий надрив плодового міхура

**21**

Роділля К., 26 р. Пологи II. III період. Ознак відокремлення посліду немає. Яка тривалість послідового періоду?

- A** 30 хвилин
- B** 15 хвилин
- C** 60 хвилин
- D** 45 хвилин
- E** 40 хвилин

**22**

Медична сестра проводить вимірювання зовнішніх розмірів тазу. Що характерно для загальнонорівномірнозвуженого тазу?

- A** Усі розміри зменшені на однакову величину
- B** Вкорочені прямі розміри тазу
- C** Вкорочені поперечні розміри тазу
- D** Вкорочені усі косі розміри тазу
- E** Зменшення прямого розміру входу в малий таз

**23**

Патронажна медична сестра при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна, “балотуюча”, крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плода:

- A** \*Повздовжнє положення, перша позиція, головне передлежання
- B** Повздовжнє положення, друга позиція, головне передлежання
- C** Повздовжнє положення, перша позиція, тазове передлежання
- D** Поперечне положення, друга позиція
- E** Повздовжнє положення, друга позиція, тазове передлежання

**24**

Під час вимірювання тазу при взятті вагітної на облік медсестрою встановлені наступні розміри: 24-26-28-18 см. Назвіть форму тазу вагітної:

- A** \*Загальнонорівномірнозвужений таз
- B** Поперечнозвужений таз
- C** Косозміщений таз
- D** Плоский таз
- E** Звужений таз

**25**

У породіллі в післяпологовому періоді медична сестра виявила кровотечу зі статевих шляхів. Крововтрата під час пологів склала 450 мл. Розривів м'яких тканин родового каналу немає, послід цілий. Матка періодично скорочується і розслабляється. Кров, що витікає з матки, утворює згортки. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину?

- A** \*Гіпотонічна маткова кровотеча
- B** ДВЗ-синдром
- C** Атонічна кровотеча
- D** Розрив матки
- E** Емболія навколоплідними водами

**26**

Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу - перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності:

- A** \*24 тижні
- B** 20 тижнів
- C** 16 тижнів
- D** 28 тижнів
- E** 32 тижні

**27**

Роділля М., 26 років, I період пологів. Як часто медична сестра визначає параметри пульсу і артеріального тиску у роділлі?

- A** \*Кожні 2 години
- B** Кожні 4 години
- C** Кожні 6 години
- D** Кожну годину
- E** Кожні 30 хвилин

**28**

У пацієнтки діагностували набряки вагітної. Складаючи план сестринського догляду Ви оберете:

- A** \*Щотижневе зважування вагітної
- B** Підрахунок частоти дихання
- C** Підрахунок частоти серцевих скорочень
- D** Вимірювання температури тіла
- E** Визначення внутрішньоутробної маси плода

**29**

На стаціонарному лікуванні знаходиться пацієнтка Г. 35 років, з приводу загрози переривання вагітності у терміні 10 тижнів. В ході планування медсестринського догляду, медична сестра повинна звернути увагу на:

- A** \*Наявність кров'янистих виділень із піхви
- B** Показники температури тіла
- C** Показники артеріального тиску
- D** Частоту серцевих скорочень
- E** Наявність апетиту

**30**

Породіллі проведений курс лікування з приводу післяпологового маститу. При оцінці результатів медсестринських втручань Ви у першу чергу звернули увагу на:

- A** \*Зникнення ущільнення та гіперемії молочних залоз
- B** Нормалізацію лактації
- C** Нормалізацію сну
- D** Покращення апетиту
- E** Покращення самопочуття

**31**

При взятті мазка на визначення ступеню чистоти піхвового вмісту виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слаболужна. Це характерно для:

- A** \*ІІІ ступеню чистоти піхвового вмісту
- B** І ступеню чистоти піхвового вмісту
- C** ІІ ступеню чистоти піхвового вмісту
- D** ІV ступеню чистоти піхвового вмісту
- E** V ступеню чистоти піхвового вмісту

**32**

При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено, що дно матки розташоване на рівні пупка. При одноплідній вагітності це відповідає:

- A** \*24 тижням вагітності
- B** 36 тижням вагітності
- C** 28 тижням вагітності
- D** 32 тижням вагітності

**33**

Медсестра обстежує вагітну жінку в терміні вагітності 36 тижнів. При огляді медсестра звернула увагу, що живіт овоїдної форми, витягнутий в поперечному напрямку.

Серцебиття плода - 140 уд/хв., тони ясні, діяльність ритмічна і вислуховується на рівні пупка праворуч. За допомогою яких прийомів Леопольда-Левицького медсестра може визначити положення та позицію плода?

- A* \*I-го і II-го прийомів Леопольда-Левицького
- B* III-го прийому Леопольда-Левицького
- C* I-го прийому Леопольда-Левицького
- D* III-го і IV-го прийомів Леопольда-Левицького
- E* IV-го прийому Леопольда-Левицького

**34**

В реєстратуру жіночої консультації звернулася вагітна жінка з приводу взяття її на облік з приводу вагітності. Який медичний документ, що забезпечує зв'язок жіночої консультації, пологового будинку і вагітної повинна заповнити медсестра?

- A* \*Індивідуальну карту вагітної і роділля
- B* Контрольну карту диспансерного обліку
- C* Журнал обліку вагітності
- D* Медичну картку амбулаторного хворого
- E* Історію пологів

**35**

Ви медсестра жіночої консультації, у обов'язки якої входить патронаж породіль. Скільки часу триває післяпологовий період?

- A* 6-8 тижнів
- B* 4-5 тижнів
- C* 2-3 тижні
- D* 1 місяць
- E* 1 рік

**36**

Роділля 26 років доставлена у пологове відділення з переймами, які почалися 12 годин тому. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через 12-15 хв. Серцебиття плода - 140 уд/хв., ритмічне. При піхвовому обстеженні: шийка згладжена, розкриття 4 см, плодовий міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Про яке ускладнення пологів йде мова?

- A* \*Первинна слабкість пологової діяльності
- B* Дискоординована пологова діяльність
- C* Надмірно сильна пологова діяльність
- D* Вторинна слабкість пологової діяльності
- E* Загроза розриву матки

**37**

Ви працюєте у приймальному відділенні пологового будинку. Поступає жінка з доношеною вагітністю. Що свідчить про початок пологів?

- A* \*Наявність регулярних перейм
- B* Наявність нерегулярних перейм
- C* Відходження навколоплідних вод

**D** Відходження слизової пробки

**E** Опущення дна матки

**38**

Ви працюєте медичною сестрою в жіночій консультації. Які ознаки відносяться до ймовірних ознак вагітності?

**A** Зміна величини, форми і консистенції матки

**B** Зміна апетиту, смаку, нудота, блювання зранку

**C** Пігментація шкіри на обличчі, навколо сосків, по білій лінії живота

**D** Промацування частин плода

**E** Вислуховування серцебиття плода

**39**

У роділлі III період пологів. Через 10 хвилин дно матки відхилилося у бік правого підребір'я. Вкажіть ознаку відділення плаценти:

**A** \*Шредера

**B** Альфельда

**C** Довженка

**D** Чукалова-Кюстнера

**E** Абуладзе

**40**

У першовагітної жінки 24 років терміном 38-39 тижнів, з'явився переймоподібний біль внизу живота і попереку по 15-20 секунд через 1-2 години. Як оцінити такі симптоми?

**A** \*Прелімінарний період

**B** Перший період пологів

**C** Третій період пологів

**D** Післяпологовий період

**E** Другий період пологів

**41**

Медична сестра при огляді вагітної жінки визначає розташування плода у порожнині матки. Для цього вона застосовує:

**A** \*Прийоми Леопольда

**B** Вимірювання розмірів тазу

**C** Аускультацию плода

**D** Перкусію живота

**E** Вагінальне дослідження

**42**

Породілля, 23 роки, знаходиться у післяпологовому відділенні. Дно матки перебуває на рівні пупка, лохії кров'яністі. Якій добі післяпологового періоду відповідають ці симптоми?

**A** 1-2-й добі

**B** 3-4-й добі

**C** 5-6-й добі

**D** 7-8-й добі

**E** 10-й добі



**43**

У жіночу консультацію звернулась жінка зі скаргами на нагрубання молочних залоз, блювоту вранці, затримку місячних на 2 місяці. Який метод обстеження необхідно застосувати для підтвердження вагітності?

- A** Дворучне піхвове дослідження
- B** Чотири прийоми Леопольда
- C** Визначення ВСДМ
- D** Аналіз крові
- E** Зважування жінки

**44**

Медична сестра амбулаторії сімейної медицини проводить патронаж вагітної у терміні 32 тижні. Вагітна поскаржилась на головний біль, миготіння перед очима. Медична сестра визначила: АТ- 180/110 мм рт.ст., набряки на нижніх кінцівках, передній черевній стінці, обличчі. Для якої патології характерна дана симптоматика?

- A** \*Прееклампсія III ступеню
- B** Прееклампсія II ступеню
- C** Прееклампсія I ступеню
- D** Гіпертензія вагітних
- E** Водянка вагітних