

Крок М. Сестринська справа
Медсестринство в акушерстві

1

При зовнішньому акушерському обстеженні вагітної в терміні 36 тижнів встановлено: над входом в малий таз визначається округла, помірної щільності балотуюча частина плода. Спинка плода зліва. Якому визначенню за акушерською термінологією відповідають отримані дані акушерського дослідження?

- A** * I позиція, головне передлежання
- B** II позиція, головне передлежання
- C** I позиція, сідничне передлежання
- D** II позиція, сідничне передлежання
- E** Поперечне положення

2

Після завершення фізіологічних пологів породілля знаходиться в пологовій залі під наглядом медичної сестри. Яка тривалість раннього післяпологового періоду?

- A** * 2 години
- B** 3 години
- C** 6 годин
- D** 24 години
- E** 48 годин

3

Роділля знаходиться в пологовій залі. Завершився I період пологів. Які ознаки вказують на його завершення?

- A** * Повне відкриття шийки матки
- B** Народження посліду
- C** Відкриття шийки матки на 3 см
- D** Постійний ниючий біль
- E** Народження плода

4

Породілля виписана з пологового будинку. Протягом якого терміну медсестра повинна зробити патронаж?

- A** * Протягом 3 днів після виписки породіллі із пологового будинку
- B** Протягом 3-х тижнів після виписки породіллі із пологового будинку
- C** Протягом місяця після виписки породіллі із пологового будинку
- D** Протягом 3 місяців після виписки породіллі із пологового будинку
- E** Протягом 14 днів після виписки породіллі із пологового будинку

5

Медична сестра визначає достовірні ознаки вагітності. Який метод обстеження вона повинна застосувати?

- A** * Прийоми Леопольда-Левицького
- B** Призначення сечі на наявність ХГ
- C** Вимірювання обводу живота
- D** Бімануальне обстеження
- E** Огляд шийки матки у дзеркалах

6

Вагітна М., 31 року, під час зовнішнього обстеження проведено вимірювання ОЖ, що дорівнює 90 см і ВСДМ-30 см. Яка передбачувана маса плода?

- A** 2700 г
- B** 3100 г
- C** 3000 г
- D** 2900 г
- E** 2500 г

7

Роділля Н., 26 років, поступила у акушерський стаціонар із нормальною пологовою діяльністю і через три години народила живу доношену дівчинку масою 3200 г. Затискач, накладений на материнський відрізок пуповини біля статевої щілини, опустився на 10-12 см. Яка ознака відшарування плаценти є позитивною в цьому випадку?

- A** Альфельда
- B** Кюстнера-Чукалова
- C** Шредера
- D** Довженка
- E** Клейна

8

У вагітної А., 25 років, серцебиття плода 130 уд. /хв. , вислуховується ліворуч нижче пупка і ближче до середньої лінії живота. Визначити позицію, вид позиції та передлежання плода.

- A** I позиція, передній вид, головне передлежання
- B** II позиція, передній вид, головне передлежання
- C** I позиція, задній вид, тазове передлежання
- D** II позиція, задній вид, головне передлежання
- E** I позиція, передній вид, тазове передлежання

9

Вагітна Л., 29 років, у терміні вагітності 32 тижні, звернулась до лікаря ж/к зі скаргами на швидку втомлюваність, спрагу. Вага жінки за тиждень збільшилась на 650 грамів. Вкажіть допустиму прибавку ваги за тиждень.

- A** 350 грамів
- B** 250 грамів
- C** 450 грамів
- D** 550 грамів
- E** 650 грамів

10

У післяпологовому відділенні медична сестра здійснює I етап сестринського процесу.Що із нижчепереліченого належить до суб'єктивного обстеження пацієнтки:

- A** *Бесіда з породіллею
- B** Вимірювання температури
- C** Визначення частоти пульсу
- D** Оцінка характеру лохий
- E** Визначення рівня гемоглобіну в крові

11

Вагітна 25 років звернулася в жіночу консультацію для взяття на облік. При вимірюванні зовнішніх розмірів тазу отримали дані: 26 – 28 – 31 – 20. Який таз у жінки?

- A** * Нормальний
- B** Чоловічий
- C** Плоскорохітичний
- D** Простий плоский
- E** Загальнорівномірнорозвужений

12

Вагітна 20 років. При зовнішньому акушерському обстеженні визначено, що спинка плода розташована праворуч. Вкажіть позицію плоду?

- A** Друга
- B** Перша
- C** П'ята

- D** Четверта
- E** Третя

13

У вагітної до початку пологової діяльності відійшли навколоплідні води. Про яке відходження вод їде мова?

- A** * Передчасне
- B** Ранне
- C** Своєчасне
- D** Запізніле
- E** -

14

Вагітна в терміні 7 тижнів, скарги на блювання 4 – 6 разів на добу, нудоту, відразу до їжі. Вкажіть пріоритетну проблему у даної пацієнтки?

- A** * Блювання вагітної
- B** Відраза до продуктів харчування
- C** Порушення засвоєння їжі
- D** Порушення режиму сна
- E** Отруєння

15

Пацієнтка 20 років звернулася в жіночу консультацію зі скаргами на затримку менструації протягом 2-х місяців, зміни апетиту, нудоту. Лікарем установлена вагітність 7 - 8 тижнів. Назвати документ, який оформляється при взятті на облік по вагітності?

- A** *Індивідуальна карта вагітної і породіллі
- B** Обмінна карта
- C** Амбулаторна карта
- D** Історія пологів
- E** Контрольна карта диспансерного спостереження

16

У пологовий будинок госпіталізовано роділлю, яка народжує вперше у терміні вагітності 38-39 тижнів з кровотечею зі статевих органів. При піхвовому дослідженні: шийка матки згладжена, відкрита на один поперечний палець, внутрішнє вічко повністю закрито губчастою тканиною. Яка патологія спостерігається у роділлі?

- A** *Центральне передлежання плаценти
- B** Бокове передлежання плаценти
- C** Крайове передлежання плаценти
- D** Низьке прикріплення плаценти
- E** Шийна вагітність

17

Першороділля 20 років на третій день після термінових пологів скаржить на підвищення температури до 39°C, озноб, біль внизу живота, гнійно-кров'янисті виділення зі статевих органів. Яке ускладнення виникло у породіллі?

- A** *Післяпологовий ендометрит
- B** Лохіометра
- C** Аднексит
- D** Перитоніт
- E** Післяпологова виразка

18

Під час огляду вагітної медична сестра виміряла зовнішні розміри тазу, вони дорівнюють 25-29-30-20. Який висновок відносно тазу зробила медична сестра?

- A** *Нормальний таз

- B** Простий плоский таз
- C** Плоскорохітичний таз
- D** Загальнозвужений таз
- E** Поперечнозвужений таз

19

До пологового будинку госпіталізовано жінку в строку вагітності 37-38 тижнів. ВСДМ-40 см. Над входом в малий таз визначається велика частина, що балотує, та багато дрібних частин. Вислуховується чітке серцебиття плода зліва нижче пупка 136 за 1 хв., та праворуч вище пупка 140 за 1 хв.

Про що йде мова?

- A** *Багатоплідна вагітність
- B** Гідроцефалія плода
- C** Гігантський плід
- D** Розгинальне передлежання
- E** Тазове передлежання

20

У пологовий будинок поступила роділля. Пологи II, термінові. Розміри тазу 23-26-28-17 см. Пологова діяльність почалась 8 годин тому. Роділля неспокійна. Перейми часті, болючі. Матка у вигляді "піщаного годинника". Ознака Вастена позитивна. Яке ускладнення виникло у роділлі?

- A** *Загроза розриву матки
- B** Розрив матки, що розпочався
- C** Розрив матки, що відбувається
- D** Тетанус матки
- E** Звуження тазу III ступеню

21

У роділлі відійшли навколоплідні води при розкритті шийки матки на 4 см. Як називають таке відходження навколоплідних вод?

- A** *Ранне
- B** Вчасне
- C** Передчасне
- D** Запізніле
- E** Високий надрив плодового міхура

22

Роділля К., 26 р. Пологи II. III період. Ознак відокремлення посліду немає. Яка тривалість послідового періоду?

- A** 30 хвилин
- B** 15 хвилин
- C** 60 хвилин
- D** 45 хвилин
- E** 40 хвилин

23

Медична сестра проводить вимірювання зовнішніх розмірів тазу. Що характерно для загальнорівномірнорозвуженого тазу?

- A** Всі розміри зменшені на однакову величину
- B** Вкорочені прямі розміри тазу
- C** Вкорочені поперечні розміри тазу
- D** Вкорочені усі косі розміри тазу
- E** Зменшення прямого розміру входу в малий таз

24

Патронажна медична сестра при обстеженні вагітної встановила, що спинка плода розташована з лівого боку матки, над входом в малий таз пальпується щільна, "балотуюча", крупна частина плода. Визначте положення, позицію та передлежання плода.

- A** *Повздожнє положення, перша позиція, головне передлежання.
- B** Повздожнє положення, друга позиція, головне передлежання.
- C** Повздожнє положення, перша позиція, тазове передлежання.
- D** Поперечне положення, друга позиція.
- E** Повздожнє положення, друга позиція, тазове передлежання.

25

У породіллі в післяпологовому періоді медична сестра виявила кровотечу зі статевих шляхів. Крововтрата під час пологів склала 450мл. Розривів м'яких тканин родового каналу немає, послід цілий. Матка періодично скорочується і розслабляється. Кров, що витікає з матки, утворює згортки. Яка найбільш вірогідна патологія, що зумовлює таку картину?

- A** *Гіпотонічна маткова кровотеча.
- B** ДВЗ-синдром.
- C** Атонічна кровотеча.
- D** Розрив матки.
- E** Емболія навколоплідними водами.

26

Першовагітна прийшла на черговий прийом у жіночу консультацію. Із анамнезу – перші рухи плода відчула 4 тижні тому. Дно матки на рівні пупка. Визначте термін вагітності:

- A** *24 тижні
- B** 20 тижнів
- C** 16 тижнів
- D** 28 тижнів
- E** 32 тижні

27

Роділля М., 26 років, I період пологів. Як часто медична сестра визначає параметри пульсу і артеріального тиску у роділлі?

- A** *Кожні 2 години
- B** Кожні 4 години
- C** Кожні 6 години
- D** Кожну годину
- E** Кожні 30 хвилин

28

У пацієнтки діагностували набряки вагітної. Складаючи план сестринського догляду Ви оберете:

- A** *Щотижневе зважування вагітної
- B** Підрахунок частоти дихання
- C** Підрахунок частоти серцевих скорочень
- D** Вимірювання температури тіла
- E** Визначення внутрішньоутробної маси плода

29

На стаціонарному лікуванні знаходиться пацієнтка Г. 35 років, з приводу загрози переривання вагітності у терміні 10 тижнів. В ході планування медсестринського догляду, медична сестра повинна звернути увагу на:

- A** *Наявність кров'янистих виділень із піхви
- B** Показники температури тіла

- C* Показники артеріального тиску
- D* Частоту серцевих скорочень
- E* Наявність апетиту

30

Породіллі проведений курс лікування з приводу післяпологового маститу. При оцінці результатів медсестринських втручань Ви в першу чергу звернули увагу на :

- A* *Зникнення ущільнення та гіперемії молочних залоз
- B* Нормалізацію лактації
- C* Нормалізацію сну
- D* Покращення апетиту
- E* Покращення самопочуття

31

При взятті мазка на визначення ступеню чистоти піхвового вмісту виявлено: паличок Додерлейна мало, багато лейкоцитів, переважно кокова флора, реакція вмісту піхви слаболужна. Це характерно для:

- A* *III ступеню чистоти піхвового вмісту
- B* I ступеню чистоти піхвового вмісту
- C* II ступеню чистоти піхвового вмісту
- D* IV ступеню чистоти піхвового вмісту
- E* V ступеню чистоти піхвового вмісту

32

При обстеженні вагітної прийомами зовнішнього акушерського дослідження визначено, що дно матки розташоване на рівні пупка. При одноплідній вагітності це відповідає :

- A* *24 тижням вагітності
- B* 36 тижням вагітності
- C* 28 тижням вагітності
- D* 32 тижням вагітності
- E* 40 тижням вагітності

33

Під час зовнішнього акушерського дослідження вагітної виявлено: положення плода повздовжнє, перша позиція, передній вид, головне передлежання, Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода.

- A* * Нижче пупка ліворуч
- B* Вище пупка праворуч
- C* Нижче пупка праворуч
- D* Вище пупка ліворуч
- E* На рівні пупка

34

У пацієнтки 28 років під час профілактичного огляду було виявлено гіперемію в ділянці зовнішнього вічка шийки матки. Подальша тактика медичної сестри:

- A* *направити до лікаря гінеколога
- B* призначити спринцювання
- C* призначити піхвові ванночки
- D* призначити заспокійливі
- E* зробити посів піхвових виділень

35

Роділля поступає в пологовий будинок. Для визначення очікуваної маси плода медсестра вимірює обвід живота. На якому рівні слід розмістити сантиметрову стрічку?

- A* *На рівні пупка
- B* Посередині між пупком і мечоподібним відростком

- C* На три поперечні пальці нижче пупка
- D* На два поперечні пальці вище пупка
- E* На рівні висоти стояння дна матки

36

Роділля ,34 років, доставлена машиною швидкої допомоги в пологовий будинок. Пологи в строк. За яким показником медична сестра оцінить початок пологової діяльності?

- A* *За частотою та тривалістю перейм
- B* За станом роділлі
- C* За станом плода
- D* За часом вилиття навколоплодових вод
- E* За станом плодового міхура

37

Другий період пологів. Голівка плода прорізується. Яке залежне сестринське втручання потрібно виконати з метою профілактики кровотечі в III періоді пологів?

- A* *Ввести метилергометрин
- B* Ввести вікасол
- C* Ввести дицинон
- D* Ввести маммофізин
- E* Ввести анальгін

38

У породіллі на третю добу післяпологового періоду з'явилися скарги на болі в молочних залозах. Молочні залози значно та рівномірно збільшені, нагрубіші, болючі при пальпації, при натисканні з сосків виділяються крапельки молока. Яке медсестринське втручання потрібно виконати в першу чергу?

- A* *Спорожнити молочні залози шляхом зціджування
- B* Обмежити пиття
- C* Імобілізувати молочні залози
- D* Компрес на молочні залози
- E* Ввести знеболюючий препарат

39

Медсестра готує вагітну до УЗД. Що доцільно провести для реалізації плану медсестринського втручання?

- A* *Провести роз'яснення в плані підготовки
- B* Виміряти АТ, Рс
- C* Обмеження гострої їжі
- D* Обмеження вживання рідини
- E* Провести бесіду з родичами

40

У післяпологовому відділенні медсестра проводить бесіду з породіллею. На які проблеми породіллі треба звернути увагу?

- A* *Скарги породіллі з боку статевих органів та молочних залоз
- B* Скарги породіллі на підвищену пітливість
- C* Скарги породіллі на підсилення апетиту
- D* Скарги породіллі на сонливість
- E* Скарги породіллі на відчуття спраги

41

Першороділля 23-х років народила живого доношеного хлопчика вагою 3200 г. Через 30 хвилин після народження дитини ознаки відокремлення плаценти позитивні, крововтрата 110 мл. Які наступні дії при веденні пологів у даної жінки?

- A* *Запропонувати роділлі потужитись

- B** Ввести в/в 1 мл окситоцину
- C** Застосувати зовнішній прийом по Креде-Лазаревічу
- D** Застосувати зовнішній прийом по Гентеру
- E** Провести ручне виділення посліду

42

У вагітної 35 років, в терміні вагітності 20 тижнів було зафіксовано патологічну прибавку у вазі. Яке обстеження необхідно провести для виявлення прихованих набряків при підозрі прегестозу?

- A** *Проба Мак-Клюра-Олдріча
- B** Вимірювання артеріального тиску на обох руках
- C** Визначення білку в сечі
- D** Визначення сечовини та креатиніну
- E** УЗД

43

Ви проводите заняття в жіночій консультації з питань статевого здоров'я. Обговорюючи фази нормального менструального циклу, ви повідомите про зміни, що відбуваються в яєчниках під час овуляції, а саме:

- A** *Розрив фолікула і вихід яйцеклітини
- B** Утворення жовтого тіла менструації
- C** Продукування прогестерону
- D** Утворення жовтого тіла вагітності
- E** Створення умов для імплантації

44

Під час обстеження вагітної в терміні 36 тижнів Ви з'ясували, що поздовжня вісь плоду утворює з поздовжньою віссю матки прямий кут. Про яке положення плода іде мова?

- A** *Поперечне
- B** Косе
- C** Поздовжнє
- D** Лобне
- E** Тазове

45

Ви проводите зовнішнє акушерське дослідження за допомогою прийомів Леопольда-Левицького. Дно матки знаходиться посередині між лоном і пупком. Визначте термін вагітності.

- A** *16 тижнів
- B** 12 тижнів
- C** 20 тижнів
- D** 30 тижнів
- E** 36 тижнів

46

Ви медична сестра ЖК, приймаєте участь в організації занять з безпечного материнства та батьківства, та інформуєте слухачів про періоди пологів. Які періоди пологів ви знаєте?

- A** *Розкриття, зганяння, послідовий
- B** Прелімінарний, розкриття, послідовий
- C** Прелімінарний, зганяння, послідовий
- D** Провісники, розкриття, зганяння
- E** Розкриття, зганяння, післяпологовий

47

При обстеженні жінки з терміном 24 тижні була запідозрена багатоплідна вагітність. Який метод обстеження підтвердить багатопліддя?

- A** * вислуховування серцебиття плода в двох пунктах
- B** вимірювання ОЖ і ВДМ
- C** вимірювання пульсу і АТ жінки
- D** вислуховування серцебиття в одному пункті
- E** вимірювання розмірів тазу

48

Породілля 25 років перебуває у індивідуальній пологовій палаті. Друга доба післяпологового періоду. Які показники будуть засвідчувати про фізіологічний перебіг цього періоду?

- A** * АТ – 120/75 мм.рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,7°C, дно матки на рівні пупка, щільної консистенції, лохії кров'янисті
- B** АТ - 100/60 мм рт.ст., пульс – 80 уд./хв., t – 37,8°C, дно матки на рівні пупка, щільної консистенції, лохії кров'янисто-слизові
- C** АТ – 110/60 мм.рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки вище пупка, розм'якшена, лохії кров'янисті
- D** АТ – 125/85 мм.рт.ст., пульс – 70 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки нижче пупка, лохії слизові
- E** АТ – 120/75 мм.рт.ст., пульс – 64 уд./хв., t – 36,6°C, дно матки за лоном, лохії кров'янисті

49

Медсестра обстежує вагітну жінку в терміні вагітності 36 тижнів. При огляді медсестра звернула увагу, що живіт овоїдної форми, витягнутий в поперечному напрямку. Серцебиття плода – 140 уд./хв., тони ясні, діяльність ритмічна і вислуховується на рівні пупка справа. За допомогою яких прийомів Леопольда-Левицького медсестра може визначити положення та позицію плода?

- A** * I-го і II-го прийомів Леопольда-Левицького
- B** III-го прийому Леопольда-Левицького
- C** I-го прийому Леопольда-Левицького
- D** III-го і IV-го прийомів Леопольда-Левицького
- E** IV-го прийому Леопольда-Левицького

50

В регістратуру жіночої консультації звернулася вагітна жінка з приводу взяття її на облік з приводу вагітності. Який медичний документ, що забезпечує зв'язок жіночої консультації, пологового будинку і вагітної повинна заповнити медсестра?

- A** * індивідуальну карту вагітної і роділлі
- B** контрольну карту диспансерного обліку
- C** журнал обліку вагітності
- D** медичну картку амбулаторного хворого
- E** історію пологів

51

В ранньому післяпологовому періоді за призначенням лікаря медсестра внутрішньом'язово ввела породіллі 1мл (5 ОД) окситоцину. Що буде критерієм оцінки результатів медсестринського втручання?

- A** * підвищення тону мати
- B** підвищення артеріального тиску
- C** зниження тону мати
- D** прискорення пульсу
- E** зниження артеріального тиску

52

Ви медсестра жіночої консультації, у обов'язки якої входить патронаж породіль. Скільки часу триває післяпологовий період ?

- A** 6-8 тижнів
- B** 4-5 тижнів
- C** 2-3 тижні
- D** 1 місяць
- E** 1 рік

53

Роділля 26 років доставлена у пологове відділення з переймами, які почалися 12 годин тому. Перейми слабкі, короткотривалі, повторюються через 12-15 хв. Серцебиття плода 140 уд./хв., ритмічне. При піхвовому обстеженні: шийка згладжена, розкриття 4 см, плодовий міхур цілий, голівка плода притиснута до входу в малий таз. Про яке ускладнення пологів йде мова?

- A** *первинна слабкість пологової діяльності
- B** дискоординована пологова діяльність
- C** надмірно сильна пологова діяльність
- D** вторинна слабкість пологової діяльності
- E** загроза розриву матки

54

Ви працюєте у приймальному відділенні пологового будинку. Поступає жінка з доношеною вагітністю. Що свідчить про початок пологів?

- A** *Наявність регулярних перейм
- B** Наявність нерегулярних перейм
- C** Відходження навколоплідних вод
- D** Відходження слизової пробки
- E** Опущення дна матки

55

Ви працюєте медичною сестрою в жіночій консультації. Які ознаки відносяться до ймовірних ознак вагітності?

- A** зміна величини, форми і консистенції матки
- B** зміна апетиту, смаку, нудота, блювання зранку
- C** пігментація шкіри на обличчі, навколо сосків, по білій лінії живота
- D** промацування частин плода
- E** вислуховування серцебиття плода

56

У породіллі 20 років щойно народилась доношена дитина чоловічої статі. Необхідно провести профілактику офтальмії. Назвіть препарат за допомогою якого здійснюють таку профілактику?

- A** 1% тетрациклінова мазь
- B** Пеніцилін.
- C** Преднізолон.
- D** Фурацилін.
- E** 2% олійний розчин хлорофіліпту

57

У роділлі III період пологів. Через 10 хвилин дно матки відхилилося у бік правого підребір'я. Вкажіть ознаку відділення плаценти.

- A** *Шредера
- B** Альфельда
- C** Довженка
- D** Чукалова-Кюстнера
- E** Абуладзе

58

У першовагітної жінки 24 років терміном 38 – 39 тижнів, з'явився переймоподібний біль внизу живота і попереку по 15-20 секунд через 1-2 години. Як оцінити такі симптоми?

- A** *Прелімінарний період
- B** Перший період пологів
- C** Третій період пологів
- D** Післяпологовий період
- E** Другий період пологів

59

У роділлі К, 25 р. при піхвовому обстеженні шийка матки згладжена, розкриття 4 см; плодовий міхур відсутній, передлегла частина сідниці. Вкажіть період пологів.

- A** * I період пологів
- B** II період пологів
- C** Провісники пологів
- D** III період пологів
- E** Післяпологовий період

60

На прийом у жіночу консультацію звернулася жінка зі скаргами на поганий апетит, нудоту, припинення менструації протягом 2 місяців. Який метод дослідження необхідно провести для виявлення вагітності?

- A** *Огляд в дзеркалах на гінекологічному кріслі
- B** Вимірювання розмірів тазу
- C** Вимірювання висоти стояння дна матки
- D** Вимірювання окружності живота
- E** Вимірювання індексу Соловйова

61

Медична сестра при огляді вагітної жінки визначає розташування плода у порожнині матки. Для цього вона застосовує

- A** *Прийоми Леопольда
- B** Вимірювання розмірів тазу
- C** Аускультацию плода
- D** Перкусію живота
- E** Вагінальне дослідження

62

Вагітна цікавиться у медичної сестри про термін пологів, якщо перший день останньої менструації був 10.05. Медична сестра визначила очікувану дату пологів:

- A** 17.02
- B** 10.03
- C** 29.03
- D** 20.04
- E** 27.05

63

Породілля, 23 роки, знаходиться у післяпологовому відділенні. Дно матки перебуває на рівні пупка, лохії кров'яністі. Якій добі післяпологового періоду відповідають ці симптоми?

- A** 1-2-й добі
- B** 3-4-й добі
- C** 5-6-й добі
- D** 7-8-й добі
- E** 10-й добі

64

У пологовий будинок доставлено першороділлю 23 років у тяжкому непритомному стані. Зі слів чоловіка, у дружини з'явилися: головний біль, біль у надчеревній ділянці, було блювання, потім почався судомний напад з втратою свідомості. При госпіталізації: свідомість відсутня, обличчя одутле, бліде, повіки набряклі, АТ – 160/100 мм рт. ст. Яка дійсна проблема пацієнтки?

- A** *Судомний напад
- B** Біль голови
- C** Блювання
- D** Одутле обличчя
- E** Гіпертензія

65

Після народження дитини необхідно провести профілактику офтальмії. Який препарат повинна підготувати медсестра ?

- A** *Мазь тетрациклінову
- B** Розчин фурацилліну
- C** Розчин йодонату
- D** Розчин сульфацилу натрію
- E** Мазь ністатиніву

66

У жіночу консультацію на облік поставлена пацієнтка зі строком вагітності 6-7 тижнів . Скарги на нудоту . Про що в першу чергу необхідно провести бесіду з пацієнткою ?

- A** *Про раціональне харчування
- B** Про гігієну зовнішніх статевих органів
- C** Про догляд за молочними залозами
- D** Про необхідність відвідування жіночої консультації
- E** Про необхідність обстеження

67

Визначити, яке положення плоду, якщо голівка біля дна матки:

- A** *Повздожне
- B** Сіднічне
- C** Потиличне
- D** Тазове
- E** Поперечне

68

Серцебиття плоду прослуховується нижче пупка праворуч, яка позиція плода?

- A** *Друга позиція
- B** Перша позиція
- C** Повздожна позиція
- D** Поперечна позиція
- E** Задня позиція

69

Третім прийомом Леопольда можна визначити:

- A** Передлежання плоду
- B** Вид позиції плоду
- C** Позицію плоду
- D** Багатоплідну вагітність
- E** Очікувану масу плоду

70

На скільки см вважається розкриття шийки матки повним:

- A** *10-12 см.
- B** 8-9см
- C** 9-10 см.
- D** 13-14 см
- E** 15 см

71

У вагітної при зовнішньому обстеженні прийомами Леопольда встановлено: праворуч - пальпується щільна, гладенька широка поверхня, зліва - мілкі виступи, над входом в таз - щільна балотуюча велика частина плода. Вкажіть положення, позицію та передлежання плода.

- A** *Повздовжнє, друга, головне
- B** Повздовжнє, друга, сідничне
- C** Повздовжнє, перша, сідничне
- D** Повздовжнє, перша, головне
- E** Косе, друга позиція

72

У передпологовій палаті знаходиться першороділля, 22 р., з нормальною пологовою діяльністю. Стан роділлі і плода задовільний. Положення плода повздовжнє.

Передлежить голівка, притиснута до входу в малий таз. Спинка розташована до лівого боку матки. Вкажіть найкраще місце вислуховування серцебиття плода.

- A** *Нижче пупка ліворуч.
- B** Вище пупка праворуч.
- C** Вище пупка ліворуч.
- D** Нижче пупка праворуч.
- E** На рівні пупка.