

**Крок М. Сестринська справа**  
**Медсестринство в інших дисциплінах хірургічного профілю**

1

До очного центру звернувся пацієнт з травмою лівого ока. Лікар встановив діагноз - Проникаюче поранення лівого ока. Яку пов'язку накладе медична сестра?

- A** \* Асептичну біокулярну
- B** Асептичну монокулярну
- C** Колову
- D** Монокулярну лейкопластирну
- E** Косинкову

2

До травм пункту звернувся пацієнт, у якого різана рана гомілки. Після проведення ПХО рани лікар призначив щеплення проти правцю. Яку потенційну проблему попередив лікар?

- A** \*Захворювання на правець
- B** Виникнення сепсису
- C** Захворювання на сказ
- D** Виникнення тромбозу
- E** Захворювання на бешиху

3

Пацієнтка звернулася до мамолога зі скаргами на наявність новоутворення в молочній залозі. Який метод з перелічених встановлює діагноз злоякісної пухлини?

- A** \*Цитологічне дослідження
- B** Ендоскопічне обстеження
- C** Ехографія
- D** Комп'ютерна томографія
- E** Лабораторні дослідження

4

У пацієнта 50 років лімфогранулематоз. Проходить курс хіміотерапії. Скаржитися медичній сестрі на безсоння, головний біль, нудоту, блювання. Яка її тактика в даній ситуації?

- A** \*Повідомити лікаря
- B** Дати протиблювотне
- C** Запропонувати снодійне
- D** Порекомендувати дотримуватися дієти
- E** Застосувати знеболювальне

5

Пацієнт 63 років викликав швидку допомогу у зв'язку зі скаргами на сильний різкий біль у поперековій ділянці справа з іррадіацією в зовнішні статеві органи, часте болісне сечовиділення. З анамнезу: хворіє на нирковокам'яну хворобу. Яке незалежно сестринське втручання виконає медсестра?

- A** \* Тепла грілка на поперекову ділянку
- B** Зігрівальний компрес
- C** Банки
- D** Міхур з льодом
- E** Гірчичники

6

Пацієнт 70 років звернувся до лікаря зі скаргами на часте сечовиділення вночі, часті термінові позиви, утруднення при сечовиділенні. Після обстеження лікар встановив діагноз: "Аденома передміхурової залози II-A". Яка пріоритетна потенційна проблема може виникнути у пацієнта?

- A** \* Гостра затримка сечі

- B** Нетримання сечі
- C** Зміна кольору сечі
- D** Розлади діурезу
- E** Хронічна ниркова недостатність

7

У пацієнта рак легень. Раптово під час кашлю з'явилося кровохаркання. Яке незалежне втручання виконає медична сестра?

- A** \*Покласти міхур з льодом на грудну клітку
- B** Покласти гірчичники на грудну клітку
- C** Поставити банки
- D** Зробити масаж грудної клітки
- E** Зігріваючий компрес

8

Медична сестра супроводжує пацієнта на рентгенологічне дослідження шлунку. Діагностовано – рак. Пацієнт запитує про результати дослідження. Що відповість пацієнту медична сестра?

- A** \*Порадить звернутися до лікаря
- B** Скаже справжній діагноз
- C** Промовчить
- D** Заспокоїть хворого
- E** Скаже неправдивий діагноз

9

Хворий у коматозному стані, дихає через трахеостому. Чергова медсестра реанімаційного відділення помітила, що дихання в нього стало частішим, з'явився ціаноз шкіри. Яке незалежне втручання може виконати медична сестра?

- A** \*Перевірити прохідність трахеостомічної трубки
- B** Ввести спазмолітики
- C** Попередити западання язика
- D** Ввести серцеві засоби
- E** Налagodити інгаляцію зволоженого кисню

10

Назвіть основний клінічний симптом пухлин м'яких тканин.

- A** \* „Плюс – тканини”
- B** Больовий
- C** Загальних ознак
- D** Інтотоксикації
- E** Анемічний

11

Яка проблема може виникнути при видаленні сірчаної пробки із зовнішнього слухового ходу методом промивання?

- A** \*Втрата рівноваги
- B** Отогенний сепсис
- C** Отогенний менінгіт
- D** Абсцес мозку та мозочка
- E** Синустромбоз

12

У хворої 42 років виставлено діагноз: рак молочної залози III стадії. Який основний метод лікування?

- A** \*Комплексний
- B** Хірургічний

- C* Хіміотерапія
- D* Гормонотерапія
- E* Променевий

13

Медичній сестрі очного відділення хворий скаржиться на біль та відчуття стороннього тіла у оці, спостерігається закисання очей. Яку хворобу можливо запідозрити?

- A* \*Кон'юнктивіт
- B* Кератит
- C* Блефарит
- D* Ірит
- E* Катаракту

14

До медичної сестри хірургічного кабінету звернулась сусідка зі скаргами на локальний біль в ділянці шлунка. З часом біль став інтенсивним. Медична сестра, при проведенні сестринського обстеження хворої, виявила додаткові скарги на нудоту, зниження апетиту та схуднення. Що порекомендує медична сестра пацієнтці?

- A* \*Негайно звернутися до онколога або хірурга.
- B* Вживати знеболюючі засоби.
- C* Вживати таблетки церукалу.
- D* Дотримуватися дієти.
- E* Пройти ультразвукове обстеження шлунка.

15

В гастроентерологічне відділення поступив хворий зі скаргами на слабкість, нездужання, підвищення температури тіла до 37,6 С, печію в епігастрії, відразу до м'ясної їжі. За останні пів року схуд на 8 кг. Про яке захворювання подумає медична сестра?

- A* \*Рак шлунку
- B* Хронічний гастрит
- C* Виразкова хвороба шлунку
- D* Хронічний езофагіт
- E* Хронічний панкреатит

16

Чоловік звернувся до лікувального закладу зі скаргами на болючу припухлість верхньої повіки лівого ока. Об-но: на обмежаній ділянці краю верхньої повіки, припухлість, яка має жовтуватий колір, на вершині пуста, по периферії гіперемія, набряк. Який найбільш ймовірний діагноз?

- A* \*Ячмінь
- B* Халязіон
- C* Абсцес
- D* Флегмона
- E* Алергічний набряк

17

Яке можливе ускладнення при варикозному розширенні вен:

- A* \*трофічна виразка
- B* правець
- C* кардіогенний шок
- D* печінкова колька
- E* парези

18

Визначення меж поля зору проводять за допомогою:

- A* \*Периметра

- B** ТонOMETра Маклакова
- C** Офтальмоскопа
- D** Таблиці Головіна-Сівцева
- E** Щілинної лампи

19

Після введення анестетика в перидуральний простір пацієнту надають положення:

- A** \*З піднятим головним кінцем
- B** Горизонтальне
- C** З опущеним головним кінцем
- D** На спині
- E** На животі

20

Пальцеве дослідження носоглотки проводиться для діагностики:

- A** \*Аденоїдів
- B** Гострого тонзиліту
- C** Гострого фарингіту
- D** Гострого гаймориту
- E** Хронічного тонзиліту

21

У хворого 45 років після потрапляння води у вухо раптово погіршився слух, з'явився шум у вусі, відчуття розпирання, аутофонія. Назвіть пріоритетну проблему пацієнта?

- A** \*Сірчана пробка
- B** Гострий отит зовнішнього вуха
- C** Стороннє тіло зовнішнього слухового ходу
- D** Гострий середній катаральний отит
- E** Гострий середній гнійний отит

22

У пацієнтки 17 років родинка в області гомілки темного кольору, після травматизації почала збільшуватись, мокнути, інколи кровоточити. Больових відчуттів немає. Що Ви порекомендуєте пацієнтці?

- A** \*Звернутись до онколога
- B** Змазувати 1\% розчином йодонату
- C** Звернутись до хірурга
- D** Робити пов'язки з левосином
- E** Звернутись до дерматолога

23

Пацієнт 73 років знаходиться на лікуванні в урологічному відділенні. Самостійно рухається, здійснює самогляд, але не може мочитися. Сечовипускання здійснюється через постійний катетер. Яку фізіологічну проблему на II етапі медсестринського процесу повинна виявити медсестра у пацієнта?

- A** \*Ризик розвитку інфекції сечових шляхів
- B** Неможливість самостійно рухатися
- C** Неадекватна рухова активність
- D** Страх перед нетриманням сечі
- E** Ризик утворення пролежнів шкіри

24

Ви медична сестра урологічного відділення. Лікарем призначено провести промивання сечового міхура. Який антисептичний розчин необхідно підготувати?

- A** \*Розчин фурациліну 1:5000
- B** 0,9\% розчин хлориду натрію

- C* 3\% розчин перекису водню
- D* 0,9\% розчин хлориду натрію
- E* 0,9\% розчин натрію гідрокарбонату

25

Серцево-легеневу реанімацію застосовують при термінальних станах, вкажіть один з них:

- A* \*Клінічна смерть
- B* Агонія
- C* Предагонія
- D* Післяопераційний період
- E* „Соціальна смерть”

26

Ускладнення виразкової хвороби шлунку, що потребує негайної операції:

- A* \*Перфорація виразки
- B* Субкомпенсований стеноз
- C* Некомпенсований стеноз
- D* Пенетрація виразки
- E* Шлунково-кишкова кровотеча

27

В анамнезі рана в ділянці стопи. Рана загоїлася, через деякий час у хворого виникло посмикування жувальних м'язів, судоми всього тіла, „сардонічна посмішка”, опістотонус. Що з хворим?

- A* \*Правець
- B* Інфікована рана
- C* Сказ
- D* Газова гангрена
- E* Гнилісна інфекція

28

В офтальмологічне відділення поступає пацієнт з ознаками гострого приступу глаукоми.

Медсестра повинна виконати наступні лікарські призначення

- A* \*Закапувати 1\% пілокарпін кожні 15 хвилин впродовж години
- B* Закапати 1\% атропін, 0,25\% скополамін, 1\% гоматропін
- C* Закапати 30\% сульфацил натрію, 0,25\% левоміцетин
- D* Закласти за повіку тетрациклінову або левоміцетинову мазь
- E* Закапати дексаметазон, дексазон або гідрокортизон

29

На прийомі в офтальмолога пацієнт з ознаками лусочкового блефариту. Реалізуючи IV етап медсестринського процесу медсестра повинна

- A* \*Обробити краї повік діамантовим зеленим
- B* Обробити краї повік розчином дімедролу
- C* Обробити краї повік розчином анальгіну
- D* Обробити краї повік розчином дексаметазону
- E* Обробити краї повік розчином атропіну

30

На прийомі в офтальмолога пацієнт з діагнозом зріла катаракта. При цьому медсестра встановлює наступний медсестринський діагноз

- A* Зниження гостроти зору
- B* Випадіння з поля зору
- C* Гнійні виділення з ока
- D* Біль ока, голови

## **E** Звуження поля зору

31

Пацієнт, який впродовж 5 років працює на пилюрамі, звернувся зі скаргами на зниження слуху, шум у вусі. Медсестра повинна підготувати пацієнта до:

- A** \*аудіометрії
- B** отоскопії
- C** діафаноскопії
- D** рентгенографії вуха
- E** вестибулометрії

32

Жінку доставлено у відділення реанімації з ознаками отруєння чадним газом. Пацієнтку терміново готують до проведення:

- A** \*Гіпербаричної оксигенації
- B** Ентеросорбції
- C** Форсованого діурезу
- D** Гемосорбції
- E** Плазмаферезу

33

Після випадкового вживання невідомої рідини пацієнт скаржиться на біль в животі та гомілкових м'язах, порушення зору, блювання. Артеріальний тиск знижений, розвивається гіпертонус м'язів. Такі симптоми характерні для отруєння:

- A** \*Метанолом
- B** Етанолом
- C** Опіатами
- D** Фосфорорганічними сполуками
- E** Ацетатною кислотою

34

До лікаря звернулася пацієнтка зі скаргами на виділення крові із соска при натисканні на праву молочну залозу. До якого обстеження з метою уточнення діагнозу медична сестра підготує пацієнтку

- A** \*Мамографії
- B** Томографії
- C** Сцинтиграфії
- D** Ангіографії
- E** Сонографії

35

Ефективність зовнішнього масажу серця по пульсу на сонній артерії потрібно перевіряти кожних:

- A** 2 хв
- B** 3 хв
- C** 5 хв
- D** 8 хв
- E** 10 хв

36

Невідкладна допомога при нирковій колиці.

- A** \*Введення баралгіну
- B** Холод на попереk
- C** Назначення діуретиків
- D** Введення натрію хлориду
- E** Введення глюкозидів

37

Найбільш інформативний метод діагностики виразкової хвороби шлунка.

- A** \*Фіброгастроскопія
- B** Рентгеноскопія
- C** Лапароскопія
- D** УЗД
- E** Сканування

38

Збільшення діастази сечі характерно для:

- A** \*гострого панкреатиту
- B** гострого апендициту
- C** защемленої грижі
- D** проривної виразці шлунку
- E** для інвагінації

39

У ЛОР-відділення поступив хворий з переломом кісток носа, носовою кровотечею. Які інструменти необхідно підготувати медичній сестрі?

- A** \* Носове дзеркало, носові елеватори
- B** Кровозупинні затискачі, скальпель
- C** Пінцет, кровозупинні затискачі
- D** Шпатель, кровозупинні затискачі
- E** Корнцанг, роторозширювач

40

При гострій затримці сечі в післяопераційному періоді використовують:

- A** \*катетеризацію сечового міхура
- B** холод на лоно
- C** внутрішньовенно глюкозу
- D** внутрішньовенно натрію хлорид 10\%
- E** внутрішньовенно еуфілін

41

Вкажіть співвідношення ШВЛ до закритого масажу серця при проведенні серцево-легеневої реанімації одним реаніматором.

- A** 2 :15
- B** 2 :12
- C** 1: 5
- D** 1:10
- E** 2 :10

42

Можливі ускладнення при тромбофлебіті нижніх кінцівок.

- A** \*Тромбоемболія.
- B** Бешиха.
- C** Слоновість.
- D** Остеомієліт.
- E** Періостит.

43

Симптом "переміжної кульгавості" характерний для захворювання:

- A** \*Облітеруючий ендартеріт
- B** Флеботромбоз.

- C* Флебит.
- D* Ревматоїдний артрит.
- E* Тромбофлебіт

44

Перша допомога при відкритому пневмотораксі:

- A* \*Накладання оклюзійної пов'язки
- B* Дренаж по Суботіну.
- C* Протикашлеві препарати.
- D* Плевральна пункція
- E* Введення наркотиків.

45

До передракових захворювань прямої кишки відноситься:

- A* \*Поліпоз прямої кишки.
- B* Парапроктит.
- C* Хронічний коліт.
- D* Сигмоїдит.
- E* Випадіння прямої кишки

46

Що характерне для перфоративної виразки 12-палої кишки?

- A* \*Раптовий "кинджальний біль".
- B* Оперізуючий біль.
- C* Симптом Пастернацького.
- D* Блювання "кавовою гущею".
- E* Метеоризм.

47

Лікворея виникає при:

- A* \*Переломі основи черепа.
- B* Забої головного мозку.
- C* Пораненні склепіння черепа.
- D* Струсі головного мозку.
- E* Здавленні головного мозку.

48

Хворий скаржиться на біль в оці і відповідній половині голови, значне зниження зору, нудоту, блювання. Внутрішньоочний тиск 60 мм рт ст. Відображена картина дозволяє запідозрити:

- A* \* Гострий напад глаукоми
- B* Гострий іридоцикліт
- C* Повзучу виразку рогівки
- D* Метагерпетичний кератит
- E* Кератокон'юнктивіт

49

Хворий знаходиться на диспансерному обліку з приводу глаукоми. Яким методом можна визначити рівень внутрішньоочного тиску?

- A* \*Тонометрії
- B* Візометрії
- C* Периметрії
- D* Кампіметрії
- E* Офтальмоскопії



50

У хворого проникаюче поранення ока. Профілактику якого захворювання Вам необхідно провести?

- A** \* Правця
- B** Чуми
- C** Бешихи
- D** Сифілісу
- E** Токсоплазмозу

51

В комбустіологічне відділення привезли пацієнта з опіком IV ступеня. Виберіть ознаку, яка характеризує цей ступінь:

- A** \* Обвуглення
- B** Еритема шкіри
- C** Некроз епідермісу
- D** Некроз дерми
- E** Наявність пухирів

52

Медична сестра поставила діагноз "синдром гострого живота". Яке захворювання може бути у пацієнта:

- A** \* Перфоративна виразка шлунку
- B** Гастрит
- C** Ниркова колька
- D** Апендикулярний інфільтрат
- E** Гострий коліт.

53

У пацієнта відкритий перелом, який супроводжується артеріальною кровотечею. Що медична сестра спочатку застосує:

- A** \* Кровозупинний джгут Есмарха
- B** Асептичну пов'язку
- C** Транспортну іммобілізацію
- D** Кровозупинні засоби
- E** Знеболюючі

54

У хворого перелом ключиці без зміщення відламків. Яку пов'язку повина накласти медична сестра в даному випадку:

- A** \* Дезо
- B** Колосоподібну
- C** Поворотну
- D** Спиральну
- E** Черепащачу

55

У хворого розтягнення зв'язок гомілково-ступневого суглоба. Яку пов'язку застосує медична сестра в даному випадку:

- A** \* Хрестоподібну
- B** Черепащачу
- C** Зворотню
- D** Повзучу
- E** Колосовидну.

56

Медичні сестри при масивних переливаннях крові проводять профілактику цитратного шоку пацієнтам. Що вони при цьому застосовують:

- A** \* Розчин хлористого кальцію
- B** Нітрогліцерин
- C** Новокаїн
- D** Антибіотики
- E** Поліглюкін

57

Медична сестра спостерігає за вимірюванням центрального венозного тиску у хворого. Вкажіть нормальні показники цього дослідження:

- A** \*30-60 мм вод. ст.
- B** 100-120 мм вод. ст.
- C** 10-20 мм вод. ст.
- D** 0-10 мм вод. ст.
- E** 200-220 мм вод. ст.

58

Медичній сестрі необхідно відібрати апарат для вимірювання центрального венозного тиску. Вкажіть його назву:

- A** \*Апарат Вальдмана
- B** Апарат Амбу
- C** Апарат Ілізарова
- D** Аппарат РДА-1
- E** Апарат Ціто

59

В онкологічному відділенні була прооперована пацієнтка 40 р. з приводу фіброаденоми лівої молочної залози. У бесіді з постовою медсестрою пацієнтка задала питання стосовно діагнозу. Які дії медсестри?

- A** \*Порадити звернутися до лікаря
- B** Розповісти про доброякісні пухлини
- C** Розповісти родичам про хід операції
- D** Дати прочитати відповідну літературу
- E** Порадити з'ясувати про хід операції в операційної медсестри