

Крок М Лікувальна справа

Невідкладні стани в педіатрії

1

Після ін'єкції інсуліну у дівчинки 12 років змінився стан, шкіра бліда, вкрита холодним липким потом, раптово почались судоми. Надайте невідкладну допомогу:

- A** *Розчин глюкози 20% - 20 мл в/венно струминно
- B** Ізотонічний розчин натрію хлориду 100 мл краплинно внутрішньовенно
- C** Інсулін 15-20 ОД підшкірно
- D** В/в краплинно 4% розчин бікарбонату натрію 100 мл
- E** Преднізолон в/венно

2

Підберіть препарат, який входить до складу невідкладної допомоги при судомах на тлі спазмофілії:

- A** *Глюконат кальцію
- B** Відехол
- C** Анальгін
- D** Ергокальціферол
- E** Еуфілін

3

Дитину, 2 років, за праву долоню вкусила комаха. На місці укусу з'явилося почервоніння, поширився набряк тканин. Температура тіла підвищилася до 38°C. Такий стан діагностують у разі:

- A** *Набряку Квінке
- B** Кропив'янки
- C** Анафілактичного шоку
- D** Сінної лихоманки
- E** Молочного струпу

4

Фельдшер прибув до дитини 12 років, у якої після ін'єкції інсуліну почалися судоми. При огляді: дитина непритомна, шкіра бліда, волога, спостерігається ригідність м'язів. Підберіть препарат для надання допомоги:

- A** *Сібазон
- B** Інсулін
- C** Еуфілін
- D** Кофеїн
- E** Ефедрин

5

До фельдшера ФАПУ звернулися батьки з дитиною 5 років, яка скаржиться на головний біль, виражену загальну слабкість. Об'єктивно: слизисті виділення з носа, гіперемія кон'юнктиви та шкірних покривів, температура 39°C. Для зниження температури тіла з фізичних методів необхідно застосувати:

- A** *Прохолодна клізма
- B** Тепла грілка
- C** Гаряче пиття
- D** Лужна інгаляція
- E** Оксигенотерапія

6

Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до дитини 5 місяців, яка хворіє на кашлюк. Під час приступу кашлю виник ціаноз обличчя, наступила зупинка дихання. Скільки вдихів на хвилину необхідно провести при виконанні штучного дихання?

- A** *25
- B** 100
- C** 15
- D** 80
- E** 10

7

Фельдшера ФАПУ викликали до хлопчика, який хворіє цукровим діабетом. При огляді: свідомість відсутня, шкірні покриви бліді, вологі, спостерігається тризм жувальних м'язів, судом, зіниці розширені. Якому стану відповідають дані клінічні симптоми?

- A** *Гіпоглікемічна кома
- B** Непритомність
- C** Анафілактичний шок
- D** Гіперглікемічна кома
- E** Колапс

8

Фельдшер ФАПУ з дозволу лікаря проводив щеплення вакциною АКДП в/м. Після ін'єкції стан дитини раптово погіршився шкіра бліда, пульс слабкий, АТ знижений. Дитина знепритомніла. Якому невідкладному стану відповідає дана симптоматика?

- A** *Анафілактичному шоку
- B** Ларингоспазму
- C** Колапсу
- D** Непритомності
- E** Серцевій астмі

9

Фельдшер прибув на виклик до хлопчика, який отримує інсулін. Скарги на запаморочення сонливість. При огляді шкіра суха, гіпотонус м'язів, запах ацетону з рота, пульс слабкий. Підберіть препарат для надання невідкладної допомоги:

- A** *Інсулін
- B** Кофеїн
- C** Седуксен
- D** Глюкоза
- E** Адреналін

10

До фельдшера ФАПУ звернувся хлопчик 12 років, який порізав палець склом. Під час перев'язки, побачивши кров, зблід і раптово втратив свідомість. Який стан виник у дитини?

- A** *Непритомність
- B** Геморагічний шок
- C** Гостра серцева недостатність
- D** Колапс
- E** Гостра дихальна недостатність

11

Які пероральні засоби для зниження температури тіла є препаратами вибору для дітей?

- A** *Парацетамол, ібупрофен
- B** Аспірин
- C** Анальгін
- D** Сібазон
- E** Ацелізін

12

У дитини 5 років, яка хворіє ГРВІ раптово вночі з'явився сухий кашель, інспіраторна задишка, захрип голос. Яке ускладнення можна запідозрити?

- A** *Гострий стенозуючий ларинготрахеїт
- B** Гострий обструктивний бронхіт
- C** Справжній круп
- D** Бронхіальна астма
- E** Епіглотид

13

Які основні принципи надання невідкладної допомоги при стенозі гортані I ступеня?

- A** *Відволікаюча терапія, парові інгаляції
- B** Гормональна терапія
- C** Штучна вентиляція легень
- D** Трахеотомія
- E** Інкубація трахей

14

До фельдшера ФАПУ звернулися з дитиною 7 років, яку під час прогулянки укусила оса. При огляді у ділянці правого плеча спостерігається біль, гіперемія, набряк. Які дії фельдшер повинен провести першочергово?

- A** *Обробити місце укусу спиртом, прикласти холод
- B** Видалити пінцетом жало
- C** Дати кисень
- D** Ввести 2 мл 0,5% розчину новокаїну у місце укусу
- E** Ввести 0,5 мл 0,5% розчину строфантину в/в

15

Фельдшер ФАПУ дитині 3 років зробив ін'єкцію цефазоліну в/м. Стан дитини різко погіршився, з'явилось відчуття жару, на шкірі тулуба поширився алергійний висип, знизився АТ, дитина втратила свідомість. Визначте діагноз.

- A** *Анафілактичний шок
- B** Поліморфна еритема
- C** Кропив'янка
- D** Ангіоневротичний набряк
- E** Атопічний дерматит

16

Фельдшера ШМД викликали до дитини 2 років, яка скаржиться на головний біль, виражену загальну слабкість. При огляді: слизові виділення з носу, гіперемія шкіри і кон'юнктив очей, температура тіла 39,5°C. З яких дій фельдшер повинен розпочати надавати допомогу?

- A** *Роздягнути дитину і розтерти шкіру напівспиртовим розчином
- B** Зігріти дитину грілками
- C** Ввести дитині підшкірно розчин кордіаміну
- D** Ввести дитині преднізолон
- E** Ввести дитині розчин папаверину

17

Фельдшера ШМД викликали до дитини 12 років, яка знепритомніла під час написання контрольної роботи. Які першочергові дії фельдшера?

- A** *Надати дитині горизонтальне положення, піднявши нижні кінцівки під кутом 30°- 45°
- B** Положити дитину набік
- C** Посадити дитину з трохи нахиленою вперед головою
- D** Надати дитині напівсидяче положення

E Надати дитині горизонтальне положення з опущеними кінцівками

18

Виклик фельдшера ФАПу до дитини 1 року, яка хворіє на парагрип. Вночі стан дитини погіршився: з'явилась задишка, шумне дихання з участю допоміжної мускулатури у акті дихання, "гавкаючий" кашель, охриплий голос. Чим ускладнився парагрип?

- A** *Стенозуючим ларинготрахеїтом
- B** Ларингоспазмом
- C** Вогнищевою пневмонією
- D** Серцевою недостатністю
- E** Нападом бронхіальної астми

19

Виклик фельдшера ШМД до дитини 7 років, у якої розвинувся стан непритомності після фізичного навантаження на уроці фізкультури. Вчитель поклав дитину у горизонтальне положення, підняв кінцівки, розстебнув одяг. Визначте подальші дії фельдшера:

- A** *Ввести п/ш розчин кордіаміну
- B** Надати дитині підвищене положення
- C** Положити дитину набік
- D** Ввести в/м 50% розчин анальгін
- E** Протерти шкіру розчином оцту

20

До фельдшера ШМД звернулись батьки дитини 2-х років в зв'язку з тим, що дитину вкусила комаха за праву долоню. На місці укусу з'явилося почервоніння, поширився набряк тканин. Температура тіла підвищилась до 38°C. Такий стан діагностують у разі:

- A** *Набряку Квінке
- B** Анафілактичного шоку
- C** Кропив'янки
- D** Сінної гарячки
- E** Молочного струпу

21

У хлопчика 5 років через 10 хв. після укусу бджоли з'явилися неспокій, гіперемія та зуд шкіри обличчя, нудота, свистяче дихання, ринорея, потім втрата свідомості, блідість, пітливість. Ви встановили діагноз: анафілактичний шок. Визначить препарат, який слід ввести дитині у разі анафілактичного шоку.

- A** *Преднізолон
- B** Анальгін
- C** Еуфілін
- D** Коргліконт
- E** Фуросемід

22

Мати 7-річного хлопчика викликала ШМД. Скарги на різке погіршення стану дитини. При огляді дитина збуджена, вимушене положення сидючи, експіраторна задишка, в кінці нападу відходження скловидного харкотиння. Вкажіть діагноз.

- A** *Бронхіальна астма
- B** Пневмонія
- C** Стенозуючий ларингіт
- D** Гострий бронхіт
- E** Кашлюк

23

Дитина 5 років отруїлась невідомою речовиною. Фельдшер ШМД для негайного промивання шлунку використає воду, одноразова кількість якої складає:

- A** *300-350 мл
- B** 100-110 мл
- C** 150-180 мл
- D** 200-250 мл
- E** 40-50 мл

24

Фельдшер ШМД приїхав на виклик до дівчинки 10 років, яка хворіє на цукровий діабет. Через порушення дієти її стан погіршився: шкіра бліда, суха, запах ацетону з рота, гіпотонус м'язів, дихання глибоке, "шумне", пульс частий, артеріальний тиск низький. Визначне стан.

- A** *Гіперглікемічна кома
- B** Гіпоглікемічна кома
- C** Печінкова кома
- D** Іремична кома
- E** Ацетонемічна кома

25

Фельдшер діагностував у дитини клінічну смерть. Які заходи він повинен провести в першу чергу при первинній серцево-легеневій реанімації?

- A** *Відновити прохідність дихальних шляхів
- B** Провести непрямий масаж серця
- C** Ввести медикаменти
- D** Провести дефібриляцію
- E** Провести ШВЛ

26

Дитина віком 1 року проковтнула декілька невідомих таблеток. Лікар призначив провести промивання шлунку. Скільки рідини одночасно Ви повині ввести?

- A** *150-200 мл
- B** 40-50 мл
- C** 60-90 мл
- D** 300-350 мл
- E** 450-500 мл

27

В оздоровчому таборі діти з молодшого загону під час прогулянки знайшли гриби та з'їли їх. Які заходи треба провести першочергово в цьому випадку?

- A** *Промити шлунок 10% розчином натрію хлориду
- B** Ввести обволікальні препарати – вазелінову олію
- C** Ввести ентеросорбенти – активоване вугілля
- D** Провести очисну клізму
- E** Виміряти температуру тіла

28

У дитини 7-ми місяців раптово почалися судоми. Лікується в інфекційній лікарні з діагнозом: менінгококова інфекція. Які першочергові дії при наданні невідкладної допомоги?

- A** *Провести профілактику западання язика
- B** Подразнювати корінь язика
- C** Зігріти дитину грілками
- D** Повісити міхур з льодом до голови
- E** Провести ШВЛ, закритий масаж серця

29

У дитини 3-х років діагностовано діабетичну кому. Із якого способу введення інсуліну розпочнеться невідкладна допомога при даній комі в стаціонарі?

- A** *Внутрішньовенно струминно
- B** Внутрішньовенно краплинно
- C** Внутрішньом'язово
- D** Підшкірно
- E** Внутрішньошкірно

30

У 9-річної дитини, хворої на цукровий діабет відсутня свідомість, наявний загальний тремор, підвищення м'язового тонуусу, блідість на вологість шкіри. Що можна запідозрити?

- A** *Гіпоглікемічну кому
- B** Печінкову кому
- C** Ниркову кому
- D** Гіперглікемічну кому
- E** Мозкову кому

31

У дитини при різкому зниженні температури тіла виникла слабкість, блідість шкіри, кінцівки стали холодні, шкіра вкрилась холодним липким потом. Дитина втратила свідомість, артеріальний тиск різко знизився. Який препарат слід ввести першочергово.

- A** *0,1% р-н адреналіну гідрохлориду
- B** 0,5% р-н седуксену
- C** Інсулін
- D** 40% глюкозу
- E** 1% р-н димедролу

32

У дитини на тлі менінгококового менінгіту розвинулись судоми. Якої невідкладної допомоги потребує дитина?

- A** *Забезпечити прохідність дихальних шляхів і ввести 0,5% р-н седуксену
- B** Покласти дитину на живіт та ввести 50% р-н анальгін
- C** Провести відволікаючу терапію
- D** Провести трахеотомію
- E** Ввести дитині літичну суміш

33

Ви надаєте допомогу ВІЛ-інфікованій дитині. Які критичні ситуації створюють найбільший ризик передачі ВІЛ-інфекції?

- A** *Зупинка дихання та проведення штучного дихання рот до рота
- B** ЕКГ контроль порушення серцевого ритму
- C** Зупинка дихання та проведення ШВЛ за допомогою мішка та маски
- D** Проведення непрямого масажу серця
- E** Пальпація живота

34

5-місячна дитина хворіє на кашлюк. Під час нападу кашлю виник ціаноз шкіри, слизових оболонок, наступила зупинка дихання. Якої допомоги потребує дитина?

- A** *Подразнити корінь язика, при неефективності - ШВЛ
- B** Провести лужні інгаляції
- C** Відволікаюча терапія
- D** Інтубація трахеї
- E** Відсмоктати слиз з верхніх дихальних шляхів

35

При огляді дитини 4 років Ви констатували біологічну смерть. Серед перерахованих ознак виберіть основні діагностичні критерії біологічної смерті:

- A** *Симптом “котячого ока”
- B** Зміна кольору шкіри
- C** Симптом білої плями
- D** Симптом джгута
- E** Наявність дихання при відсутності серцевої діяльності

36

Дитині 7 місяців встановлено діагноз ГРВІ, гіпертермічний синдром. Температура тіла 39,4°C, шкіра бліда, мармурова, кінцівки холодні на дотик. Який препарат ввести дитині для зменшення спазму судин?

- A** *Папаверину гідрохлорид
- B** Седуксен
- C** Супрастин
- D** Магнію сульфат
- E** Кальцію глюконат

37

У дитини 3 міс. після введення вакцини “Пентаксим” виник анафілактичний шок. Який лікарський препарат потрібно ввести негайно?

- A** *0,1% розчин адреналіну
- B** 1% розчин лазиксу
- C** 0,06% розчин корглікону
- D** 2% розчин еуфіліну
- E** 0,5% розчин седуксену

38

Новонародженій дитині проводять непрямий масаж серця. На скільки сантиметрів углуб слід натискати на грудину?

- A** *1-1,5
- B** 0,5-0,8
- C** 2-3
- D** 3-4
- E** 4-5

39

Дитина 11 років страждає на цукровий діабет. На уроці під час проведення контрольної роботи з'явилася слабкість, запаморочення, дитина вкрилась холодним потом, зблідла. Який стан розвинувся у дитини?

- A** *Гіпоглікемічна кома
- B** Гіперглікемічна кома
- C** Ацетонемічний синдром
- D** Колапс
- E** Непритомність

40

У дитини 12 років напад бронхіальної астми легкого ступеня. Інгаляцію якого дозованого аерозолю повинен використати фельдшер?

- A** *Сальбутамол
- B** Інгаліпт
- C** Орасепт
- D** Каметон
- E** Хлорофіліпт

41

Назвіть препарат, який призначають дітям для покращення скоротливості здатності міокарда при гострій лівошлуночкової недостатності.

- A** *Строфантин
- B** Лазикс
- C** Преднізолон
- D** Аміназин
- E** Кальцію хлорид

42

У дитини 1,5 років, яка хворіє на аденовірусну інфекцію температура тіла 39°C. З'явився напад тоніко – клонічних судом. З якого препарату потрібно почати надання невідкладної допомоги?

- A** *Сібазону
- B** Аналгіну
- C** Дімедролу
- D** Но-шпи
- E** Корглікону

43

Дитина, 8 міс., перебуває на штучному вигодовуванні. Після крику виникла зупинка дихання, ціаноз, екзофтальм, дитина вкрилася липким потом, напад закінчився глибоким шумним вдихом. Об'єктивно: шкіра бліда, виражені лобні горби, зубів немає, на ребрах чотки, О-подібне викривлення кінцівок. Яку невідкладну допомогу необхідно надати дитині?

- A** *Винести на свіже повітря, подразнити корінь язика.
- B** Преднізолон 1 мг на 1 кг маси внутрішньом'язево
- C** Вітамін Д по 2000МО внутрішньо
- D** Анальгін 0,1 внутрішньом'язево
- E** Димедрол 0,1 внутрішньом'язево

44

При проведенні закритого масажу серця дитині грудного віку розміщення пальців фельдшера на ділянці надавлювання повинно бути наступним:

- A** *Вказівним і середнім пальцями нижче на 1 см від місця перетину міжсосковою лінією груднини
- B** Великим пальцем вище мечоподібного паростка на 2 см
- C** Обома руками, складеними навхрест, на рівні середньої третини груднини
- D** Однією рукою вище від мечоподібного паростка на 3 см
- E** Великими пальцями обох рук вище від соскової лінії на 3 см

45

Ви фельдшер швидкої допомоги. Виклик до дитини 2,5 років, яка отруїлася невідомими ягодами. Необхідно промити шлунок. Яку одноразову кількість води необхідно вводити у шлунок під час промивання?

- A** *200-250 мл
- B** 90-100 мл
- C** 110-120 мл
- D** 300-350 мл
- E** 400-450мл

46

Ви фельдшер ШМД. У дитини віком 2 років, яка хворіє на вогнищеву пневмонію $t = 39,5^{\circ}\text{C}$. Який жарознижувальний препарат і в якій дозі слід ввести?

- A** *50% розчин анальгіну; 0,2 мл
- B** 0,5% розчин седуксену; 1 мл
- C** 2,0% розчин еуфіліну; 1 мл
- D** 2% розчин папаверину гідрохлориду; 0,2 мл
- E** 50% розчин анальгіну; 0,1 мл

47

Ви фельдшер ШМД на виклику у дитини 10 років з діагнозом ГРВІ, гіпертермічний синдром. Було введено літичну суміш. Через 40 хв. дитина різко встала з ліжка і впала. Об'єктивно: $t^{\circ} - 35,2^{\circ}\text{C}$, шкіра бліда, вкрита холодним липким потом, тахікардія, АТ – 70/40 мм рт.ст. Оцінити стан дитини та ефективність проведеного догляду.

- A** *Гостра судинна недостатність, колапс; порушення ліжкового режиму
- B** Гостра судинна недостатність, зомління; відсутність фізичних методів охолодження
- C** Анафілактичний шок; швидке введення препаратів
- D** Медикаментозне отруєння; порушення ліжкового режиму
- E** Гіпоглікемічна кома; порушення дієти

48

Ви фельдшер ШМД. У дитини 5 місячного віку з внутрішньочерепною пологовою травмою в анамнезі, раптово виник напад судом. Який препарат необхідно ввести?

- A** *Сибазон
- B** Парацетамол
- C** Анальгін
- D** Димедрол
- E** Кальцію хлорид

49

Ви фельдшер ШМД. Виклик до дитини 5 років. Під час прийому їжі у дитини раптово виник кашель, стридорозне дихання, потяг до блювання, ціаноз. Який найбільш імовірний діагноз?

- A** *Аспірація стороннього тіла
- B** Гостра пневмонія
- C** Коклюш
- D** Гострий ларинготрахеїт
- E** Бронхоектатична хвороба

50

Виклик до дитини 5 років, яка хворіє цукровим діабетом. Після ін'єкції інсуліну появились скарги на млявість, тремтіння кінцівок, головокружіння, підвищений апетит. При огляді: шкіра волога, бліда. Які ваші дії є першочерговими?

- A** *Дати випити теплий солодкий чай
- B** Ввести внутрішньовенно струминно глюкозу
- C** Застосувати аскорбінову кислоту, кокарбоксілазу
- D** Застосувати глюкагон 0,5% 1 мл
- E** Ввести внутрішньом'язево лазикс 1% 2,5 мг на 1 кг маси тіла

51

Ви фельдшер швидкої допомоги. Проводите реанімаційні заходи дитині 5 років у стані клінічної смерті після ураження електричним струмом. З чого необхідно розпочати реанімаційні заходи?

- A** *Відновити прохідність дихальних шляхів
- B** Проводити непрямий масаж серця
- C** Вводити знеболювальні препарати
- D** Проводити оксигенотерапію
- E** Проводити ШВЛ

52

До фельдшера ФАПу звернулась мати з дівчинкою 7 років. Дитину вкусила оса в ділянку щоки. Об'єктивно: шкіра щоки гіперемійована, спостерігається набряк обличчя і шиї. Діагностуйте даний стан.

- A** *Набряк Квінке
- B** Кропивниця
- C** Пруриго
- D** Поліморфна еритема
- E** Себорея

53

Вас, фельдшера швидкої допомоги. Викликали до дівчинки 5 років з харчовим отруєнням грибами. Скарги на головний біль, нудоту, блювання, біль у животі. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, тони серця приглушені, $t^{\circ} - 39^{\circ}\text{C}$. Живіт м'який, болючий в епігастральній ділянці. Які дії фельдшера мають бути першочерговими при наданні невідкладної допомоги?

- A** *Промити шлунок, дати активоване вугілля, госпіталізація
- B** Дати тепле пиття, на живіт покласти грілку
- C** Ввести спазмолітики, поставити очисну клізму
- D** Ввести знеболювальні засоби
- E** Ввести жарознижувальні засоби

54

Ви фельдшер ФАП. Виклик до дитини 8 місяців. Зі слів мами дитина раптово втратила свідомість, наступила зупинка дихання, дитина посиніла, через 1 хв. з'явився гучний вдих, схожий на півнячий крик. З анамнезу: дитина з 1 місяця на штучному вигодовуванні. Голову тримає з 3-х місяців, зубів не має, самотійно не сидить. Вкажіть ймовірний діагноз.

- A** *Гіпокальціємічний синдром, ларингоспазм
- B** Стенозуючий ларинготрахеїт
- C** Гіпокальціємічний синдром, карпопедальний спазм
- D** Напад бронхіальної астми
- E** Гіпокальціємічний синдром, еклампсія

55

Ви приїхали на виклик до дитини 14 років, яка скаржиться на слабкість, млявість, нудоту, блювання, біль в епігастральній ділянці. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові оболонки бліді, тахікардія. Блювотні маси темно-коричневого кольору (у вигляді "кавової гущі") з рештками їжі. Які невідкладні дії фельдшера в даній ситуації?

- A** *Негайна госпіталізація, холод на живіт
- B** Заспокоїти дитину, направити до педіатра
- C** Провести переливання однокрупної крові
- D** Заспокоїти дитину, грілку на живіт
- E** Промити шлунок, поставити очисну клізму

56

Дитині 5 років, хворіє на грип. При огляді: шкіра червона, гаряча на дотик, температура тіла $39,5^{\circ}\text{C}$. Яка першочергова дія фельдшера при наданні невідкладної допомоги?

- A** *Провести фізичні методи охолодження
- B** Ввести назальні інтерферони
- C** Ввести 0,25% розчин дроперідолу у віковій дозі в/м
- D** Застосувати антибактеріальні засоби перорально
- E** Ввести 2% розчин супрастину у віковій дозі в/м

57

У дитини 7-ми років після падіння з дерева виникла сонливість, блювання, скарги на головний біль. При об'єктивному обстеженні дитина квола, шкірні покриви бліді, холодні, під час огляду у дитини з'явилися судоми. З яких лікарських середників слід розпочати надання невідкладної допомоги дитині?

- A** *Протисудомних
- B** Кровоспинних
- C** Спазмолітиків
- D** Серцевих глікозидів
- E** Гормональних препаратів

58

Фельдшер ШМД прибув на виклик до дитини в табір, який розташований в лісі. Під час прогулянки дитину вкусила бджола в ділянці щоки. Скарги дитини на головний біль, запаморочення. Які Ваші дії?

- A** *Холод на місце укусу, обколювати 1% розчином адреналіну
- B** Напоїти дитину солодким чаєм
- C** Ввести в/м 25% розчин сульфату магнію
- D** Ввести внутрішньом'язово 50% розчин анальгіну
- E** Госпіталізувати дитину

59

У дитини віком 10 років після удару м'ячем почалася носова кровотеча. Вкажіть першочерговий захід невідкладної допомоги?

- A** *Посадити із нахиленою головою вперед, притиснути крило носа до носової перегородки
- B** Покласти дитину із закинutoю головою назад
- C** Покласти холод на перенісся
- D** Закапати судинозвужувальні краплі
- E** Увести в носові ходи тампон, змочений у воді

60

У дитини 8-ми місяців виникла раптова зупинка дихання, ціаноз шкіри, дитина вкрита липким потом, "півнячий крик". З чого слід розпочати надання невідкладної допомоги?

- A** *Натиснути на корінь язика
- B** Зробити прохолодну клізму
- C** Ввести внутрішньом'язово 50% р-н анальгіну
- D** Ввести 1% розчин нікотинової кислоти підшкірно
- E** Ввести внутрішньовенно преднізолон