

Крок М Сестринська справа
Невідкладні стани в педіатрії

1

У дитини виникла носова кровотеча. На дошпитальному етапі для зупинки кровотечі необхідно застосувати:

- A** *Холод на перенісся
- B** Холод на підборіддя
- C** Тепло на перенісся
- D** Холод на п'яти
- E** Холод на грудину

2

Дитина 5 років при взятті крові із пальця зомліла. Якого положення дитині повинна надати медична сестра?

- A** *Лежачи, голова нижче тулуба
- B** Лежачи, голова на рівні тулуба
- C** Лежачи, голова вище тулуба
- D** Сидячи, голова закинута назад
- E** Сидячи, голова нахилена вперед

3

Бригада швидкої допомоги виїхала на виклик до дитини 7 років. Об'єктивно: дитина без свідомості, дихання та серцебиття відсутні, шкіра ціанотична. Які заходи в першу чергу необхідно провести?

- A** * Покласти на тверду рівну поверхню
- B** Провести штучну вентиляцію легень
- C** Звільнити дихальні шляхи
- D** Провести непрямий масаж серця
- E** Ввести лікарські препарати

4

Дитина віком 11 місяців поступила у відділення інтенсивної терапії з вираженим зневодненням, акроціанозом. Який інфузійний розчин можна вводити до з'ясування причини та встановлення типу зневоднення?

- A** *0,9% розчин натрію хлориду
- B** 10% розчин глюкози
- C** 5% розчин глюкози
- D** 5% натрію хлориду
- E** 3% розчин калію хлориду

5

Дитині 12 міс, знаходиться на стаціонарному лікуванні з приводу ГРВІ. Увечері з'явився неспокій, сухий нав'язливий "гавкаючий" кашель, охриплість голосу, рясні слизисто-серозні виділення з носа. Об'єктивно: шкіра чиста, слизові гіперемійовані t° - 38,5°C. Першочергові дії медичної сестри:

- A** *Заспокоїти дитину, узяти на руки
- B** Протерти шкіру напівспиртовим розчином
- C** Поставити гірчичники
- D** Зробити масаж грудної клітини
- E** Ввести антибіотики

6

Дитина 12 місяців хвора на рахіт. Під час гри раптово з'явилися: витрішкуватість, зляк на обличчі, ціаноз навколо рота і носа зупинилося дихання. Через декілька секунд з'явився гучний вдих - "півнячий крик". Яку першочергову невідкладну допомогу треба надати дитині?

A *Негайно надавити на корінь язика і покропити обличчя холодною водою

B Госпіталізувати пацієнта

C Призначити вітамін Дз

D Ввести проти судомні препарати

E Застосувати гормональні препарати

7

Дитина 10 років страждає на цукровий діабет I типу. Після ін'єкції інсуліну дитина не поїла. На другому уроці раптово з'явилось відчуття голоду, тремтіння в кінцівках, шкіра стала вологою. З чого необхідно почати надання невідкладної допомоги дитині на догоспітальному етапі?

A *Дати дитині цукерку, солодкий чай

B Госпіталізувати

C Ввести п/шкірно 0,1% розчин адреналіну

D Ввести в/венно преднізолон

E Ввести в/м'язово 25% розчин магнію сульфату

8

У три річної дитини після укусу бджоли з'явився різкий біль у ділянці укусу, відчуття жару, невивстачання повітря та запаморочення. При огляді: шкіра бліда, кінцівки холодні, холодний липкий піт на тулубі. З чого необхідно розпочати надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі?

A *Видалити жало прикласти міхур з льодом, негайно підшкірно ввести 0,1% розчин адреналіну (0,3-0,5 мл)

B Госпіталізувати до стаціонару

C Зробити примочку на місце укусу

D Місце укусу обколоти 0,3 мл 0,1% розчину адреналіну в 3 мл 0,9% розчину натрію хлориду

E Ввести в/венно струминно преднізолон

9

На яку глибину необхідно здійснювати натискування грудної клітки при проведенні непрямого масажу серця дитині 2 років?

A *На 1-2 см

B До 1 см

C На 3-4 см

D На 5-6 см

E На 7-8 см

10

У дівчинки 14 років, що хворіє на цукровий діабет, у школі на контрольній роботі з'явилась пітливість, підвищений м'язовий тонус, загальний тремор, слабкий пульс, зниження АТ. Які дії медсестри є першочерговими у даному випадку?

A *Дати випити солодкий чай

B Провести оксигенотерапію

C Застосувати серцеві глікозиди

D Ввести 0,5% глюкагон 0,1 мл

E Ввести 0,5% розчин седуксену 1 мг/кг

11

Дитині 9 років з діагнозом: ГРВІ. Гіпертермічний синдром, була введена літична суміш. Через 40 хвилин дитина різко встала з ліжка і впала. Об'єктивно: t° - 35,2 $^{\circ}$ C, шкіра бліда, вкрита холодним липким потом, тахікардія, АТ- 70/40 мм рт.ст. Оцінити стан дитини та ефективність проведеного догляду.

- A** *Гостра судинна недостатність, колапс; порушення ліжкового режиму
- B** Гостра судинна недостатність, зомління; відсутність фізичних методів охолодження
- C** Анафілактичний шок; швидке введення препаратів
- D** Медикаментозне отруєння; порушення ліжкового режиму
- E** Гіпоглікемічна кома; порушення дієти

12

Засобом першого вибору в стратегії лікування судомогого синдрому у дітей являється:

- A** *Седуксен
- B** Люмінал
- C** Дімедрол
- D** Хлористий кальцій
- E** Сульфат магнію

13

Дитині 1 рік, хворіє ГРВІ. На другу добу на фоні t° - 38,5 $^{\circ}$ C катаральних явищ дитина стала неспокійною, не знаходить зручного положення у ліжку, періодично відмічається інспіраторна задишка, гавкаючий кашель, голос осиплий. Що слід провести медичній сестрі в плані невідкладної допомоги?

- A** *Лужні інгаляції почергово з лазолваном
- B** Проведення прийому Геймлеха
- C** Виключити з раціону харчові алергени
- D** Гірчичні обгортання
- E** Інгаляція з беродуалом

14

При внутрішньом'язовому введенні пеніциліну у дитини 8-ти років з'явилися свербіння шкіри і почуття жару в грудях. Медична сестра закінчила вводити пеніцилін, викликала лікаря, поклала дитину на кушетку, приклала міхур з льодом до місця ін'єкції, налагодила оксигенотерапію. Які дії медсестри були помилковими?

- A** *Продовження введення пеніциліну
- B** Розташування дитини в горизонтальному положенні
- C** Прикладання холоду на місце ін'єкції
- D** Проведення оксигенотерапії
- E** Звертання за допомогою лікаря

15

Під час прогулянки на дитячому майданчику 3-х річну дівчинку вжалила оса. Які заходи треба провести в якості долікарської допомоги?

- A** *Прикласти холод на місце укусу
- B** Прикласти грілку на місце укусу
- C** Накласти гірчичник на місце укусу
- D** Розтерти місце укусу
- E** Чекати огляду лікаря

16

Дитина 8-и років була госпіталізована до реанімаційного відділення з діагнозом “Гостра лівошлуночкова недостатність”. Яке положення треба надати цій дитині в ліжку?

- A** *Напівлежаче з підвищеним на 30° головним кінцем
- B** Горизонтальне з піднятим нижнім кінцем
- C** Горизонтальне з поверненою набік головою
- D** Колінно-ліктьове
- E** На лівому боці з приведеними до живота ногами

17

Дитина 2 років хворіє на гострий стенозуючий ларинготрахеїт. Визначена IV ступінь захворювання. Який метод невідкладної допомоги доцільний в цьому випадку?

- A** *Трахеотомія
- B** Подання зволоженого кисню
- C** Відволікальна терапія
- D** Антигістамінні засоби
- E** Парові інгаляції

18

Після введення вакцини АКДП у хлопчика віком 1 р. 6 міс. з'явилися ознаки анафілактичного шоку. Дитині надано невідкладну допомогу. Який показник буде свідчити про покращення загального стану при оцінці результатів медсестринських втручань?

- A** *Нормалізація АТ
- B** Нормалізація температури тіла
- C** Покращення апетиту
- D** Нормалізація випорожнень
- E** Нормалізація сну

19

Дитина 10 років, хвора на цукровий діабет, отримавши інсулін, не поснідала. В класі раптово з'явилися перші ознаки гіпоглікемічної коми. Яке втручання необхідно виконати медичній сестрі школи?

- A** *Дати випити солодкий чай
- B** Вивести на свіже повітря
- C** Збризнути обличчя холодною водою
- D** Піднести до носа кульку, змочену нашатирним спиртом
- E** Подати зволожений кисень

20

Під час забору крові хлопчик 12 років раптово зблід, вкрився холодним потом, втратив свідомість. Яке положення тіла повинна надати медсестра дитині?

- A** *На спині з піднятими нижніми кінцівками
- B** На животі
- C** На боку
- D** На спині з піднятою головою
- E** Напівсидяче

21

Дитина 6 років захворіла на грип. Яка скарга при медсестринському обстеженні буде першочерговою?

- A** *Підвищення температури тіла до 39°C

- B** Вологий кашель
- C** Серозно-гнійні виділення з носа
- D** Шум у вухах
- E** Біль у животі

22

У 5-річної дитини через 3-5 хвилин після укусу бджоли посилюється різкий біль в місці укусу, погіршився загальний стан, відчуття жару та не достатку повітря, головокружіння, шум у вухах. Виражена блідість шкіри акроціаноз, холодний липкий піт на тілі, різко знижений АТ. Який стан розвинувся у дитини?

- A** *Анафілактичний шок
- B** Гіперглікемічна кома
- C** набряк Квінке
- D** Гіпоглікемічна кома
- E** Ацетонічний синдром

23

Яких невідкладних заходів необхідно вжити в разі виникнення колапсу у дитини?

- A** *Надати горизонтального положення з дещо піднятими кінцівками
- B** Внутрішньом'язево ввести 50% розчин анальгін
- C** Надати дитині підвищене положення, піднявши головний кінець ліжка
- D** Зробити промивання шлунку 1-2% розчином натрію бікарбонату
- E** Внутрішньом'язево ввести 0,5% розчин седуксену

24

Ви працюєте медичною сестрою в школі. До вас звернувся хлопчик 8 років зі скаргами на кровотечу з носа. Яке незалежне втручання слід провести для надання допомоги?

- A** *Посадити дитину з нахиленою головою вперед над лотком, ввести в носову порожнину турунду змочену 3% р-ном перексиду водню
- B** Підрахунок ЧСС
- C** Вимірювання АТ
- D** Заспокоїти дитину
- E** Надати горизонтального положення

25

У дитини 7 місяців раптово почалися судоми. Лікується в інфекційній лікарні з діагнозом менінгококова інфекція. Які першочергові дії медсестри при наданні невідкладної допомоги?

- A** *Профілактика западання язика
- B** Міхур з льодом до голови
- C** Подразнити корінь язика
- D** Зігріти дитину грілками
- E** ШВЛ, закритий масаж серця

26

Дитині 1 рік. Захворіла раптово, t° - 39°C , шкірні покриви рожеві, гарячі на дотик. Дитина млява, сонлива, носик закладений, сухий кашель. Медсестра використала фізичні методи охолодження для зниження t° . Які ознаки вкажуть на ефективність медсестринських втручань?

- A** *Зниження t°
- B** Брадикардія
- C** Тахікардія
- D** Тахипное
- E** Зниження АТ

27

У дитини 3-х років на другий день хвороби загальний стан погіршився. Дитина стала неспокійною, дихання шумне, допоміжні м'язи грудної клітки беруть участь у акті дихання. Кашель "гавкаючий", голос хрипкий. Яке незалежне втручання слід провести для надання допомоги?

A *Зробити лужну інгаляцію

B Надати горизонтальне положення

C Накласти зігріваючий компрес на грудну клітину

D Зрошування ротової порожнини розчином фурациліну

E Закапати носик розчином Називін

28

Що вибере медсестра для надання невідкладної допомоги в разі стенозуючого ларинготрахеїту на догоспітальному етапі?

A *Провести відволікаючу терапію

B Провести очисну клізму

C Провести промивання шлунку

D Ввести 0,5% розчин сибазону

E Ввести 50% розчин анальгіну