

**Крок М Сестринська справа**  
**Основи медсестринства**

1

Виснаженому хворому призначено харчування з підвищеною енергетичною цінністю. Який з дієтичних столів відповідає цій вимозі:

- A** \*№ 11
- B** № 1
- C** № 5
- D** № 9
- E** № 10

2

Медична сестра проводить шлункове зондування з застосуванням парентерального подразника. Для отримання максимальної (стимульованої) секреції вона використає:

- A** \*0,1% розчин гістаміну
- B** 25% розчин магнію сульфата
- C** 5 ОД пітуїтрину
- D** 75 ОД інсуліну
- E** 10% розчин хлориду натрію

3

Медична сестра визначає властивості пульсу. Яку судину зручніше використати для дослідження?

- A** \*Променеву артерію
- B** Аорту
- C** Сонну артерію
- D** Скроневу артерію
- E** Стегнову артерію

4

Медична сестра доглядає за пацієнтом К., 23 роки, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу крупозної пневмонії. У пацієнта гарячка. Які ознаки характерні для третьої стадії гарячки?

- A** \*Пітливість
- B** Підвищений тиск
- C** Рідкий пульс
- D** Наростання температури
- E** Блідість шкіри обличчя

5

Медсестра проводить санітарну обробку пацієнта з педикульозом вагітній жінці. Який протипедикульозний засіб можна використати в даній ситуації?

- A** \* 5% борну кислоту
- B** Перманганат калію
- C** Оксид водню
- D** Карбофос
- E** Гідрокарбонат натрію

6

Яка клінічна ознака характерна для легеневої кровотечі?

- A** \*Виділення пінистої крові яскраво-червоного кольору
- B** Відсутність блювання
- C** Артеріальна гіпертензія
- D** Блювання "кавовою гущею"
- E** Кров, що виділяється, має кислу реакції при визначенні рН

7

У пацієнта II стадія гарячки. Виберіть метод, який не належить до фізичних методів боротьби з гіпертермією:

- A** \*Парентеральне введення розчину анальгін
- B** Обтирання тіла водою з оцтом
- C** Вологе обкутування всього тіла хворого
- D** Застосування міхура з льодом
- E** Застосування клізм з холодною водою

8

Пацієнту К., 62 р., призначено курс грудотерапії. Назвіть показання до застосування п'явок:

- A** \*Артеріальна гіпертензія
- B** Кровоточивість судин
- C** Ураження шкіри в місці прикладання п'явок
- D** Алергічні захворювання
- E** Анемія

9

Пацієнту необхідно закрapati у зовнішній слуховий прохід розчин з метою розм'якшення сірчаної пробки. Що використає медсестра в даному випадку?

- A** \*3% р-н перекису водню
- B** 70% р-н етилового спирту
- C** 5% р-н перманганату калію
- D** 2% р-н натрію гідрокарбонату
- E** 0,9% р-н натрію хлориду

10

До фізичних методів дезінфекції не належить:

- A** \*Застосування 0,02% розчину хлорантоїну
- B** Використання пиловсмоктувача
- C** Використання високої температури
- D** Пастеризація
- E** Використання УФ-променів

11

Для об'єктивної оцінки ризику утворення пролежнів медична сестра використовує систему бальної оцінки за Norton. Сума балів 20. Як за шкалою Norton оцінити ризик виникнення пролежнів у даному випадку?

- A** \*Немає ризику
- B** Мінімальний
- C** Помірний
- D** Високий
- E** Особливо високий

12

За теорією А. Маслоу існує 5 рівнів людських потреб. III рівень – соціальні потреби. Яка людська потреба належить до цього рівня?

- A** \*Родина
- B** Одяг
- C** Самовираження
- D** Їжа
- E** Повітря

13

Медична сестра приймального відділення проводить вимірювання обводу грудної клітки.

Орієнтиром для накладання стрічки буде:

- A** \*Нижній край лопатки
- B** I поперековий хребець
- C** Реберна дуга
- D** Верхній край лопатки
- E** Ості клубової кістки

14

Хворого з підозрою на інфаркт міокарда госпіталізують у кардіологічний стаціонар.

Який метод санітарної обробки можна використати в даному випадку?

- A** \*Не проводити санітарну обробку
- B** Душ
- C** Ванну
- D** Обтирання шкіри
- E** Використати будь-який метод

15

Медична сестра хірургічного відділення лікарні, здійснюючи догляд за післяопераційними пацієнтами, повинна дотримуватись лікувально-охоронного режиму. Який із наведених заходів є його елементом?

- A** \*Дотримання тиші
- B** Провітрювання палат
- C** Вимірювання  $t^{\circ}$  тіла
- D** Дієтичне харчування
- E** Прибирання приміщень

16

Хворому на хронічний коліт, із схильністю до закрепів, призначили дієту №3. Який із зазначених продуктів **НЕ РЕКОМЕНДОВАНО** включати до харчового раціону?

- A** \*Бобові
- B** Висівковий хліб
- C** Пісне м'ясо
- D** Річкова риба
- E** Копчена ковбаса

17

Лікар призначив пацієнту В., 53 р., у якого спостерігаються набряки та закрепи, гіпертонічну клізму. Для її проведення медсестра використовує:

- A** \*10% розчин хлориду натрію
- B** Відвар ромашки
- C** 0,9% розчин хлориду натрію
- D** Холодну воду
- E** Соняшникову олію

18

Пацієнт Р., 23 р., знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу захворювання, яке ускладнилось сепсисом. Добові коливання температури тіла становить 3-4°C. Який тип температурної кривої спостерігається в даному випадку?

- A** \*Гектична
- B** Неправильна
- C** Ремітуюча
- D** Хвилеподібна
- E** Інтермітуюча

19

Пацієнта К. готують до оперативного втручання на органах черевної порожнини. Для підготовки пацієнта медсестра повинна застосувати клізму:

- A** \*Сифонну
- B** Очисну
- C** Гіпертонічну
- D** Олійну
- E** Емульсійну

20

Медична сестра здійснює медсестринський процес. На якому етапі проходить збір необхідної інформації про пацієнта?

- A** \*I етапі
- B** II етапі
- C** III етапі
- D** IV етапі
- E** V етапі

21

Діяльність медичної сестри розглядається як медсестринський процес. Яка мета першого етапу медсестринського процесу?

- A** \*Оцінити загальний стан пацієнта
- B** Спланувати обсяг сестринських втручань
- C** Реалізувати сплановані втручання
- D** Навчити пацієнта самодогляду
- E** Оцінити ефективність догляду

22

В міську лікарню поступила жінка, 45 років, з приводу гіпертонічної хвороби. Медична сестра збирає медсестринський анамнез і проводить об'єктивне обстеження пацієнта. Який це етап медсестринського процесу?

- A** \*I етап
- B** II етап
- C** III етап
- D** IV етап
- E** V етап

23

Ієрархія людських потреб за А. Маслоу включає:

- A** \*5 рівнів
- B** 4 рівні
- C** 3 рівні
- D** 2 рівні
- E** 1 рівень

24

Медсестра здійснює медсестринський процес. Другий етап медсестринського процесу - це:

- A** \*Медсестринська діагностика
- B** Оцінювання загального стану пацієнта
- C** Планування обсягу медсестринських втручань
- D** Реалізація спланованих втручань
- E** Оцінювання ефективності догляду

25

Пацієнт Т., 42 р., знаходиться на лікуванні у хірургічному відділенні протягом 20 діб. Увесь цей час він знаходиться на суворому ліжковому режимі. Вкажіть потенційну проблему пацієнта?

- A** \*Виникнення пролежнів
- B** Поява болю у шлунку
- C** Легенева кровотеча
- D** Поява сухого кашлю
- E** Порушення сну

26

Медична сестра провела обстеження пацієнта, встановила медсестринський діагноз. До якого етапу повинна приступити медична сестра?

- A** \*III етапу
- B** II етапу
- C** I етапу
- D** IV етапу
- E** V етапу

27

Здійснюючи медсестринський процес, медична сестра встановлює мету медсестринських втручань. Вона може бути:

- A** \*Короткострокова
- B** Пріоритетна
- C** Потенційна
- D** Наявна
- E** Проміжна

28

Медична сестра здійснює медсестринський процес. Втручання, які вона може проводити на основі своєї фахової компетенції без вказівок лікаря, мають назву:

- A** \*Незалежні
- B** Залежні
- C** Наявні
- D** Взаємозалежні
- E** Пріоритетні

29

Медична сестра виконує внутрішньом'язову ін'єкцію пацієнту за призначенням лікаря. Яке втручання вона здійснює?

- A** \*Залежне
- B** Незалежне
- C** Наявне
- D** Взаємозалежне
- E** Пріоритетне

30

Медична сестра здійснює медсестринський процес і проводить незалежні медсестринські втручання. До незалежних медсестринських втручань належить:

- A** \*Зміна натільної білизни
- B** Виконання підшкірної ін'єкції
- C** Введення антибіотиків
- D** Проведення очисної клізми
- E** Підготовка пацієнта до операції

31

При реалізації плану медсестринських втручань медична сестра помітила, що мета втручання не досягнута. Які подальші дії медичної сестри?

- A** \*Оцінити стан хворого і провести корекцію плану догляду
- B** Провести опитування пацієнта

- C** Виявити проблеми пацієнта
- D** Здійснити план догляду
- E** Задовольнити потреби пацієнта

32

Медична сестра проводить дезінфекцію медичного інструментарію одноразового використання 0,2% розчином дезактину. На який час потрібно занурити інструменти після їх використання?

- A** \*60 хв.
- B** 30 хв.
- C** 45 хв.
- D** 20 хв.
- E** 15 хв.

33

Медична сестра проводить передстерилізаційну обробку багаторазового медичного інструментарію. За допомогою якої проби можна виявити залишки миючого засобу?

- A** \*Фенолфталеїнової проби
- B** Азопирамової проби
- C** Амідопиринової проби
- D** Бензидинової проби
- E** Проби з суданом-3

34

Медична сестра здійснює свою професійну діяльність. Який наказ МОЗ України регламентує її діяльність, направлену на профілактику зараження СНІДом у лікувальному закладі?

- A** \*120
- B** 408
- C** 450
- D** 223
- E** 38

35

Під час обстеження пацієнта К., 55 років, що лікується у кардіологічному відділенні з приводу ішемічної хвороби серця, медична сестра досліджує пульс. Пульс регулярний, його частота складає 98/хв. Як охарактеризувати такий пульс?

- A** \*Тахікардія
- B** Брадикардія
- C** Аритмія
- D** Напружений
- E** Повний

36

За призначенням лікаря медична сестра виконує внутрішньо-м'язову ін'єкцію. Яку максимальну кількість розчину одноразово можна ввести внутрішньом'язово?

- A** \*10 мл
- B** 5 мл
- C** 2 мл
- D** 15 мл
- E** 20 мл

37

Пацієнту К., 32 років, що лікується в урологічному відділенні призначено зібрати сечу на загальний клінічний аналіз. Як зібрати сечу на дане дослідження?

- A** \*Після ретельного туалету зовнішніх статевих органів, вранці після сну
- B** Протягом доби

- C* За 3 години
- D* За 10 годин
- E* Середню порцію сечі

38

Флакон містить 1 000 000 ОД антибіотика. За призначенням лікаря медична сестра повинна ввести пацієнту 500 000 ОД даного антибіотика. Яку кількість розчинника необхідно взяти для розведення антибіотика і яку кількість розчину треба ввести пацієнту?

- A* \*5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину
- B* 5 мл розчинника і ввести 5 мл розчину
- C* 10 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину
- D* 2,5 мл розчинника і ввести 2,5 мл розчину
- E* 5 мл розчинника і ввести 3 мл розчину

39

З метою підготовки до рентгенологічного дослідження кишківника пацієнту призначена очисна клізма. Яке положення треба надати пацієнту при проведенні очисної клізми?

- A* \*На лівому боці, ноги зігнути у колінних суглобах та привести до живота
- B* На правому боці, ноги зігнути у колінах
- C* На спині
- D* На животі
- E* Напівлежачи

40

Пацієнту 18-ти років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу загострення хронічної пневмонії, призначено застосування гірчичників. Медична сестра інформує пацієнта про тривалість накладання гірчичників. Вона складає:

- A* \*10-15 хв.
- B* 1-2 хв.
- C* 20-30 хв.
- D* 2-4 год.
- E* 8-10 год.

41

Пацієнт З., 33 р., лікується у нефрологічному відділенні. Лікар признавив йому діету № 7.

При спілкуванні з пацієнтом медична сестра пояснює мету дієти № 7. Назвіть мету цієї дієти.

- A* \*Щадіння функції нирок, зменшення набряків
- B* Відновлення функції печінки
- C* Щадіння нервової системи
- D* Нормалізація функції кишківника
- E* Нормалізація білкового обміну

42

У юнака 17 років гостра респіраторна вірусна інфекція. Яких заходів безпеки повинна дотримуватись медсестра при догляді за пацієнтом?

- A* \*Носити марлеву пов'язку
- B* Одягти гумові рукавички
- C* Носити захисні окуляри
- D* Одягти фартух
- E* Користуватися протичумним костюмом

43

У приймальне відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт з шлунково-кишковою кровотечею (три години тому було блювання у виді "кавової гущі"). Суб'єктивно відчуває себе задовільно, може рухатись самостійно. Як транспортувати пацієнта у відділення стаціонару?

- A** \*На каталці
- B** Самостійно в супроводі медичної сестри
- C** Самостійно без супроводу
- D** На кріслі-каталці
- E** На ношах двома санітарами

44

У пацієнта 40 р. ревматизм, лікар призначив йому аспірин, який подразнює слизову оболонку шлунка. Про які особливості прийому препарату повинна проінформувати пацієнта медсестра?

- A** \*Приймати після їжі
- B** Приймати натще
- C** Приймати у проміжках між їжею
- D** Приймати під час їжі
- E** Приймати за 30 хвилин перед сном

45

Пацієнту К., хворому на крупозну пневмонію, медична сестра вранці внутрішньом'язово ввела антибіотик. Ввечері він звернувся до чергової медсестри зі скаргами на біль, ущільнення і почервоніння у місці ін'єкції. Яке ускладнення виникло у пацієнта?

- A** \*Інфільтрат
- B** Некроз тканини
- C** Алергічна реакція
- D** Олійна емболія
- E** Ушкодження нервового стовбура

46

Пацієнту 45 років, кількаразово вводили внутрішньовенно 10 мл 2,4% розчин еуфіліну. Після ін'єкції у хворого виникла гіперемія, набряк в місці ін'єкції, відчуття болю при пальпації по ходу вени. Яке ускладнення розвинулось у пацієнта?

- A** \*Флебіт
- B** Повітряна емболія
- C** Медикаментозна емболія
- D** Пірогенна реакція
- E** Інфільтрат

47

Пацієнт К., 60 років, знаходиться на стаціонарному лікуванні в нефрологічному відділенні. Лікар призначив визначити добовий діурез пацієнта. Він становить 3050 мл. Дайте оцінку результату.

- A** \*Поліурія
- B** Анурія
- C** Олігоурія
- D** Ніктурія
- E** Ішурія

48

У пацієнта Т., 68 р., що спостерігається у лікаря-уролога у зв'язку з аденомою передміхурової залози. Пацієнт неспокійний, скаржиться на біль в надлобковій ділянці, відсутність сечовипускання протягом останніх 10 годин. Назвіть першочергову проблему пацієнта.

- A** \*Гостра затримка сечі
- B** Странгурія
- C** Олігурія
- D** Поліурія
- E** Дізурія

49



Пацієнту Н., 56 років, призначено катетеризацію сечового міхура м'яким катетером. Назвіть найбільш часте ускладнення при проведенні катетеризації сечового міхура:

- A** \*Занесення інфекції у сечовиводні шляхи
- B** Гематурія
- C** Розрив уретри
- D** Обтурація сечовиводного каналу
- E** Поява алергійної реакції

50

Медична сестра урологічного відділення після закінчення катетеризації сечового міхура продезінфікувала гумові катетери і готує їх до стерилізації. Назвіть метод стерилізації гумових катетерів багаторазового використання.

- A** \*Паровий метод
- B** Кип'ятіння
- C** Замочування у 3% розчині перекису водню
- D** Повітряний метод
- E** Іонізуюче опромінення

51

Пацієнтка Р., 52 років, лікується в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної астми, скаржиться на порушення дихання: вдих короткий, а видих утруднений і дуже тривалий. Як називається таке порушення дихання?

- A** \*Експіраторна задишка
- B** Інспіраторна задишка
- C** Змішана задишка
- D** Стридорозне дихання
- E** Дихання Біота

52

У пацієнта М., 30 років, який лікується в терапевтичному відділенні з приводу крупозної пневмонії. Протягом години температура тіла пацієнта знизилась з 41 до 37°C, виникла різка слабкість, головний біль, серцебиття, швидке зниження артеріального тиску. Як медична сестра повинна оцінити таке зниження температури?

- A** \*Критичне
- B** Літичне
- C** Зворотне
- D** Хвилеподібне
- E** Переміжне

53

Медична сестра, спостерігаючи за пацієнтом К., 60 років, який лікується в неврологічному відділенні, відмічає зміну ритму дихання, яке характеризується хвилеподібним збільшенням і зменшенням амплітуди дихальних рухів з наявністю пауз між хвилями тривалістю 40-50 сек. Як називається такий тип дихання?

- A** \*Чейна-Стокса
- B** Куссмауля
- C** Біота
- D** Стридорозне
- E** Експіраторне

54

Пацієнту з тяжкою серцево-судинною недостатністю лікар призначив досліджувати пульс кожні три години і доповідати дані досліджень. Які властивості пульсу повинна визначити медична сестра?

- A** \*Частоту, ритм, напруження, наповнення
- B** Висоту, швидкість, ритм
- C** Пульсові коливання, наповнення

- D** Частоту, висоту, напруження
- E** Напруження, швидкість, пульсові коливання

55

Пацієнтка 55 років знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу стенокардії. Яка з проблем пацієнта буде пріоритетною?

- A** \*Стискаючий біль за грудиною
- B** Виникнення пролежнів
- C** Порушення сну
- D** Порушення добового діурезу
- E** Відсутність апетиту

56

Пацієнту, 46 років, з серцево-судинною недостатністю для зменшення набряків лікар призначив сечогінний препарат. Яким методом медична сестра може контролювати ефективність дії призначеного препарату?

- A** \*Визначити добовий діурез
- B** Визначити нічний діурез
- C** Визначити кількість виділеної сечі кожні 3 години
- D** Визначити кількість рідини, введеної за добу
- E** Визначити співвідношення між денним та нічним діурезом

57

Медична сестра терапевтичного відділення проводила медсестринське обстеження пацієнтки із хронічним колітом, яке дало можливість виявити проблеми пацієнта: метеоризм, закрепи, зниження апетиту. До якої категорії потрібно віднести ці проблеми?

- A** \*Фізіологічні
- B** Психологічні
- C** Соціальні
- D** Потенційні
- E** Вторинні

58

Пацієнту В., 76 років, з хронічною серцевою недостатністю, який страждає на закрепи, лікар призначив гіпертонічну клізму. Медична сестра пояснює пацієнту мету застосування клізми:

- A** \*Випорожнення кишок під час атонічних закрепів
- B** Введення лікарських речовин
- C** Компенсація великої втрати рідини
- D** Запальні і виразкові процеси товстої кишки
- E** Підозра на кишкову непрохідність

59

Пацієнту С., 48 років, що страждає на хронічний холецистит, призначено ультразвукове дослідження органів черевної порожнини. Як медичній сестрі підготувати пацієнта до обстеження:

- A** \*На протязі 3 днів вилучити продукти, які сприяють метеоризму
- B** Увечорі та вранці зробити очисну клізму
- C** Напередодні випити 50 г рицинової олії
- D** За 2-3 дні до обстеження провести пробу на чутливість до препаратів
- E** Протягом трьох днів дотримуватися безгемоглобінової дієти

60

Медична сестра, навчає пацієнта М., 42 років, самостійно робити ін'єкції інсуліну. Профілактика якого ускладнення інсулінотерапії передбачає зміну місця ін'єкцій?

- A** \*Ліподистрофії
- B** Інфікування м'яких тканин
- C** Алергійної реакції

- D** Медикаментозної емболії
- E** Некрозу тканин

61

Медична сестра під час дезінфекції шприців та голок 3% розчином хлораміну випадково направила струмінь розчину собі в обличчя. Декілька крапель вмісту шприца потрапило в очі. Яку першу допомогу потрібно надати в даному випадку?

- A** \*Промити очі струменем води, закрapati 30% розчин альбуміду
- B** Промити очі кип'яченою водою
- C** Промити очі 3% розчином пероксиду водню
- D** Накласти на очну щілину асептичну пов'язку
- E** Заспокоїти медичну сестру, забезпечити доступ свіжого повітря

62

У пацієнта, 55 років, що страждає на гіпертонічну хворобу, лікар призначив дієту № 10. Які рекомендації щодо дієти може дати йому медсестра?

- A** \*Зменшити кількість вживання солі і рідини
- B** Не вживати смаженого
- C** Їжу перед вживанням подрібнювати
- D** Зменшити кількість вживання їжі
- E** Зменшити калорійність їжі

63

Під час проведення внутрішньовенної ін'єкції у пацієнта К. Медична сестра проколола обидві стінки вени, і кров потрапила у підшкірну жирову клітковину в місті венепункції. Як називається таке ускладнення?

- A** \*Гематома
- B** Інфільтрат
- C** Емболія
- D** Абсцес
- E** Алергічна реакція

64

Пацієнт О., 35 років, потрапив у гастроентерологічне відділення. Лікар призначив йому фракційне зондування шлунку з використанням парентерального подразника (гістаміну). Назвіть дії медсестри для профілактики алергійної реакції на гістамін.

- A** \*Ввести підшкірно 1% розчин димедролу - 1 мл
- B** Ввести підшкірно 0,025% розчин пентагастрину - 1 мл
- C** Відсмоктати IV, V, VI порції шлункового вмісту
- D** Відсмоктати IV, V, VI, VII порції шлункового вмісту
- E** Ввести підшкірно 0,1% розчин гістаміну

65

Пацієнтці М., 45 років, з захворюванням жовчного міхура, лікар призначив п'ятифазне дуоденальне зондування з діагностичною метою. IV фаза - порція В - рідина темно-оливкового кольору - це вміст:

- A** \*Жовчного міхура
- B** Шлунку
- C** Дванадцятипалої кишки
- D** Тонкої кишки
- E** Печінкова жовч

66

Пацієнту М., 35 років, з гострим гломерулонефритом лікар призначив аналіз сечі за методом Нечипоренка. Як навчити пацієнта правильно зібрати сечу для даного дослідження?

- A** \*Із середньої порції сечі 5-10 мл
- B** Денний діурез

- C* Нічний діурез
- D* Весь добовий діурез
- E* Зібрати сечу за 3 год.

67

Чоловік, 60 років, звернувся до дільничного лікаря на прийом з приводу скарг на головний біль, запаморочення, шум у голові, загальну слабкість. При обстеженні: АТ - 180/95 мм рт.ст. Як називається такий показник артеріального тиску?

- A* \*Артеріальна гіпертензія
- B* Артеріальна гіпотензія
- C* Гіпертермія
- D* Тахікардія
- E* Брадикардія

68

У неврологічному відділенні при обстеженні пацієнта К., 55 років, медична сестра оцінювала властивості пульсу і виявили, що він є нерегулярним (неритмічним). Як оцінити такі зміни пульсу?

- A* \*Аритмія
- B* Брадикардія
- C* Гіпертензія
- D* Гіпотензія
- E* Тахікардія

69

Пацієнту К., 45 років, при стійких закрепах лікар призначив олійну клізму. Яку кількість олії повинна ввести медична сестра?

- A* \*100-150 мл
- B* 20-30 мл
- C* 200-300 мл
- D* 300-400 мл
- E* 400-500 мл

70

Пацієнту А., 48 років, у хірургічному відділенні при атонічному закрепі лікар призначив гіпертонічну клізму. Який розчин повинна застосувати медична сестра для цієї клізми?

- A* \*25% розчин магнію сульфату
- B* 0,9% розчин натрію хлориду
- C* 10% розчин кальцію хлориду
- D* 2% розчин новокаїну
- E* 5% розчин глюкози

71

У фізкультурному диспансері, жінці 35 років, для визначення функціональної можливості системи дихання медичною сестрою була проведена спірометрія. Які показники життєвої ємкості легень для жінок вважаються середніми?

- A* \*2500-3500
- B* 4000-4500
- C* 3200-4000
- D* 2000-3500
- E* 3500-4500

72

Чоловік 70 років, після смерті дружини залишився зовсім один. В нього немає рідних, немає друзів, йому не вистачає спілкування. Фізичний стан організму задовільний. Які потреби чоловіка не задоволені?

- A** \*Соціальні потреби
- B** Фізіологічні потреби
- C** Потреби в безпеці
- D** Потреби в самоповазі
- E** Самовираження

73

Пацієнту А., 75 років, якому встановлено діагноз інфаркт міокарду, були проведені планові медсестринські втручання за стандартом профілактики пролежнів, але заходи не дали позитивного результату, на шкірі в ділянці лопаток, крижової кістки з'явилися пухирі. Які дії треба вжити медичній сестрі?

- A** \*Провести оцінку і корекцію догляду
- B** Змінити призначення незалежно від думки пацієнта
- C** Порадитись з лікарем
- D** Продовжувати виконувати заплановані сестринські втручання
- E** Виконувати тільки лікарські призначення

74

Пацієнт, 70 років, потрапив у травматологічне відділення. Хворий дуже слабкий, тривалий час перебуває у ліжку. Змінюючи йому білизну медична сестра помітила пухирі в ділянці крижової кістки. Які дії їй необхідно виконати в даному випадку?

- A** \*Змащувати 2% спиртовим розчином діамантового зеленого
- B** Змащувати 1% розчином саліцилового спирту
- C** Змащувати 10% розчином камфорного спирту
- D** Змащувати розчином фурациліну 1:5000
- E** Протирати 70% етиловим спиртом

75

У пацієнта Н., 48 років, виявлено туберкульоз легень. Його госпіталізували в туберкульозний стаціонар. Який дієтичний стіл йому призначить лікар?

- A** \*11
- B** 13
- C** 10
- D** 12
- E** 5

76

Медична сестра після вимірювання температури тіла хворому Н. продезінфікувала термометр у розчині 0,1% дезоксону. Протягом якого часу дезінфікуються медичні термометри після використання в даному розчині?

- A** \*15 хв.
- B** 60 хв.
- C** 30 хв.
- D** 90 хв.
- E** 10 хв.

77

Пацієнт М., 50 років, лікується в ендокринологічному відділенні з приводу цукрового діабету. В нічний час у нього виникло шумне, глибоке дихання. Визначте паталогічний тип дихання.

- A** \*Дихання Куссмауля
- B** Тахіпноє
- C** Апноє
- D** Брадипноє
- E** Дихання Біота

78

Після операції з приводу гострого холециститу у пацієнтки похилого віку спостерігається затримка сечовиділення протягом 12 годин. Лікар призначив хворій катетеризацію сечового міхура. Чим необхідно змастити кінець катетера перед введенням?

- A** \*Стерильним гліцерином
- B** 2% розчином борної кислоти
- C** Розчином фурациліну 1:5000
- D** Вазеліном
- E** Вазеліновою олією

79

Хлопець, 5 років, граючись у дитячому садку, підслізнувся і впав. У дитини спостерігається носова кровотеча. Медична сестра дитячого садка до приходу лікаря для зупинки кровотечі застосувала найпростіший метод фізіотерапії. Який метод застосувала медична сестра?

- A** \*Холодний компрес
- B** Гірчичники
- C** Банки
- D** Грілка
- E** Зігрівальний компрес

80

Жінка, 28 років, потрапила до лікарні з приводу ревматичної хвороби. Лікар призначив внутрішньом'язове введення бензилпеніциліну натрієвої солі. Через деякий час у місці введення препарату з'явилося ущільнення - інфільтрат. Яка причина могла призвести до цього ускладнення?

- A** \*Часте введення розчину в одне й те ж місце
- B** Потрапляння голки в нервовий стовбур
- C** Введення препаратів із закінченим терміном придатності
- D** Помилкове введення лікарського препарату
- E** Потрапляння невидалених бульбашок повітря з шприца

81

Жінка, 40 років, знаходиться на лікуванні в пульмонологічному відділенні з приводу пневмонії. Лікар призначив хворій введення 500 000 ОД бензилпеніциліну натрієвої солі. Хвора принесла до маніпуляційного кабінету призначений антибіотик у флаконі по 1,0 г. Скільки розчинника повинна взяти медична сестра за стандартом і скільки ввести хворій?

- A** \*Розчинника 10 мл, ввести хворій 5 мл
- B** Розчинника 5 мл, ввести хворій 5 мл
- C** Розчинника 5 мл, ввести хворій 3 мл
- D** Розчинника 3 мл, ввести хворій 2 мл
- E** Розчинника 1 мл, ввести хворій 0,5 мл

82

Ви працюєте медичною сестрою операційного блоку. Які предмети ви будете укладати в бікс при складанні цілеспрямованої укладки?

- A** \*Все, що необхідно для однієї операції
- B** Все, що необхідно для декількох операцій
- C** Все, що необхідно для роботи протягом одного дня
- D** Тільки операційну білизну
- E** Тільки операційний інструментарій

83

До стаціонару поступив хворий М., 45 років, з запаленням легень. На IV етапі медсестринських втручань постова медична сестра виконала призначення лікаря та розповіла пацієнту про лікувально-охоронний режим. Лікувально-охоронний режим передбачає:

- A** \*Дотримання правил розпорядку дня
- B** Виконання пацієнтом лікарських призначень
- C** Особливості дезінфекції медінструментарію

- D** Особливості стерилізації медінструментарію
- E** Дотримання правил техніки безпеки

84

Жінка, 40 років, знаходиться на лікуванні в кардіологічному відділенні з діагнозом гіпертонічна криза, лікар заборонив їй вставати з ліжка. Тому медична сестра відділення при потребі подавала хворій судно. У якому розчині потрібно дезінфікувати судно після кожного застосування?

- A** \*3% розчині хлораміну
- B** 5% розчині хлораміну
- C** 1% розчині хлораміну
- D** 4% розчині перекису водню
- E** 1% розчині хлорного вапна

85

З травматологічного відділення виписують хвору А., 50 років, після лікування травми колінного суглоба. Медична сестра проводить бесіду, та розповідає, що пацієнтка повинна пройти реабілітацію. Де вона це може зробити?

- A** \*В санаторії
- B** В лікарні
- C** В хоспісі
- D** В госпіталі
- E** В клініці

86

Пацієнту призначена дієта №2. При спілкуванні з пацієнтом, медична сестра, пояснює мету призначеної дієти:

- A** \*Нормалізація секреторної і моторної функції шлунка
- B** Відновлення порушеної функції кровообігу
- C** Нормалізація моторної функції кишечника
- D** Нормалізація вуглеводного обміну
- E** Відновлення функції печінки та жовчeveго міхура

87

Медична сестра ЦСВ після проведення стерилізації перев'язувального матеріалу паровим методом засвідчила порошокоподібний стан контрольної речовини після проведення стерилізації в автоклаві. Про що це свідчить?

- A** \*Порушено режим стерилізації - не досягнуто необхідного тиску і температури пари
- B** Порушено режим стерилізації - не досягнуто необхідної температури пари
- C** Матеріал не підлягає стерилізації в автоклаві
- D** Простерилізований матеріал придатний до використання
- E** Контрольна речовина низької якості

88

Вкажіть потребу першого рівня за моделлю В. Хендерсон?

- A** \*Нормально дихати
- B** Підтримувати температуру тіла
- C** Дбати про свою безпеку
- D** Спілкуватися з іншими людьми
- E** Регулювати фізіологічні відправлення

89

Пацієнту була проведена проба Манту. Через 72 години медсестра виміряла поперечний розмір інфільтрату - 21 мм. Як оцінити пробу Манту?

- A** \*Гіперергічна реакція
- B** Сумнівна реакція
- C** Позитивна реакція

- D** Слабко позитивна реакція
- E** Негативна реакція

90

Пацієнт Е., 75 років, перебуває в геріатричному пансіонаті. Назвіть потребу третього рівня за ієрархією А.Маслоу для здійснення медсестринського процесу?

- A** \*Спілкуватися з іншими людьми
- B** Здійснення фізіологічних потреб
- C** Дбати про власну безпеку
- D** Дбати про власну гігієну
- E** Самовиражатися

91

Пацієнту К, 60 років, призначено ендоскопічне дослідження слизової оболонки сигмоподібної і прямої кишок. Як називається даний метод дослідження?

- A** \*Ректороманоскопія
- B** Колоноскопія
- C** Фіброгастроскопія
- D** Лапароскопія
- E** Цистоскопія

92

Під час внутрішньовенного введення 10% розчину кальцію хлориду, пацієнт поскаржився на печучий біль у місці венепункції. В місці ін'єкції утворилося припухлість. Назвати ускладнення, яке може виникнути в результаті неправильного проведення ін'єкції?

- A** \*Некроз тканини
- B** Повітряна емболія
- C** Алергічна реакція
- D** Гематома
- E** Флебіт

93

При підготовці пацієнта до холецистографії, хворому призначають холевід. Назвати спосіб введення контрастної речовини?

- A** \*Пероральний
- B** Внутрішньовенний
- C** Підшкірний
- D** Сублінгвальний
- E** Внутрішном'язовий

94

Ви працюєте медичною сестрою маніпуляційного кабінету і в своїй роботі використовуєте переважно одноразові інструменти з пластичних мас. Який наказ МОЗ України регламентує знезараження й утилізацію цих інструментів?

- A** \*№ 223
- B** № 120
- C** ГСТ 42-21- 2 -85
- D** № 408
- E** № 191

95

Медична сестра після використання металевих інструментів багаторазового використання занурила їх в розібраному вигляді у дистильовану воду і прокип'ятила протягом 30 хв. Який метод дезінфекції застосувала медична сестра?

- A** \*Фізичний метод
- B** Комбінований метод
- C** Хімічний метод



- D** Паровий метод
- E** Повітряний метод

96

В ЦСВ після дезінфекції інструментарію надійшла чергова партія для передстерилізаційного очищення і стерилізації. Назвіть другий етап передстерилізаційної обробки інструментів.

- A** \*Занурити інструменти в мийний розчин
- B** Інструменти продезінфікувати
- C** Промити під проточною водою
- D** Провести азопірамову та фенолфталеїнову проби
- E** Провести ополіскування в дистильованій воді

97

Ви - чергова медсестра онкологічного відділення. Перед здійсненням догляду за пацієнтом з ослабленим імунітетом необхідно застосувати такий спосіб обробки рук:

- A** \*Гігієнічний
- B** Хірургічний
- C** Соціальний
- D** Вдягнути чисті гумові рукавички
- E** Вдягнути стерильні гумові рукавички

98

З метою попередження розповсюдження внутрішньолікарняної інфекції у відділеннях ЛПЗ проводиться маркірування інструментів, приладів, посуду, інвентаря тощо. В якому нормативному документі йдеться про необхідність маркірування ?

- A** \*Наказ № 720
- B** Наказ № 408
- C** ГСТ 42-21-2-85
- D** Наказ № 120
- E** Наказ № 38

99

Ви працюєте старшою медсестрою терапевтичного відділення і помітили, що нова буфетниця не знає, як правильно обробляти обідні столи. Яка послідовність обробки поверхні обідніх столів?

- A** \*Тричі на день обробляють 0,2% дезактином, а через 15 хв. змивають теплою водою
- B** Двічі на день після прийому їжі обробляють 1% хлораміном
- C** Тричі на день після прийому їжі миють теплою водою
- D** Дезінфікують вранці 3% хлораміном, а після обіду та вечері витирають вологою ганчіркою
- E** Тричі на день обробляють 1% хлораміном

100

Після переведення тяжкохворого пацієнта в інший ЛПЗ необхідно провести знезараження його матрацу, подушки та ковдри. Виберіть метод дезінфекції цих речей:

- A** \*Обробка в дезкамері
- B** Вибивання та висушування на сонці
- C** Обробка пилососом
- D** Кварцювання
- E** Обробка гарячим паром в автоклаві

101

Пацієнтові пульмонологічного відділення для лікування пневмонії лікар призначив внутрішньом'язове введення цефтриаксону. Яку дозу антибіотика має ввести пацієнту медсестра, виконуючи внутрішньошкірну пробу на чутливість?

- A** \*1 000 ОД
- B** 5 000 ОД
- C** 10 000 ОД

- D** 100 000 ОД
- E** 250 000 ОД

102

Пацієнту призначено внутрішньом'язове введення 1 мл 5% олійного розчину вітаміну Є , але він відмовляється від ін'єкції через побоювання можливої емболії. Медсестра пояснила пацієнту, що для запобігання цього ускладнення вона:

- A** \*Перевірить, чи не потрапила голка у судину
- B** Зробить масаж після ін'єкції
- C** Якомога швидше введе препарат
- D** Прикладе до місця ін'єкції грілку
- E** Суворо дотримається правил асептики

103

Під час взяття крові у пацієнта для біохімічного дослідження через порушення техніки виконання маніпуляції відбулося потраплення крові в очі медсестри. Як повинна діяти медсестра, відповідно до наказу МОЗ № 120?

- A** \*Промити очі водою і закапати в них 30% розчин альбуциду
- B** Промити очі 0,02% розчином фурациліну
- C** Промити очі водою і закапати в них розчин софрадексу
- D** Промити очі слаборожевим розчином перманганату калію
- E** Промити очі водою і закапати в них 3% розчин борної кислоти.

104

Лікар призначив взяти у пацієнта - учасника дорожньо-транспортної аварії кров для дослідження на наявність алкоголю. Який розчин використає медсестра для знезараження шкіри пацієнта:

- A** \*3% розчин пероксиду водню
- B** 0,5% розчин хлораміну
- C** 70% розчин етилового спирту
- D** 96% розчин етилового спирту
- E** Розчин стериліуму

105

Під час контролю якості передстерилізаційної обробки інструментів азопірамова проба виявилася позитивною. Якою повинні бути подальші дії медсестри?

- A** \*Повторити всі етапи передстерилізаційної очистки
- B** Ретельно промити інструменти під проточною водою
- C** Ретельно промити інструменти в миючому розчині
- D** Ретельно промити інструменти дистильованою водою
- E** Повторити пробу

106

Медсестра маніпуляційного кабінету, яка контролювала внутрішньовенне струминне введення ліків студенткою медколеджу, поцікавилася, коли треба зняти джгут:

- A** \*Після потраплення голки у вену
- B** Після введення лікарського засобу
- C** Під час введення лікарського засобу
- D** Після видалення голки з вени
- E** Після обробки спиртом місця ін'єкції

107

Пацієнтові з гіпертонічною кризою лікар призначив кровопускання. Яке оснащення найбільш гарантує дотримання інфекційної безпеки в ЛПЗ:

- A** \*Система для кровопускання одноразового використання
- B** Голка Дюфо з резиновою трубкою
- C** Голка довжиною 4-6 см та шприц ємністю 20 мл

- D* Інфузійна система одноразового використання
- E* Голка довжиною 4-6 см та стерильний флакон

108

Внаслідок проведеної внутрішньовенної інфузії на місці венепункції утворилася гематома. Що є найбільш вірогідною причиною цього ускладнення:

- A* \*Прокол обох стінок вени
- B* Ушкодження окістя
- C* Ушкодження нервового стовбура
- D* Прокол м'язів
- E* Дуже щільно накладений джгут

109

Для успішної допомоги пацієнтові у вирішенні його проблем медична сестра повинна їх розглядати з урахуванням пріоритетів. До проміжних пріоритетів належать такі, що:

- A* \*Не є невідкладними і безпечні для життя хворого
- B* Вимагають негайного вирішення
- C* Не мають прямого відношення до захворювання або діагнозу
- D* Ще не існують, але можуть виникнути з часом
- E* Мають пряме відношення до захворювання

110

Ви здійснили I етап і перейшли до II етапу медсестринського процесу. Що є метою цього етапу?

- A* \*Формування сестринського діагнозу
- B* Визначення ступеня досягнення мети
- C* Виконання плану сестринських втручань
- D* Визначення потреб пацієнта
- E* Формування бази даних про пацієнта

111

При наявності сестринського діагнозу "ожиріння, спричинене переїданням і недостатністю фізичної активності", яка з рекомендацій медичної сестри була б найефективнішою:

- A* \*Рекомендації з раціонального харчування та занять фізичними вправами
- B* Направлення пацієнта на консультацію до дієтолога
- C* Визначення факторів, що призвели до ожиріння
- D* Роз'яснення пацієнтові проблем, що можуть виникнути при ожирінні
- E* Рекомендації родичам з приводу харчування пацієнта та фізичної активності

112

Медична сестра здійснює IV етап сестринського процесу. Яка мета даного етапу сестринського процесу?

- A* \*Виконання плану сестринських втручань
- B* Визначення критеріїв оцінки догляду
- C* Складання плану сестринських втручань
- D* Збір та аналіз одержаної інформації
- E* Формування сестринського діагнозу

113

Практична діяльність медичної сестри характеризується певними стандартами. Стандарти - це положення, які визначають:

- A* \*Об'єм, цінність та якість діяльності
- B* Основні функції сестринської справи
- C* Мету надання допомоги і догляду пацієнтам
- D* Вибір системи організації сестринської допомоги
- E* Межі співпраці медсестри з іншими спеціалістами

114

Дієтотерапія пацієнтів базується на певних принципах. Коригуючий принцип лікувального харчування передбачає:

- A** \*Зменшення [збільшення] в харчовому раціоні того чи іншого продукту
- B** Кількісне обмеження їжі
- C** Введення в організм продуктів, в яких він має недостачу
- D** Виключення з раціону грубої, важкоперетравлюваної їжі
- E** Спеціальна кулінарна обробка продуктів

115

Пацієнту, що страждає на хронічний холецистит, лікар призначив дієту № 5. Як медична сестра повинна пояснити пацієнту та його родичам мету цієї дієти?

- A** \*Хімічне щадіння печінки в умовах повноцінного харчування, покращення жовчовиділення
- B** Підтримання загальних сил організму і підвищення його опірності
- C** Нормалізація обміну речовин, покращення кровообігу
- D** Забезпечення фізіологічно повноцінного харчування
- E** Покращення виведення із організму продуктів обміну речовин

116

При передачі чергування у відділенні медсестра доповіла, що у пацієнта з пневмонією сильний головний біль, відчуття жару, температура 39,2°C. Яке незалежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі?

- A** \*Прикласти до голови холодний компрес, обтерти тіло холодною водою
- B** Змінити натільну білизну, напоїти чаєм
- C** Обмити тіло водою з милом, укрити ковдрою
- D** Заспокоїти, створити положення за Фаулером
- E** Поставити банки повздовж хребта

117

На третій день після застосування п'явок пацієнтка поскаржилася на свербіж та нагноєння навколо ранок. Що є причиною такого ускладнення?

- A** \*Інфікування ранок
- B** Тривала кровотеча з ранок
- C** Невірно обрана ділянка для постановки п'явок
- D** Підшкірні крововиливи
- E** Підвищений артеріальний тиск

118

Пацієнтові з підозрою на лямбліоз лікар призначив дуоденальне зондування. Як правильно зібрати і відправити матеріал на лабораторне дослідження?

- A** \*Порцію B відправити в лабораторію в теплому вигляді
- B** Порцію B і C відправити в лабораторію в теплому вигляді
- C** Порцію A відправити в лабораторію в теплому вигляді
- D** Порцію C помістити в посуд з теплою водою
- E** Порцію A B C відправити в лабораторію

119

Після госпіталізації хворого в інфекційне відділення лікарні, медсестра повинна провести дезінфекцію квартири. Який це вид дезінфекції?

- A** \*Вогнищева заключна дезінфекція
- B** Профілактична дезінфекція
- C** Вогнищева поточна дезінфекція
- D** Дератизація
- E** Дезінсекція

120

У хворого виник гострий біль в ділянці серця і задишка. Яке положення повинна надати медсестра пацієнту?

- A** \*Напівлежаче в ліжку або сидяче в кріслі
- B** Лежаче з опущеним головним кінцем
- C** Положення Сімса
- D** Лежаче на животі
- E** Лежаче на поразеній стороні

121

Пацієнту К., 49 р., після оперативного втручання на стравоход призначили штучне годування через зонд. Медична сестра готує:

- A** \*Стерильний тонкий шлунковий зонд
- B** Стерильний товстий шлунковий зонд
- C** Дуоденальний зонд з оливою
- D** газовідвідну трубку
- E** Катетер

122

Який першочерговий захід необхідно запланувати медсестрі при догляді за хворим з гарячкою в третій стадії?

- A** \*Контроль пульсу і артеріального тиску
- B** Зміна постільної білизни, вимірювання пульсу
- C** Вимірювання  $t^{\circ}$  тіла і пульсу
- D** Контроль за диханням і артеріальним тиском
- E** Провітрювання кімнати, вимірювання температури

123

Пацієнтові призначено 20 ОД інсуліну підшкірно. Доза інсуліну 100 ОД в одному мл.

Медична сестра виконує ін'єкцію інсуліну за 30 хвилин до сніданку, набравши в шприц:

- A** 0,2 мл
- B** 0,3 мл
- C** 0,4 мл
- D** 0,5 мл
- E** 0,6 мл

124

Медична сестра процедурного кабінету контролює термін придатності стерильних розчинів.

Стерильні розчини, виготовлені в аптеці і закупорені корками під обкатку, зберігаються:

- A** \*Не більше 10 діб
- B** Не більше 3 діб
- C** Не більше 2 діб
- D** Не більше 7 діб
- E** Не більше місяця

125

Медична сестра виконує внутрішньом'язову ін'єкцію у передньо-зовнішню поверхню стегна, захоплює шкіру лівою рукою у складку, голку вводить під кутом:

- A** \*70°
- B** 40°
- C** 90°
- D** 45°
- E** 30°

126

Пацієнту з нирковою колькою медична сестра відпускає гарячу ванну. Вкажіть температуру води та тривалість ванни:

- A** \*Температура води 40°C, тривалість 10-15 хв.
- B** Температура води 34-36°C, тривалість 20 хв.
- C** Температура води 36-39 °C, тривалість 20-30 хв.
- D** Температура води 28-30°C, тривалість 3-5 хв.
- E** Температура води 24-27°C, тривалість 1-3 хв.

127

Пацієнт знаходиться в стані гарячки, скаржиться на відчуття жару, загальну слабкість, сухість у роті. Шкіра обличчя червона, гаряча на дотик, губи вкриті кірками. Медична сестра, здійснюючи догляд за пацієнтом, прикладає холодний компрес до чола в першу чергу з такою метою:

- A** \*Посилення тепловіддачі
- B** Зменшення тепловіддачі
- C** Зменшення головного болю
- D** Зменшення запального процесу
- E** Збільшення кровонаповнення судин

128

У пацієнта діагностована пневмонія, йому призначено цефтріаксон. Пацієнт має схильність до алергійних реакцій на знеболюючі препарати. Для проведення проби на чутливість до цефтріаксону медсестра з метою розведення антибіотика використовує такий розчин:

- A** \*0,9% розчин натрію хлориду
- B** 10% розчин натрію хлориду
- C** Воду для ін'єкцій
- D** 0,25% розчин новокаїну
- E** 1% розчин новокаїну

129

Медсестра проводить інгаляцію кисню пацієнту через носовий катетер від централізованої подачі. Для запобігання розвитку пролежнів слизової оболонки носових ходів необхідно:

- A** \*Змінювати положення катетера в носових ходах кожні 30-40 хвилин
- B** Забезпечити концентрацію кисню в повітрі до 30-40%
- C** Відрегулювати оптимальну дозу кисню 4-6 л за хвилину
- D** Зволожувати кисень через апарат Боброва водою
- E** Змочувати катетер стерильним ізотонічним розчином натрію хлориду і вводити на глибину 15 см

130

Медична сестра досліджує пульс пацієнта, у якого визначено високий артеріальний тиск. Вона з'ясувала, що пульс твердий. Це свідчить про порушення такої властивості пульсу:

- A** \*Напруження
- B** Ритм
- C** Частота
- D** Наповнення
- E** Дефіцит

131

Пацієнт, що страждає на серцеву недостатність, скаржиться медсестрі на задишку при фізичному навантаженні та виділення більшої кількості сечі вночі ніж вдень. Це заважає йому відпочивати. Таке явище називається:

- A** \*Ніктурія
- B** Олігурія

- C* Поліурія
- D* Анурія
- E* Ішурія

132

У пацієнта серцево-судинна патологія. Він не знає, скільки можна вживати рідини на добу, боїться виникнення набряків. Медсестра навчає пацієнта контролювати добовий діурез та кількість вжитої рідини, пояснює їх нормальне співвідношення. В нормі добовий діурез становить:

- A* 70-80 % від усієї вжитої рідини
- B* 60-75 % від усієї вжитої рідини
- C* 55-60 % від усієї вжитої рідини
- D* 45-50 % від усієї вжитої рідини
- E* 85-90 % від усієї вжитої рідини

133

Пацієнтка похилого віку страждає стійкими закрепам, випорожнення відсутні більше 4 діб, відсутній ефект від очисної та послаблюючих клізм, медсестра готує пацієнтку до сифонної клізми. Механізм дії сифонної клізми такий:

- A* \*Механічно вимиває кал, справляє подразнюючу дію на стінки кишок, активізує перистальтику
- B* Обволікає кал, полегшує його виділення, нормалізує перистальтику
- C* Розріджує та вилучає калові маси з нижніх відділів товстої кишки
- D* Сприяє інтенсивному надходженню міжклітинної рідини до товстої кишки, розріджує кал, активізує перистальтику
- E* Справляє місцеву протизапальну та обволікальну дію на слизову оболонку товстої кишки

134

Медична сестра проводить медсестринське обстеження пацієнта, використовує суб'єктивні та об'єктивні методи дослідження, результати додаткових обстежень. Мета обстеження: створити інформаційну базу даних про стан пацієнта. Зібрані дані медсестра запише до:

- A* \*Сестринської історії здоров'я
- B* Плану сестринського догляду
- C* Листа первинної оцінки стану пацієнта
- D* Амбулаторної карти пацієнта
- E* Медичної карти стаціонарного хворого

135

Медична сестра аналізує отримані дані про пацієнта, визначає всі наявні або потенційні відхилення від комфортного гармонійного стану, встановлює, що найбільш обтяжує пацієнта на цей момент, формулює сестринський діагноз. Це етап сестринського процесу:

- A* \*II етап
- B* I етап
- C* III етап
- D* IV етап
- E* V етап

136

Пацієнту з серцевою недостатністю проведено кровопускання. Медична сестра здійснює контроль за пульсом, артеріальним тиском та рекомендує йому дотримуватись суворого ліжкового режиму з метою попередження такого ускладнення, як:

- A* \*Ортостатичний колапс
- B* Непритомність
- C* Шок
- D* Напад ядухи
- E* Тромбоемболія

137

Пацієнт, що страждає на серцеву недостатність, скаржиться медсестрі на задишку при фізичному навантаженні та виділення більшої кількості сечі вночі ніж вдень. Це заважає йому відпочивати. Таке явище називається:

- A** \*Ніктурія
- B** Олігурія
- C** Поліурія
- D** Анурія
- E** Ішурія

138

Досліджуючи основні параметри пульсу, медсестра з певною силою притискає артерію до внутрішньої поверхні променевої кістки для припинення пульсації. Яку властивість пульсу визначає медсестра?

- A** \*Напруження
- B** Частоту
- C** Ритм
- D** Глибину
- E** Наповнення

139

Внаслідок можливого дефекту виготовлення ін'єкційна голка під час її введення у м'які тканини може раптово відлапатися від муфти. З метою профілактики даного ускладнення голку необхідно вводити:

- A** \*На 2/3 довжини
- B** На 1/2 довжини
- C** На 1/4 довжини
- D** На 2/5 довжини
- E** На 1/3 довжини

140

У маніпуляційному кабінеті після в/нутрішньом'язового введення антибіотика (500 000 ОД бензилпеніциліну натрієвої солі) пацієнт раптово відчув різку загальну слабкість, напад кашлю, ядуху, серцебиття. Артеріальний тиск - 85/50 мм рт.ст. Назвіть ускладнення, що виникло:

- A** \*Анафілактичний шок
- B** Токсико-інфекційний шок
- C** Кардіогенний шок
- D** Колапс
- E** Непритомність

141

Назвіть біологічно активну речовину, що міститься у секреті слинних залоз п'явки і має здатність гальмувати процеси згортання крові:

- A** \*Гірудин
- B** Лізоцим
- C** Мірозин
- D** Дестабілаза
- E** Гепарин

142

До медичної сестри фізіотерапевтичного кабінету звернувся пацієнт, якому лікар призначив сеанси УФ-опромінення поперекової ділянки. Що повинна зробити медична сестра перед початком проведення процедури?

- A** \*Визначити біодозу опромінення
- B** Визначити частоту пульсу



- C* Визначити артеріальний тиск
- D* Виміряти температуру тіла
- E* Оглянути шкіру пацієнта

143

Пацієнтці з діагнозом: ожиріння II ст., яке не пов'язане із захворюваннями серцево-судинної та ендокринної систем, призначено дієтичне лікування. Дотримання якої дієти буде контролювати медична сестра?

- A* \*№ 8
- B* № 11
- C* № 10
- D* № 7
- E* № 5

144

Рациональне харчування базується на багатьох законах. Що передбачає закон адекватності харчування?

- A* \*Повноцінне постачання організму різними харчовими речовинами
- B* Дотримання режиму харчування
- C* Вживання санітарно доброякісної їжі
- D* Відповідність хімічного складу їжі особливостям обмінних процесів конкретної людини
- E* Вживання достатньої кількості вітамінів

145

Медична сестра реанімаційного відділення працює з наркотичними анальгетиками. Назвіть номер наказу МОЗ України "Про затвердження порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у державних і комунальних закладах охорони здоров'я України":

- A* \*356
- B* 740
- C* 234
- D* 223
- E* 38

146

При проведенні ін'єкцій медична сестра використовує медичні вироби одноразового використання. Назвіть основний метод промислової стерилізації медичних виробів (шприців) одноразового використання:

- A* \*Променевий
- B* Хімічний
- C* Газовий
- D* Термічний
- E* Механічний

147

Для індивідуального захисту від внутрішньолікарняної інфекції використовують маски. Вкажіть термін захисної дії маски.

- A* \*3 год.
- B* 2 год.
- C* 1 год.
- D* 4 год.
- E* 5 год.

148

Виконуючи внутрішньовенну ін'єкцію, медсестра вкололася голкою. Вона негайно зняла рукавички, ретельно вимила руки милом під проточною водою, ушкоджене місце

обробила 70% розчином етилового спирту, наклала пластир та одягла напальчник.  
Вкажіть номер чинного наказу МОЗ України відповідно до якого діяла медсестра:

- A** \*120
- B** 234
- C** 408
- D** 720
- E** 181

149

З метою профілактики пролежнів медсестра розмістила пацієнта в положенні Сімса.  
Охарактеризуйте дане положення:

- A** \*Проміжне між положенням на животі та на боку
- B** Положення на животі
- C** Положення на боку
- D** Положення на спині
- E** Напівсидяче положення

150

Медична сестра, здійснюючи медсестринський процес, документує отримані дані.  
Виберіть документ, в якому фіксується III етап медсестринського процесу.

- A** \*План сестринського догляду
- B** Медична карта стаціонарного хворого
- C** Медична карта амбулаторного хворого
- D** Лист лікарських призначень
- E** Температурний лист

151

У відділенні міської лікарні перебуває хвора, якій призначено взяття крові з вени для лабораторного дослідження. Назвіть види сестринського втручання, які виконує медична сестра на підставі розпоряджень лікаря.

- A** \*Залежні
- B** Незалежні
- C** Взаємозалежні
- D** Мед сестринські
- E** Лікарські

152

Медична сестра за призначенням лікаря здійснює фракційне зондування шлунка пацієнту К., 48 р. Виберіть ентеральний подразник для шлункового зондування.

- A** \*5% розчин етилового спирту
- B** 40% розчин глюкози
- C** 33% розчин магнію сульфату
- D** 10% розчин натрію хлориду
- E** 0,5% розчин новокаїну

153

Пацієнтці К., яка лікується з приводу хронічного гастриту, призначена дієта №1. Яка мета даної дієти?

- A** \*Обмеження механічного і хімічного подразнення слизової оболонки травного каналу
- B** Нормалізація секретної та моторної функції кишечника
- C** Нормалізація обміну пуринів
- D** Зменшення набряків
- E** Покращення кровообігу

154

Пацієнту Г., 67 р., що лікується стаціонарно з приводу тромбофлебиту, вводять гепарин підшкірно. Гепарин не вводять внутрішньом'язово через ризик виникнення:

- A** \*Гематоми
- B** Тромбофлебита
- C** Ліподистрофії
- D** Анафілактичного шоку
- E** набряку

155

Пацієнту П., що лікується стаціонарно з приводу крупозної пневмонії, лікар призначив внутрішньом'язово цефтріаксон по 1,0 г. Назвіть анатомічну ділянку, яку частіше вибирають для даної ін'єкції?

- A** \*Верхньозовнішній квадрант сідниці
- B** Зовнішню поверхню стегна
- C** Нижньозовнішній квадрант сідниці
- D** Внутрішню поверхню стегна
- E** Верхньовнутрішній квадрант сідниці

156

В реанімаційному відділенні медична сестра при дослідженні пульсу у тяжкохворого виявила, що частота пульсу складає 40 уд./хв. Як оцінити такий пульс?

- A** \*Брадикардія
- B** Тахікардія
- C** Аритмія
- D** Пароксизмальна тахікардія
- E** Ниткоподібний

157

Пацієнт 60 років знаходиться в пульмонологічному відділенні з приводу бронхіальної астми, його турбує задишка. Яке відповідне положення необхідно надати пацієнту при реалізації плану медсестринських втручань?

- A** \*Напівсидячи
- B** Лежачи
- C** З опущеним нижнім кінцем функціонального ліжка
- D** З опущеним головним кінцем функціонального ліжка
- E** З підвищеним нижнім кінцем функціонального ліжка

158

У пацієнта 28 років неприємні відчуття в надчеревній ділянці, блювання, яке приносить тимчасове полегшення. Він пов'язує свій стан із споживанням недоброякісної їжі. Яке залежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі в першу чергу?

- A** \*Промити шлунок
- B** Дати антациди
- C** Направити на УЗД
- D** Покласти міхур з льодом на епігастрій
- E** Дати проносні

159

Ви працюєте постовою медичною сестрою в хірургічному відділенні. Пацієнтці дві доби тому зроблена операція холецистектомії. Вона скаржиться на біль в животі, здуття його, невідходження газів. Яке залежне медсестринське втручання необхідно здійснити медичній сестрі на даному етапі?

- A** \*Ввести газовідвідну трубку
- B** Ввести спазмолітини
- C** Викликати лікаря
- D** Покласти міхур з льодом на живіт
- E** Ввести знеболюючі

160

Для проведення контролю стерилізації повітряним методом медична сестра приготувала пробірку з сахарозою. Зазначте, при якому режимі буде проводитися стерилізація.

- A** \*180°C - 1 година
- B** 180°C - 2,5 години
- C** 160°C - 2,5 години
- D** 132°C - 1 година
- E** 120°C - 2 години

161

Основою лікувально-охоронного режиму є суворе дотримання розпорядку дня. Коли медична сестра повинна проводити термометрію хворим у стаціонарі?

- A** \*Два рази на день: до ранкового туалету і після денного відпочинку
- B** Після сніданку та ввечері
- C** Один раз після обіду
- D** Після ранкового туалету
- E** Три рази на день

162

Пацієнту О., 68 років, який скаржиться на появу червоної крові у випорожненнях протягом місяця і слабкість, призначено ендоскопічне дослідження прямої кишки. До якого дослідження повинна підготувати пацієнта медична сестра?

- A** \*Ректороманоскопії
- B** Рентгенографії шлунка
- C** Фіброгастроскопії
- D** Іригоскопії
- E** Колоноскопії

163

Пацієнт Н., 58 років, здає сечу за Зимницьким. Що визначають у кожній з 8-ми порцій сечі за Зимницьким?

- A** \*Об'єм і відносну густину
- B** Кількість еритроцитів і циліндрів
- C** Кількість лейкоцитів, циліндрів
- D** Наявність білка і пігментів
- E** Наявність цукру і кетонових тіл

164

Медична сестра повинна відключити систему після введення інфузійних розчинів пацієнту. Для цього необхідно в першу чергу:

- A** \*Перекрити тік рідини затискачем
- B** Видалити голку з вени
- C** Видалити верхню голку системи з флакона
- D** Видалити голку – повітровід з флакона
- E** Прикласти стерильний ватний тампон до місця пункції.

165

В нічний час постова медсестра була викликана до хворого, який поскаржився на задишку. Який із заходів найпростішої фізіотерапії медсестра повинна застосувати?

- A** \*Оксигенотерапію
- B** Вакуумтерапію
- C** Гірудотерапію
- D** Бальнеотерапію
- E** Аутогемотерапію

166

Медична сестра навчає пацієнта принципам здорового способу життя. Який метод формування

здорового способу життя належить до засобів фізичного впливу на здоров'я?

- A** \*Ходьба
- B** Аутотренінг
- C** Санація вогнищ хронічної інфекції
- D** Особиста гігієна
- E** Раціональне харчування

167

За призначенням лікаря медична сестра готує пацієнта до обстеження шлунка. Визначте найбільш інформативний метод діагностики при захворюваннях шлунка.

- A** \*Фіброгастроудоденоскопія
- B** Рентгенографія шлунка
- C** Аналіз кала на приховану кров
- D** Зондування шлунка
- E** Ph-метрія

168

У пацієнтки Т., 60 років, масою тіла 105 кг, відмічається повна нерухомість (стан коми), нетримання сечі, калу. Яку мінімальну кількість балів за шкалою Нортон отримає пацієнтка:

- A** \*5 балів
- B** 8 балів
- C** 10 балів
- D** 12 балів
- E** 15 балів

169

Медична сестра інфекційної лікарні навчає пацієнта К., 65 років, з діагнозом "гострий гепатит" основам дієтичного харчування в домашніх умовах. На якому етапі медсестринського процесу вона це здійснює?

- A** \*IV
- B** I
- C** V
- D** II
- E** III

170

Медична сестра встановила наявні та потенційні проблеми у пацієнта, що знаходиться на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні з приводу інфаркту міокарда. Який етап медсестринського процесу вона здійснила?

- A** \*II
- B** IV
- C** V
- D** I
- E** III

171

Пацієнт визнає факт наявних змін у стані свого здоров'я із врахуванням медичного висновку і співпрацює з медичним персоналом для отримання позитивного результату. Який вид ставлення у пацієнта до хвороби?

- A** \*Адекватне
- B** Негативне
- C** Зверхне
- D** Позитивне
- E** Байдуже

172

Медична сестра здійснює оцінку психічного стану пацієнта. До вербальних форм поведінки належать:

- A** \*Голос, манера говорити, логіка
- B** Зоровий контакт
- C** Міміка
- D** Поза
- E** Жести

173

Після дорожньо-транспортної пригоди до реанімаційного відділення машиною швидкої допомоги доставлений пацієнт К., 52 р. в непритомному стані. Фізичний стан пацієнта дуже важкий, пацієнт лежачий, рухомість відсутня, ступор, постійне нетримання сечі та калу. Як оцінити у балах ризик розвитку пролежнів у пацієнта за шкалою Нортон?

- A** \*5
- B** 12
- C** 14
- D** 10
- E** 20

174

Пацієнтка К. 52 р. поступила в торакальне відділення онкодиспансеру з діагнозом “рак легенів” зі скаргами на слабкість, зниження працездатності, підвищення температури тіла до 37,2°C, задишку, кровохаркання. Медична сестра встановлює пріоритетність вирішення проблем пацієнта. Яка проблема пацієнта потребує першочергового вирішення?

- A** \*Кривохаркання
- B** Задишка
- C** Кашель
- D** Слабкість
- E** Гарячка

175

Дієтична медична сестра складає харчовий раціон на пацієнтів у відділенні, враховуючи енергетичну цінність їжі. Скільки кілокалорій утворюється при згоранні 1 г жиру?

- A** \*9,3
- B** 4,1
- C** 2,5
- D** 4,6
- E** 8,4

176

Під час проведення передстерилізаційної обробки інструментів медична сестра ЦСВ приготувала реактив бензидину та нанесла 3 краплі на підготовлені інструменти. Що визначає медична сестра за допомогою даної проби?

- A** \*Залишки крові
- B** Залишки миючого засобу
- C** Залишки ліків
- D** Залишки дезінфікуючого розчину
- E** Залишки олії

177

У пацієнта К, 53 р., який знаходиться на лікуванні у неврологічному відділенні з приводу важкого розладу мозкового кровообігу з'явилося рівномірне за глибиною дихання з паузами до 30 сек. Який патологічний тип дихання спостерігається у пацієнта?

- A** \*Біота
- B** Куссмауля

- C* Чейна-Стокса
- D* Астма
- E* Ядуха

178

Пацієнта Н. 42 р., госпіталізовано на стаціонарне лікування інфекційної лікарні з приводу вірусного гепатиту В. Який вид дезінфекції необхідно здійснити у помешканні пацієнта?

- A* \*Вогнищеву заключну
- B* Профілактичну
- C* Повітряну
- D* Парову
- E* Вогнищеву поточну

179

Під час підмивання пацієнтки з надмірною вагою, медична сестра виявила гіперемію у ділянці пахових складок. Подальша тактика медичної сестри під час догляду за пацієнткою передбачає:

- A* \*Застосування присипки
- B* Застосування пластира
- C* Застосування пасти
- D* Застосування бовтанки
- E* Обробка 70° етилового спирту

180

Медична сестра терапевтичного відділення здійснила пацієнтці М. 54 р. внутрішньовенне краплинне введення 0,9% розчину натрію хлориду, використовуючи одноразову систему. Який метод дезінфекції доцільно застосувати?

- A* \*Пропускання через систему дезрозчину з наступним замочуванням в дезрозчині і промивання водою
- B* Занурення в дезрозчин
- C* Пропускання через систему дезрозчину
- D* Промивання під проточною водою
- E* Протирання одним із дезрозчинів

181

Пацієнту терапевтичного відділення П., 65 р., зі стійким закрепом, лікар призначив здійснити гіпертонічну клізму. Для виконання маніпуляції медична сестра повинна приготувати:

- A* \*10% розчин натрію хлориду
- B* 2% розчин натрію гідрокарбонату
- C* 0,9% розчин натрію хлориду
- D* 4% розчин калію хлориду
- E* 1% розчину кальцію хлориду

182

Після оперативного втручання з приводу гострого холецистити у пацієнтки В., 43 р., спостерігається затримка сечовиділення понад 12 годин. Яке залежне медсестринське втручання повинна виконати медична сестра?

- A* \*Здійснити катетеризацію сечового міхура
- B* Ввести спазмолітичні препарати
- C* Дати сечогінні препарати
- D* Дати тепле пиття
- E* Почекати самостійне сечовиділення

183

Медична сестра ЦСВ готує до стерилізації гумові рукавички. Вкажіть відповідний режим стерилізації гумових виробів паровим методом.

- A** \*Тиск - 1,1 атм. t - 120°C, 45 хв.
- B** Тиск - 2 атм. t - 132°C, 20 хв.
- C** Тиск - 1,5 атм. t - 130°C, 20 хв.
- D** Тиск - 1, 5 атм. t - 132°C, 25 хв.
- E** Тиск - 0,5 атм. t - 110°C, 45 хв.

184

У пацієнта К., 60 р. який знаходиться на тривалому суворому постільному режимі, внаслідок чого є ризик виникнення пролежнів в ділянці крижової кістки. З метою профілактики пролежнів ділянку тіла доцільно обробляти:

- A** \*10% розчином камфорного спирту
- B** 96% етиловим спиртом
- C** 1% розчином діамантового зеленого
- D** 5% розчином йоду спиртового
- E** 10% синтоміциновою маззю

185

У приймальному відділенні під час огляду волосистої частини голови у пацієнта Р., 40 р. виявлено педикульоз. Який дезіксенційний засіб варто застосовувати?

- A** \*Педилін
- B** 5% борну мазь
- C** 0,1% розчин дезоксону
- D** 10% розчин оцтової кислоти
- E** 2% розчин натрію гідрокарбонату

186

В ендокринологічному відділенні лікується пацієнт Б., 53 р. з діагнозом "цукровий діабет". Медична сестра навчає пацієнта принципам дієти. Про яку дієту йдеться?

- A** \*№ 9
- B** № 10
- C** № 5
- D** № 7
- E** № 8

187

Після проведення внутрішньовенної ін'єкції пацієнт П., 28 р., скаржиться на біль у місці ін'єкції, почервоніння і припухлість по ходу вени. Це ускладнення має назву:

- A** \*Флебіт
- B** Емболія
- C** Сепсис
- D** Колапс
- E** Інфільтрат

188

Пацієнту В., 42 р., з діагнозом "хронічний гастрит" призначено ендоскопічне дослідження шлунка і дванадцятипалої кишки. Це дослідження має назву:

- A** \*Езофагогастродуоденоскопія
- B** Іригоскопія
- C** Цистоскопія
- D** Бронхоскопія
- E** Ректороманоскопія

189

Медична сестра навчає молодшу медичну сестру готувати робочий розчин хлораміну. Для приготування 3 л 3% р-ну хлораміну необхідно взяти:

- A** \*90 г хлораміну і 2910 мл води



- B** 9 г хлораміну і 2991 мл води
- C** 30 г хлораміну і 2970 мл води
- D** 300 г хлораміну і 2700 мл води
- E** 3 г хлораміну і 2997 мл води

190

Медична сестра пояснює пацієнтці правила збирання сечі для загального клінічного дослідження. Перед збиранням сечі жінка повинна здійснити туалет зовнішніх статевих органів. Яку порцію сечі із сечовипускання необхідно зібрати?

- A** \*Середню порцію
- B** Першу порцію
- C** Останню порцію
- D** Всю сечу
- E** Тільки вранішню

191

При інгаляції лікарські препарати вводять в організм у дрібно розсіяному аерозолі або газоподібному стані. Назвіть спосіб застосування ліків?

- A** \*Зовнішній
- B** Внутрішній
- C** Парентеральний
- D** Сублінгвальний
- E** Пероральний

192

Старша медична сестра відділення для отримання ліків з аптеки випишує вимогу-накладну. Найменування яких лікарських засобів обов'язково необхідно писати латинською мовою?

- A** \*Наркотичних анальгетиків
- B** Екстемпоральних
- C** Внутрішнього застосування
- D** Парентерального введення
- E** Заводського виготовлення

193

Пацієнту К. 42 років в урологічному відділенні лікар призначив обстеження концентраційної і фільтраційної здатності нирок. Який метод дослідження сечі визначає ці функції нирок?

- A** \*За Зимницьким
- B** За Нечипоренко
- C** За Аддіс-Каковським
- D** За Амбурже
- E** Аналіз сечі на діастазу

194

Медична сестра проводить навчання з пацієнтом, який хворий на цукровий діабет. Вона пояснює йому техніку введення інсуліну інсуліновим шприцом та голкою довжиною 1,5 см. Під яким кутом необхідно вводити голку?

- A** \*90°
- B** 60°
- C** 50°
- D** 45°
- E** 35°

195

Пацієнт Р., 54 р., знаходиться на стаціонарному лікуванні в хірургічному відділенні з приводу механічної кишкової непрохідності. Яке залежне медсестринське втручання

необхідно здійснити медичній сестрі для передопераційної підготовки?

- A** \*Сифонну клізму
- B** Очисну клізму
- C** Олійну клізму
- D** Гіпертонічну клізму
- E** Медикаментозну клізму

196

Медична сестра поставила хворому олійну клізму. Вона повинна попередити, що проносний ефект настає через:

- A** \*10-12 годин
- B** 10-12 хвилин
- C** 20-30 хвилин
- D** 5-7 годин
- E** 1-2 години

197

Сімейна медична сестра при здійсненні медсестринського процесу навчає пацієнта та його родичі техніці визначення водного балансу в домашніх умовах. При визначенні водного балансу необхідно підрахувати:

- A** \*Співвідношення кількості виділеної сечі до кількості вжитої рідини за добу
- B** Тільки кількість вжитої рідини за добу
- C** Тільки кількість виділеної сечі за добу
- D** Тільки кількість рідини, введеної парентерально
- E** Тільки кількість сечі, виділеної за день

198

Пацієнт Д., 59 років, лікується в кардіологічному відділенні з приводу хронічної серцевої недостатності. Лікар призначив щоденний контроль артеріального тиску. Медична сестра накладає манжетку на ділянку плеча. Як перевірити правильність накладання манжетки?

- A** \*Перевірити, щоб між манжеткою і тілом проходив тільки один палець
- B** Знайти пульсацію плечової артерії
- C** Закрити вентиль на груші за годинниковою стрілкою
- D** Прикласти фонендоскоп до місця пульсації і нагнати повітря у манжетку
- E** Перевірити положення стрілки монетра відносно нульової поділки

199

В кардіологічному відділенні лікується пацієнт Д., 50 років з приводу гіпертонічної кризи. В температурному листку зазначено: "Випорожнення кишківника відсутні протягом трьох діб". До постановки якої клізми повинна підготуватись медична сестра?

- A** \*Гіпертонічної
- B** Емульсійної
- C** Сифонної
- D** Очисної
- E** Олійної

200

Скільки грамів дезактину медична сестра повинна зважити на аналітичних вагах для приготування 3-х літрів 0,2% розчину дезактину?

- A** \*6 г
- B** 0,2 г
- C** 0,6 г
- D** 20 г
- E** 60 г

201

Медична сестра гастроентерологічного відділення виконує залежне сестринське втручання пацієнту К., 35 років із загостренням хронічного ентероколіту – медикаментозну мікроклизму з 50 мл відвару ромашки. На яку глибину у пряму кишку вона повинна ввести газовивідну трубку?

- A** \*12-15 см
- B** 5-7 см
- C** 7-10 см
- D** 20-30 см
- E** 30-40 см

202

Медична сестра готує інструменти до стерилізації у сухожаровій шафі. Яку речовину використовують для контролю температурного режиму 180°C при повітряному методі стерилізації?

- A** \*Тіосечовина
- B** Винна кислота
- C** Розчин фенолу
- D** Нікотинамід
- E** Азопірам

203

Пацієнтка Л., у віці 76 р. госпіталізована у неврологічне відділення з гострим порушенням мозкового кровообігу. У пацієнтки паралізована ліва частина тіла. Під час огляду пацієнтки: маса тіла вище середньої, шкіра суха, нетримання калу й сечі, рухливість обмежена, апетит поганий. Оцініть ризик розвитку пролежнів за шкалою Braden?

- A** \*Високий ризик
- B** Низький ризик
- C** Помірний ризик
- D** Середній ризик
- E** Недостатній ризик

204

Пацієнту К. 45 років лікар призначив закапування в очі 30% розчину сульфацил-натрію. Медична сестра закапала пацієнту в очі по 2 краплі лікарської речовини. Чому не доцільно вводити в очі не більше 1-2 крапель лікарської речовини ?

- A** \*У кон'юнктивальному мішку вміщається лише 1 краплина розчину
- B** Очні краплі містять сильнодіючі речовини
- C** Велика кількість рідини негативно вплине на стан кон'юнктиви
- D** Більша кількість лікарського розчину спричинить запальний процес на слизовій ока
- E** Велика кількість розчину нерівномірно розподіляється в слизовій ока

205

За призначенням лікаря медична сестра повинна ввести пацієнту 16 ОД інсуліну. Скільки мілілітрів відповідають 16 ОД простого інсуліну, набрані в шприц місткістю 2 мл, якщо в 1 мл міститься 40 ОД інсуліну?

- A** \*0,4 мл
- B** 0,8 мл
- C** 0,9 мл
- D** 1,0 мл
- E** 0,5 мл

206

Пацієнт А., 22 р., лікується з приводу ревматичної хвороби. За призначенням лікаря медична сестра повинна ввести пацієнту біцилін-5. Назвіть правила введення біциліну.

- A** \*Шприц місткістю 10 мл, голка з широким просвітом, внутрішньом'язево двоментно
- B** Використовують як розчинник 2% розчин новокаїну
- C** Шприц місткістю 2 мл, підшкірно
- D** Перед набиранням флакон з ліками підігрівають на водяній бані до температури 25-30°C
- E** Вміст флакона розчиняють за 30 хв. до введення

207

Пацієнту 52 років, який хворіє на інфекційний міокардит, уперше призначено введення бензилпеніциліну. Медична сестра проводить пробу на індивідуальну чутливість до антибіотика. Яку голку вона використає для проведення внутрішньошкірної ін'єкції ?

- A** \*Завдовжки 15 мм, діаметром 0,4 мм
- B** Завдовжки 20 мм, діаметром 0,6 мм
- C** Завдовжки 40 мм, діаметром 0,8 мм
- D** Завдовжки 50 мм, діаметром 0,3 мм
- E** Завдовжки 60 мм, діаметром 0,8 мм

208

Медична сестра приймального відділення проводить обстеження пацієнта, визначає функціональні показники: температуру тіла, АТ, ЧСС, ЧДР, зріст, масу тіла. Який етап медсестринського процесу вона здійснює?

- A** \*I
- B** II
- C** III
- D** IV
- E** V

209

Медична сестра готує пацієнта до УЗД органів черевної порожнини. Яке незалежне медсестринське втручання вона здійснює?

- A** \*Бесіда про необхідність дослідження й навчання підготовки до нього
- B** Проведення очисної клізми
- C** Введення заспокійливих препаратів
- D** Вимірювання артеріального тиску
- E** Проведення проби на чутливість до контрастної речовини

210

Про вдосконалення організації медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД йдеться в наказі №:

- A** \*120
- B** 288
- C** 408
- D** 720
- E** 38

211

Пацієнтка К. 38 років, скаржиться на слабкість, відсутність апетиту, нудоту, печію, біль в епігастральній ділянці, метеоризм. Лікар призначив діету №1. Пацієнтка звернулася до медичної сестри з проханням пояснити їй мету призначеної дієти та порадити перелік продуктів, які вона може вживати. Назвіть пріоритетну проблему пацієнтки?

- A** \*Дефіцит знань про призначену дієту
- B** Біль в епігастральній області
- C** Метеоризм
- D** Відсутність апетиту
- E** Слабкість

212

Пацієнтка 3. 42 років, скаржиться на розпираючий біль у животі, відсутність випорожнень протягом 3 діб. У своїй дієті дотримується обмежень, побоюючись загострення хвороби. Лікар призначив їй очисну клізму. Скільки води і якої температури необхідно підготувати для постановки очисної клізми?

- A** \*1,5 л, t° - 28°C
- B** 150 мл, t° - 37°C
- C** 1,5 л, t° - 37°C
- D** 2 л, t° - 30°C
- E** 0,5 л, t° - 35°C

213

Пацієнт лежить у тому положенні, яке йому надали, не може самостійно повертатись, піднімати голову, верхні та нижні кінцівки. Яке положення в ліжку займає пацієнт?

- A** \*Пасивне
- B** Вимушене
- C** Вимушене пасивне
- D** Активне
- E** Вимушене активне

214

Хворому М., 62 років, з інфарктом міокарду було призначено ін'єкції гепарину. В яку ділянку найдоцільніше виконувати ін'єкції?

- A** \*Ділянку живота
- B** Передньозовнішня поверхня стегна
- C** Внутрішня поверхня передпліччя
- D** Підлопаткова ділянка
- E** Верхньозовнішній квадрант сідниці

215

Під час здійснення III етапу медсестринського процесу медична сестра має на меті:

- A** \*Скласти план медсестринських втручань
- B** Виявити та сформулювати проблеми пацієнта
- C** Визначити мету медсестринських втручань
- D** Здійснити суб'єктивне та об'єктивне обстеження пацієнта
- E** Оцінити отримані результати

216

Пацієнт, 63 роки, чотири тижні тому потрапив в нейрохірургічне відділення після тяжкої черепно-мозкової травми. Хворому призначено суворий ліжковий режим. В області лопаток, хребта, ліктів та п'яток відмічається неглибоке порушення цілостності шкіри, стійка гіперемія, відшарування епідермісу, мокнуття. Який засіб необхідно застосувати для обробки шкіри в уражених місцях?

- A** \*5% розчин калію перманганату.
- B** Змащування 40% розчином етилового спирту.
- C** Змащування 70% розчином етилового спирту.
- D** 1% розчин діамантового зеленого.
- E** Саліциловий спирт.

217

Медична сестра пульмонологічного відділення здійснює медсестринський процес у хворого з гарячкою. III етап медсестринського процесу вона документує у:

- A** \*План догляду за пацієнтом
- B** Історія хвороби
- C** Листок медсестринського обстеження пацієнта
- D** Листок оцінки якості догляду
- E** Карта спостереження за хворим