

Крок М Лікувальна справа
Педіатрія

1

Від чого залежить схильність нервової тканини новонародженого до частого розвитку набряку?

- A** *значна васкуляризація сірої речовини
- B** відсутність мієлінової оболонки нервового волокна
- C** слабкий розвиток дендритів нейрона
- D** мала кількість зрілих нейронів
- E** слабка диференціація сірої речовини мозку від білої

2

Який рівень нормального вмісту кальцію у сироватці крові потрібен для правильного розвитку кісток?

- A** *2,25-2,5 ммоль/л
- B** 1-1,5 ммоль/л
- C** 1,75-2,0 ммоль/л
- D** 2,5-2,75 ммоль/л
- E** 2,75-3,0 ммоль/л

3

Вкажіть, які харчові продукти вводять дитині на природному годуванні з метою введення вітамінів:

- A** *яблучний сік
- B** білок курячого яйця
- C** 12% гречану кашу
- D** овочевий відвар
- E** 5% манну кашу

4

Яким має бути співвідношення між основними харчовими інгредієнтами при харчуванні для дітей переддошкольного віку:

- A** *1:1:4
- B** 2:4:2
- C** 1:3:5
- D** 2:3:4
- E** 1:1:3

5

З яким інтервалом проводиться вакцинація при дифтерії?

- A** *30 днів
- B** 45 днів
- C** 20 днів
- D** 60 днів
- E** 15 днів

6

Дитина 5 років захворіла гостро, через 2 дні після грипу. На шкірі нижніх кінцівок поліморфні, симетрично розташовані геморагічно-папульозні висипи, які скупчені навколо суглобів. Визначте діагноз:

- A** *геморагічний васкуліт, шкірна форма
- B** геморагічний васкуліт, абдомінальна форма
- C** кір
- D** хвороба Верльгофа
- E** Менінгококцемія

7

У дитини з народження спостерігаються задишка, тахікардія, ціаноз шкіри, грубий серцевий шум, що поширений по всій ділянці грудної клітки, розширення меж серця. Така симптоматика діагностується при:

- A** природженій ваді серця
- B** вегето-судинній дистонії
- C** ревматизмі

D малій хорей
E інфекційному міокардиті

8

У дитини 2 років температура 38°C, в'ялість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу. Шкіра бліда, періоральний ціаноз. Такі симптоми визначають при:

A *гострій пневмонії
B гострої ларингіті
C назофарингіті
D бронхіальній астмі
E гострому бронхіті

9

В стадії неповної компенсації гострого стенозуючого ларинготрахеїту розвивається:

A *ціаноз носогубного трикутника
B експіраторна задишка
C кінцеві фаланги у вигляді барабаних паличок
D гіперемія мигдаликів
E задишка змішаного типу

10

До якого захворювання частіше призводять такі чинники як: надмірне споживання солодощів, жирної їжі, а також перенесена паротитна інфекція:

A *хронічного панкреатиту
B стоматиту
C виразкової хвороби
D ентериту
E коліту

11

У дитини в 3 місяця асиметрія голови, плоска потилиця, велике тім'ячко 4,5x5 см. Симптоми вказують на:

A *рахіт
B гіпервітаміноз Д
C алергічний діатез
D спазмофілію
E гіпотрофію

12

Назвіть об'єктивні симптоми, що характерні для ревматичного артриту:

A *артралгії, що характеризуються симетричністю і летючістю
B стійка деформація дрібних суглобів
C гіперкінези, порушення координації рухів
D клінічні прояви артриту тривало утримуються
E м'язова гіпотонія

13

У дитини з перших днів захворювання на фоні загальної слабкості виникли гіперкінези у вигляді гримас, мимовільних рухів кінцівок. Такий стан відповідає:

A *малій хорей
B ревматичному перикардиту
C ревматичному поліартриту
D вегетосудинній дистонії
E ревматичному ендокардиту

14

Етапність появи плямисто-папульозного висипу, енантема, плями Філатова-Копліка-Бельського — симптоми, які вказують на:

A *кір
B скарлатину
C менінгококову інфекцію
D вітряну віспу
E краснуху

15

Вкажіть термін закриття великого тім'ячка

- A** *8-18 місяців
- B** 3 – 6 місяців
- C** 18-24 місяців
- D** 24- 26 місяців
- E** 26-28 місяців

16

До фельдшера ФАПУ звернулася мати з дитиною 3-х місяців для проведення антропометрії. Маса тіла при народженні 3200гр, зріст 50см. Вирахуйте належну масу тіла дитини (за щомісячним приростом):

- A** * 5400
- B** 5200
- C** 4800
- D** 5800
- E** 6000

17

Фельдшер ФАПУ оглядає дитину 10 років, що скаржиться на підвищення температури тіла, загальну слабкість, нудоту, блювання, сильний головний біль. Об'єктивно: на шкірі кінцівок та бокових частинах тулуба геморагічний висип зіркоподібної форми. Позитивні симптоми Кернінга та Брудзинського. Про яке захворювання свідчить дана симптоматика?

- A** *Менінгококова інфекція
- B** Скарлатина
- C** Кір
- D** Вітряна віспа
- E** Червона висипка

18

Фельдшер ФАПУ оглядає дитину з метою оцінки нервово-психічного розвитку. Дитина стежить і повертає голову за рухами яскравого предмету, у напрямку звука, добре утримує голову у вертикальному положенні. Якому віку відповідають дані показники?

- A** * 3 міс
- B** 1 рік
- C** 6 міс
- D** 1 міс
- E** 9 міс

19

Мати дитини 6 місяців скаржиться фельдшеру ФАПУ , що дитина неспокійна, погано спить, пітніє. При об'єктивному обстеженні: виражені лобні та тім'яні горби, велике тім'ячко 3-4см, краї його потовщені. На ребрах «чотки», виражена м'язова гіпотонія, дитина погано спирається на ніжки. Про що свідчать дані симптоми?

- A** * Рахіт
- B** Ексудативно – катаральний діатез
- C** Гіпотрофія
- D** Диспепсія
- E** Гіпокальціємічний синдром

20

Дитині 3 роки. Мати звернулася до фельдшера зі скаргами на часте дихання, кашель, кволість дитини, підвищення температури тіла до 39,0 С. При огляді: стан важкий, шкіра бліда, ціаноз носо-губного трикутника. При - перкусії вкорочення перкуторного звуку паравертебрально, при аускультатії – велика кількість крепітуючих хрипів. Про що свідчать дані симптоми?

- A** * Гостра пневмонія
- B** Бронхіальна астма
- C** Гострий бронхіт
- D** Гострий ларинготрахеїт
- E** Хронічна пневмонія

21

Фельдшер ФАПУ прибув на виклик до дитини 3 – х років. Мати відмічає загальну слабкість, млявість, зниження апетиту. Захворіла раптово. При огляді: шкіра та видимі оболонки сухі, бліді, язик сухий, обкладений білуватим нальотом.

Сечовипускання часте, сечі мало, вона каламутна. Яке захворювання можна запідозрити вразі такої симптоматики?

- A** * Пієлонефрит
- B** Цистит
- C** Гастрит
- D** Гломерулонефрит
- E** Панкреатит

22

Фельдшер здоровпункту оглядає дитину 4–х років. Скарги на підвищення температури тіла 38,0С, висипання на шкірі, кволість. При огляді: дитина квола, шкіра бліда, на волосистій частині голови, обличчі, тулубі, поліморфний висип у вигляді плям, папул, везикул, наповнених прозорою рідиною. Дитина до захворювання відвідувала дитячий садок. Вкажіть термін карантину в даному випадку:

- A** * 21 день
- B** 5 днів
- C** 9 днів
- D** 14 днів
- E** 25 днів

23

Фельдшер здоров пункту оглядає дитину 6 років, що скаржиться на біль при відкриванні рота та жуванні, підвищення температури. При огляді стан середньої важкості, справа в ділянці заушної залози відмічається припухлість, вушна раковина відстовбурчена. При пальпації пухлина помірно болюча, шкіра над нею натягнута. Вкажіть термін ізоляції дитини в даному випадку:

- A** * 9 днів
- B** 5 днів
- C** 14 днів
- D** 21 день
- E** 25 днів

24

Фельдшер швидкої допомоги прибув на виклик до хлопчика 4-х місяців. Скарги матері на підвищення температури тіла до 39,0С, неспокій, плач. При огляді: стан хлопчика важкий, шкіра суха, гаряча на дотик, гіперемія кон'юнктив та слизової оболонки зів, утруднене дихання через ніс. Який невідкладний стан виник у дитини?

- A** * Гіпертермічний синдром
- B** Астматичний стан
- C** Судомний синдром
- D** Ларинготрахеїт
- E** Анафілактичний шок

25

Фельдшер прибув на виклик до дитини 10 місяців, яка хворіє ГРВІ. На фоні високої температури тіла раптово з'явилося посіпування м'язів обличчя, потім кінцівок із швидкою генералізацією судом. Для зняття судом необхідно ввести в першу чергу:

- A** * Седуксен
- B** Ефедрин
- C** Спазмалгон
- D** Димедрол
- E** Анальгін

26

Фельдшер прибув на виклик до дитини 6 років хворої на бронхіт. Раптово в ночі погіршився стан: з'явилася задишка з довгим свистячим видихом. При огляді: шкіра бліда з ціанотичним відтінком, напруження шийних м'язів, переляк в очах, грудна клітка бочкоподібна. Для якого стану характерні такі симптоми:

- A** * Астматичного

- B** Коматозного
- C** Судомного
- D** Гіпертермічного
- E** Ларингоспазму

27

Мати скаржиться фельдшеру швидкої допомоги на підвищення температури тіла до 39,0 С протягом 3 год., неспокій. При огляді: стан важкий, шкіра суха, гаряча на дотик. Дитина в'яла, апатична. Підберіть препарат для надання допомоги на догоспітальному етапі:

- A** *Парацетамол
- B** Седуксен
- C** Лазекс
- D** Еуфілін
- E** Адреналін

28

Фельдшер прибув на виклик до дитини 1,5 року, яка хворіє на ГРВІ. Вночі стан її погіршився з'явився «гавкаючий» кашель, інспіраторна задишка, періоральний ціаноз. Яку допомогу найдоцільніше надати дитині?

- A** * Ввести р-н преднізолону 1-3 мг/кг маси тіла
- B** Подразнити корінь язика
- C** Ввести р-н анальгіну 0,2 мл
- D** Ввести р-н седуксену 0,5 мг/кг маси тіла
- E** Вести амоксицилін

29

Фельдшер прибув на виклик до дитини 2 років, яка хворіє третій день, має хрипкий голос, «гавкаючий» кашель. Вночі з'явилася задишка, шкіра ціанотична, в акті дихання приймає участь допоміжна мускулатура. Якому невідкладному стану відповідають ці симптоми?

- A** *Стенозуючий ларинготрахеїт
- B** Ларингоспазм
- C** Напад бронхіальної астми
- D** Стороннє тіло в дихальних шляхах
- E** Ларингіт

30

Ви – фельдшер ФАПУ, оглядаєте дитину грудного віку. Під час огляду виявлено: дитина сидить самостійно, добре знає матір. Починає вимовляти склади, у неї прорізуються нижні центральні різці. Якому віковій відповідає психомоторний розвиток дитини?

- A** *6 місяців
- B** 8 місяців
- C** 4 місяці
- D** 9 місяців
- E** 1 рік

31

До фельдшера ФАПУ звернулася мати 5 – місячної дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні, з проханням дати рекомендації щодо подальшого вигодовування дитини. Що Ви порекомендуєте давати дитині з 6-ти місячного віку в якості першого підгодовування?

- A** *Овоче пюре з додаванням 3 г олії на порцію (150 г)
- B** Молочно – круп'яна каша
- C** Кисломолочні продукти спеціального приготування
- D** М'ясне пюре
- E** Жовток крутозвареного курячого яйця

32

Ви – фельдшер ФАПУ, оглядаєте дитину віком 6 днів після виписки з пологового стаціонару. Під час огляду виявлено набрякання грудних залоз, виділення з них незначної кількості рідини кольору молока. Забарвлення шкіри над залозами не змінене. Який із перехідних станів новонароджених спостерігається у дитини?

- A** *Статева криза
- B** Токсична еритема
- C** Сечокислий інфаркт
- D** Транзиторна гіпертермія
- E** Транзиторний дисбактеріоз

33

Ви – фельдшер ФАПУ, проводите антропометрію дитині 2-х - місячного віку, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Якою є належна маса тіла дитини, якщо її маса тіла одразу після народження становила 3200 г?

- A** *4600 г
- B** 5600 г
- C** 3750 г
- D** 5400 г
- E** 4000 г

34

Ви – фельдшер ФАПУ, оглядаєте дитину віком 4 діб. Вчора дитина була виписана з пологового стаціонару. Мати повідомила, що близько 2-х годин назад у дитини піднялась температура тіла до 38,5°C. Об'єктивно: дитина неспокійна, відмічається сухість слизових оболонок, гіперемія шкіри. Соматично дитина здорова. Який стан найімовірніше у дитини?

- A** *Транзиторна гіпертермія
- B** Транзиторна гіпотермія
- C** Статева криза
- D** Фізіологічна еритема
- E** Транзиторний катар кишок

35

Вас – фельдшера ФАПУ, викликали до дитини віком 1 рік, яка хворіє на ГРВІ. Скарги матері на неспокій дитини, сухий нав'язливий «гавкаючий» кашель, осиплість голосу, підвищення температури до 38,5°C. Відмічається інспіраторна задишка, дихання з втягненням податливих місць грудної клітки, роздуванням крил носа. Який з перерахованих препаратів Ви введете дитині?

- A** *Преднізолон
- B** Ампіцилін
- C** Магнію сульфат
- D** Цефотаксим
- E** Контрикал

36

Ви – фельдшер ФАПУ, проводите патронаж дитини віком 10 днів. Об'єктивно: легкий ціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час смоктання грудей, шкіра бліда, акроціаноз. Під час аускультатії серця вислуховується грубий систолічний шум. З анамнезу стало відомо, що мати в перші місяці вагітності перенесла вітряну віспу. Яку хворобу Ви запідозрите у дитини?

- A** *Природжену ваду серця
- B** Спазмофілію
- C** Рахіт
- D** Асфіксію
- E** Бронхіт

37

Вас – фельдшера ФАПУ, викликали до дитини віком 8 років, яка хворіє на вроджену ваду серця. Стан дитини важкий, відмічається задишка, ціаноз, клекотливе дихання, кашель, виділення пінистого харкотиння. Яке положення потрібно надати цій дитині в ліжку?

- A** *Напівлежаче з підвищеним головним кінцем
- B** Колінно - ліктьове
- C** Горизонтальне з піднятим ножним кінцем
- D** На правому боці з приведеними до живота ногами

E Горизонтальне з повернутою набік головою

38

До Вас на ФАП звернулася мати з п'ятирічною дитиною, у якої після перенесеної ангіни з'явилися набряки на обличчі, зміна кольору сечі. Сеча стала каламутною, кольору «м'ясних помиїв». Об'єктивно: шкірні покриви бліді, пастозні. Відмічається підвищення артеріального тиску. Для якого захворювання характерні такі симптоми?

- A** *Гострого гломерулонефриту
- B** Гострої ревматичної гарячки
- C** Інфекційного мононуклеозу
- D** Пієлонефриту
- E** Хронічної ниркової недостатності

39

До Вас на ФАП звернулася мама з дитиною віком 9 років зі скаргами на наявність у дитини періодичних болей в ділянці правого підребер'я, які супроводжуються нудотою. Об'єктивно: при пальпації живіт м'який, болючий в точці проекції жовчного міхура, печінка не збільшена. Яке обстеження необхідно зробити для уточнення діагнозу?

- A** *УЗД органів черевної порожнини
- B** Обзорну рентгенографію живота
- C** Рентгенографію органів грудної клітки, загальний аналіз крові
- D** УЗД нирок, загальний аналіз сечі
- E** УЗД серця, ЕКГ

40

Вас – фельдшера ФАПу, викликали до дитини віком 14 років. Скарги на блювання і чорні рідкі випорожнення. В анамнезі у дитини – виразкова хвороба 12-палої кишки. Які заходи невідкладної допомоги Ви повинні виконати?

- A** *Покласти міхур з льодом на живіт, ввести кровоспинні препарати
- B** Промити шлунок розчином перманганату калію
- C** Зробити очисну клізму
- D** Ввести внутрішньовенно розчин глюкози
- E** Промити шлунок холодною водою

41

До Вас на ФАП звернулася мама з дитиною віком 12 років. Дитина скаржить на виражений біль у верхньому відділі живота, який виникає після споживання їжі, відрижку кислим, печію. Об'єктивно: язик обкладений білим нальотом, при пальпації живіт м'який, болючий в епігастральній ділянці. Печінка не збільшена. Яке додаткове дослідження є найбільш інформативним для встановлення діагнозу?

- A** *Фіброгастродуоденоскопія
- B** Холецистографія
- C** УЗД печінки і жовчного міхура
- D** Колоноскопія
- E** УЗД нирок

42

Фельдшер ФАПу оглядає дитину віком 6 днів. На шкірі сідниць, стегон, природних складок і голови відмічаються дрібні, поверхневі пухирці розміром 1-2 мм в діаметрі, наповнені прозорим вмістом. Чим необхідно обробляти елементи висипу?

- A** *1-2% спиртовим розчином діамантового зеленого
- B** 3% розчином перекису водню
- C** Дитячим кремом
- D** Перевареною водою
- E** Елементи висипу не обробляти

43

Ви – фельдшер ФАПу, оглядаєте трьохмісячну дитину. Дитина млява, сонлива, відмічається пастозність обличчя, язик трохи висунутий, перенісся широке, шкіра бліда, суха, холодна на дотик. Зріст при народженні 50 см, у 3 місяці – 52 см. Яку патологію Ви запідозрите?

- A** *Вроджений гіпотиреоз
- B** Лімфатико - гіопластичний діатез

- C** Рахіт
- D** Гіпертиреоз
- E** Хвороба Дауна

44

Ви – фельдшер ФАПУ, складаєте план профілактичних щеплень. Які щеплення Ви плануєте дитині 3 місяців?

- A** *Щеплення АКДП, гемофільної інфекції
- B** Щеплення проти гепатиту В
- C** Щеплення проти кору, епідемічного паротиту, краснухи
- D** Щеплення проти туберкульозу
- E** Пробу Манту

45

До фельдшеру ФАПУ звернулася мати з дитиною хворою на гострий пієлонефрит. Які зміни характерні для даного захворювання?

- A** *Піурія
- B** Петехіальний висип на шкірі
- C** Глюкозурія
- D** Ціаноз шкіри
- E** Макрогематурія

46

До фельдшера ФАПУ звернулася мати дворічної дитини, у якої гостро розвинувся набряк по всьому тулубу. Артеріальний тиск 120/80мм рт.ст. Діурез знижений. Кількість білка в сечі 4,5г/л, мікрогематурія. Для якого захворювання характерні такі проблеми?

- A** *Гострий гломерулонефрит
- B** Гострий панкреатит
- C** Гострий пієлонефрит
- D** Ізольований сечовий синдром
- E** Хронічна ниркова недостатність

47

До фельдшера ФАПУ звернулася мати дворічної дитини з такими симптомами: температура тіла 38,0С, млявість, розлад сну, тахікардія, вологий кашель, задишка змішаного типу, блідість шкіри, пероральний ціаноз. Такі симптоми вказують на:

- A** *Гостру пневмонію
- B** Бронхіальну астму
- C** Назофарингіт
- D** Гострий бронхіт
- E** Гострий ларингіт

48

У дитини 10 років фельдшер ФАПУ запідозрив ревматизм. Для підтвердження діагнозу призначені додаткові методи обстеження. Який показник підтвердить даний діагноз?

- A** *Поява С-реактивного протеїну
- B** Збільшення холестерину крові
- C** Гіперглікемія
- D** Гіпоглікемія
- E** Підвищення рівня білірубіну в крові

49

Дитині, що народилася на 35 тижні вагітності з масою тіла 2000г, фельдшер ФАПУ почне специфічну профілактику рахіту з:

- A** *2 тижневого віку
- B** 1 місячного віку
- C** 1,5 місячного віку
- D** 2 місячного віку
- E** 3 місячного віку

50

Під час огляду новонародженого мати поскаржилася на почервоніння сідниць. При огляді фельдшер ФАПУ помітив різке почервоніння з ерозіями. Дитина постійно

знаходиться в «Памперсах», шкірні складки оброблюються присипками час від часу. Про яке захворювання треба подумати?

A *Попрілість

B Пітниця

C Піодермія

D Фізіологічна еритема

E Токсична еритема

51

Фельдшер ФАПУ оглядає дитину 8 років зі скаргами на слабкість, біль при ковтанні, дрібноточковий висип на гіперемійованій шкірі, підвищення температури тіла до 38.0 С. При огляді: у зіві яскрава гіперемія слизової оболонки, збільшення лімфатичних вузлів, блідність носо-губного трикутника, язик обкладений білим нальотом. Для якого захворювання характерні ці симптоми?

A * Скарлатини

B Атопічного дерматиту

C Краснухи

D Вітряної віспи

E Кору

52

Мати дитини 5 р. звернулась до фельдшера ФАПУ зі скаргами на плями, дрібні папули різної величини та везикули, які розташовані на шиї, обличчі, волосистій частині голови. Дитина млява, дратівлива, t 37,7°C. Для якого захворювання характерні вище названі симптоми?

A *Вітряної віспи

B Кору

C Скарлатини

D Краснухи

E Менінгококкової інфекції

53

До фельдшера ФАПУ звернулась мати з дитиною 10 років зі скаргами на збільшення задньошийних, потиличних лімфатичних вузлів, дрібно – плямистий висип на шкірі при субфебрильній температурі тіла. Якому захворюванню властиві ці симптоми?

A *Краснусі

B Кору

C Вітряній віспі

D Скарлатині

E Алергічному дерматиту

54

У дитини клінічні ознаки дискінезії жовчних шляхів. З якими скаргами дитина звернулась до фельдшера ФАПУ?

A *Раптовим, переймоподібним болем у правому підреб'ї

B Стійким болем у надчеревній ділянці

C Пекучим болем у лівому підреб'ї

D Болем у надлобковій ділянці

E Болем у поперековій ділянці

55

Мати дитини 12 років звернулась до фельдшера ФАПУ з приводу загострення виразкової хвороби шлунка. Який метод діагностики необхідно призначити дитині? **A**

*Фіброгастроуденоскопію

B Рентгенографію шлунку

C Ректороманоскопію

D Ультразвукове обстеження органів черевної порожнини

E Дуоденальне зондування

56

Фельдшер ФАПУ при обстеженні дитини 15 років виявив ознаки холециститу. Назвіть необхідні методи дослідження для підтвердження діагнозу.

A *Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини

B Рн-метрія

C Фіброгастроуденоскопія

D Ректороманоскопія

E Шлункове зондування

57

При огляді новонародженої дитини на 4 добу фельдшер ФАПу виявив зменшення маси тіла дитини. Загальний стан дитини не порушений. З чим пов'язаний стан дитини?

- A** * Фізіологічною втратою маси тіла
- B** Статевою кризою новонародженого
- C** Сечокислим інфарктом нирок
- D** Транзиторним дисбактеріозом
- E** Фізіологічною еритемою

58

На профілактичний огляд до фельдшера ФАПу звернулась мати з дитиною 1 – го місяця. Який режим годування повинен призначити фельдшер?

- A** * За вимогою дитини
- B** Кожні 2 години
- C** Кожні 3 години
- D** Кожні 3.5 години
- E** Кожні 5 годин

59

При огляді дитини 12 місяців фельдшер ФАПу оцінює місцеву реакцію після вакцинації БЦЖ. Які зміни повинні бути у місці щеплення

- A** * Рубчик
- B** Інфільтрат
- C** Пустула
- D** Виразка
- E** Везикула

60

При патронажі здорової доношеної дитини віком 4 доби фельдшер ФАПу помітив жовтяничне забарвлення шкіри. Дитина активна, загальний стан не порушений. З чим пов'язаний стан дитини?

- A** * Фізіологічною жовтяницею
- B** Фізіологічною еритемою
- C** Статевою кризою новонародженого
- D** Транзиторним дисбактеріозом
- E** Транзиторною лихоманкою

61

До фельдшера ФАПу звернулась мати дитини 1 місяця зі скаргами на блювання «фонтаном» без домішок жовчі, має кислий запах. Дитина погано прибавляє в масі тіла. При огляді живота з'являється симптом «піщогового годинника». Визначіть попередній діагноз у дитини:

- A** * Пілоростеноз
- B** Пілороспазм
- C** Диспепсія
- D** Гострий гастрит
- E** Виразкова хвороба

62

Дівчинка 10 років звернулась до фельдшера з приводу ниючого болю у правому підребер'ї, поганого апетиту, нудоти, відчуття гіркоти в ротовій порожнині, періодичне блювання. Біль посилюється після вживання жирної їжі. Об'єктивно: шкіра бліда, суха. Під час пальпації живота печінка виступає з-під ребрової дуги на 2,5 см, щільна і болісна при пальпації. Позитивні симптоми Ортнера, Кера справа в підребер'ї. Вкажіть найвірогідніший діагноз:

- A** * Холецистохолангіт
- B** Гострий панкреатит
- C** Хронічний гастрит
- D** Виразкова хвороба
- E** Глистна інвазія

63

Оцінка фізичного розвитку дітей шляхом складання графіків «Довжина тіла/ зріст / вік»

проводиться за наказом МОЗУ

A *№149

B №152

C №720

D №120

E №437

64

Ви проводите консультування матері з вигодовування дитини віком 3-х місяців та даєте пораду:

A *Відмовитись від сосок, пустышок

B Поїти дитину кип'яченою водою

C Поїти дитину відваром ромашки

D Ввести в раціон годування фруктовий сік

E Поїти дитину овочевим відваром

65

Ви проводите спостереження за розвитком здорової дитини та плануєте профілактичні щеплення. Для профілактики гемофільної інфекції ви застосуєте вакцину

A *Хіберікс

B Інфанрікс

C Приорікс

D БЦЖ

E Імовакс Полио

66

До фельдшера звернувся хлопчик 10 р. зі скаргами на тривалу кровотечу після екстракції зуба. Об'єктивно: шкіра та слизові бліді, на шкірі тулуба та кінцівок крововиливи різної величини від петехій до плям, розташовані хаотично, різного забарвлення. Лунка видаленого зуба кровоточить. Печінка, селезінка не збільшені. Яку хворобу можна запідозрити:

A *Тромбоцитопенічна пурпура [хвороба Верльгофа]

B Геморагічний васкуліт **C** Гемофілія

D Гострий лейкоз

E Гемолітична анемія

67

Мати дитини 5 років звернулася до фельдшера зі скаргами на те, що в дитини підвищилась температур тіла до 38,0С, з'явився сухий кашель, переважно вночі, після кашлю – блювання. Щодня кашель частішає і складається із серії видихуваних поштовхів з глибоким свистячим вдихом. Напади кашлю до 10-15 разів на добу. Обличчя дитини набрякле. Крововиливи в склеру очей. Яку хворобу можна запідозрити:

A *Кашлюк

B Пневмонія

C Стенозуючий ларинготрахеїт

D Обструктивний бронхіт

E Бронхіальна астма

68

В пологовому будинку всім здоровим новонародженим дітям проводять щеплення:

A *проти туберкульозу та гепатиту В

B проти кору

C проти гемофільної інфекції

D проти дифтерії

E проти епіпаротиту

69

Дитина народилася передчасно з вагою 1700 г, від першої ускладненої вагітності. Профілактику якого захворювання слід передбачити при складанні плану догляду за недоношеною дитиною?

A *Анемії

B Алергічного діатезу

- C* Гострих розладів травлення
- D* Гемолітичної хвороби
- E* Спазмофілії

70

Дитині 5р. поставлено діагноз – дифтерія. Лікар призначив введення протидифтерійної сироватки за методом Безредко. Яким шляхом вводиться пробна доза сироватки?

- A* *Внутрішньошкірно
- B* Підшкірно
- C* Внутрішньом'язово
- D* Внутрішньовенно
- E* Інгаляційно

71

Дитина 3 місяців знаходиться на грудному вигодовуванні. Мати звернулась до фельдшера із скаргами на зменшення кількості сечовипускань у дитини, неспокій після годування, за місяць набрала в масі 400 г. Дані симптоми дозволяють запідозрити:

- A* *Недогодовування
- B* Перегодовування
- C* Кишковий токсикоз
- D* Просту диспепсію
- E* Парентеральну диспепсію

72

Під час патронажу новонародженої дитини віком 14 днів фельдшер виявив, що пупкова ранка волога з серозним виділенням. Про яке захворювання можна подумати?

- A* *Катаральний омфаліт
- B* Гнійний омфаліт
- C* Некротичний омфаліт
- D* Сепсис новонароджених
- E* Пупкову килу

73

Дітям у школі проведена проба Манту. Через який проміжок часу необхідно оцінити її результати у дітей?

- A* *72 год
- B* 12 год.
- C* 24 год.
- D* 48 год.
- E* 56 год.

74

Фельдшер виявив у 5-річного хлопчика блідість шкіри та слизових оболонок, тріщини в куточках рота. Лікар поставив діагноз – залізодефіцитна анемія. Які з перерахованих причин могли спровокувати дану патологію?

- A* *Глистяна інвазія
- B* Овочеve харчування
- C* Надмірне фізичне навантаження
- D* Часті респіраторні захворювання
- E* Довготривале отримання антигістамінних препаратів

75

У дівчинки 7-ми років скарги на періодичний ниючий біль у поперековій ділянці, часте болісне сечовипускання. В сечі: лейкоцити - 16 в полі зору. Яку патологію можна запідозрити в даному випадку?

- A* Інфекцію сечовивідних шляхів
- B* Гострий вагініт
- C* Гострий гломерулонефрит
- D* Гострий проктит
- E* Енурез

76

У хлопчика 5-ти років спостерігаються періодичне ацетонемічне блювання, нічні страхи, емоційна нестійкість. Об'єктивно: хлопчик пониженого харчування, астеничної тілобудови. інтелектуально добре розвинутий, вміє читати, по-дорослому пояснює життєві ситуації. В сечі - сечокислі солі (урати) +++ . Ця клінічна картина характерна для діатезу:

- A** *Нервово-артритичного
- B** Атопічного
- C** Ексудативно-катарального
- D** Алергічного
- E** Лімфатико-гіпопластичного

77

Дитині 5 років. Скарги на блідість шкірного покриву, зниження апетиту, втомлюваність. В аналізі крові: Нв - 90 г/л. ер. – 3, 2 x10¹²/л, ЦП – 0,8. Призначення яких ліків найбільш раціональне?

- A** *Препаратів заліза
- B** Вітаміну А
- C** Вітаміну Д
- D** Глюконату кальцію
- E** Алохолу

78

При обстеженні дівчинки після народження був виявлений крововилив на голові, який не виходить за межі однієї кістки, не пульсує, не болить. Яка патологія у дитини?

- A** *Кефалогематома
- B** Септикопемія
- C** Пологова пухлина
- D** Пухирчатка новонародженого
- E** Внутрішньочерепна травма

79

У дитини 2-х місяців у паховій ділянці спостерігається гіперемована мокнуча поверхня шкіри внаслідок злиття ерозій. Яке захворювання можна запідозрити?

- A** *Попрілості III ступеня
- B** Везикулопустульоз
- C** Пітниця
- D** Попрілості I ступеня
- E** Пухирчатка новонародженого

80

Дитині виповнилося 5 років. Ви повині запросити матір з дитиною на ревакцинацію проти кору, паротиту, краснухи. В якому віці робиться це щеплення?

- A** *6 років
- B** 7 років
- C** 14 років
- D** 15 років
- E** 18 років

81

Дитина 1-го року життя перебуває в інфекційному відділенні на лікуванні з приводу колі-інфекції. Які випорожнення характерні для данного захворювання?

- A** *Водянисті оранжевого кольору
- B** Пінисті темно-зеленого кольору
- C** У вигляді „січеного яйця”
- D** Кров'янисто-слизові
- E** У вигляді рисового відвару

82

У дитини 9 міс., яка хворіє на рахіт, з'явилось посмикування м'язів обличчя з залученням інших груп м'язів. Про яке захворювання можна думати:

- A** *Явну спазмофілію, еклампсію
- B** Явну спазмофілію, ларингоспазм
- C** Явну спазмофілію, карпопедальний спазм
- D** Приховану спазмофілію, симптом Хвостека
- E** Приховану спазмофілію, симптом Маслоу

83

Ви проводите патронажне відвідування новонародженої дитини, даєте рекомендації матері щодо грудного вигодовування. Що з перерахованого належить до принципів успішного грудного вигодовування?

- A** *Заохочуване грудне вигодовування на вимогу дитини
- B** Новонародженим обов'язково слід давати штучні засоби, які імітують груди
- C** Новонароджених годують 5 разів на добу
- D** Вночі новонароджених дітей не годують [перерва 8 годин]
- E** Інформування вагітних і породіль про переваги штучного вигодовування

84

До вас звернулася дитина 10-ти років зі скаргами на ядуху, нападоподібний настирливий кашель, які найчастіше посилюються уночі. Об'єктивно - емфізематозне здуття грудної клітки; аускультативно - різнокаліберні сухі свистячі хрипи. Ви запідозрили бронхіальну астму. Які додаткові методи обстеження допоможуть оцінити функцію зовнішнього дихання?

- A** *Спірометрія
- B** Рентгенологічне обстеження органів грудної клітки
- C** Загальний аналіз крові
- D** Бронхоскопія
- E** Загальний клінічний аналіз мокротиння

85

Яке профілактичне щеплення потрібно провести дитині в один місяць?

- A** *проти гепатиту В
- B** проти кору, краснухи, паротиту
- C** БЦЖ
- D** АКДП
- E** проти гемофільної інфекції

86

Ви оглядаєте дитину, що хворіє на цукровий діабет та отримує інсулін. Поясніть матері, яке ускладнення найчастіше виникає в разі порушення дієти?

- A** *Гіперглікемічна кома
- B** Геморагічний синдром
- C** Гостра ниркова недостатність
- D** Гіпертермічний синдром
- E** Недостатність надниркових залоз

87

У дитини 8 днів шкіра землистого кольору, дихання слабке, поверхневе, тахікардія, збільшена печінка, селезінка. У дитини кровоточить пупок, спостерігається зригування, нестійкі рідкі випорожнення. Про яке захворювання слід думати:

- A** *Сепсис новонародженого
- B** Пневмонію
- C** Геморагічний омфаліт
- D** Гепатит
- E** Внутрішньо- черепну пологову травму

88

Ви працюєте фельдшером ФАПУ . Через 2 тижні після перенесеної скарлатини до Вас звернувся хлопчик 12 років, який скаржиться на підвищення температури тіла до 37,5°C, набряки під очима, зменшену кількість сечі, яка набула червоного кольору. З якого дослідження треба розпочати обстеження дитини?

- A** *Загального аналізу сечі
- B** Проби за Зимницьким
- C** Аналізу сечі на бактеріурію
- D** Проби за Нечипоренко
- E** Проби за Амбурже

89

Ви берете мазок на менінгокок у дитини 10 років. Які особливості проведення процедури?

- A** *Мазок беруть ватним тампоном, закріпленим на стержні, зігнутому під кутом 45°

- B** Мазок беруть ватним тампоном, закріпленим на прямому стержні
- C** Мазок беруть з мигдаликів на межі здорової та ураженої тканини
- D** Мазок беруть після полоскання антисептичними розчинами
- E** Мазок беруть з носоглотки після їжі

90

Після проведення первинного патронажу до новонародженого відомості про дитину слід записати у форму:

- A** *№ 112/О
- B** № 026/О
- C** № 063/О
- D** № 058/О
- E** № 067/О

91

Дитині 8 місяців. При обстеженні фізичний і нервово-психічний розвиток відповідає віку. До цього часу не хворіла. Вкажіть яка кількість зубів у даної дитини має бути?

- A** *4
- B** 2
- C** 6
- D** 8
- E** 10

92

У дитини з гемофілією А почалася носова кровотеча. Який препарат використовується для припинення кровотечі?

- A** *Кріопреципітат
- B** Діцинон
- C** Вікасол
- D** Хлористий кальцій
- E** Вітамін С

93

У 5-місячної дитини з явищами рахіту, під час крику наступила раптова зупинка дихання. Про яке захворювання свідчить цей симптом?

- A** *Спазмофілію, ларингоспазм
- B** Стенозуючий ларинготрахеїт
- C** Спазмофілію, карпопедальний спазм
- D** Спазмофілію, еклампсію
- E** Гіпервітаміноз Д

94

У 5-річного хлопчика розвинувся анафілактичний шок на введення антибіотика. Яким препаратом потрібно обколоти місце введення алергена?

- A** *0,1% р-ном адреналіну гідрохлориду
- B** 50% р-ном анальгіну
- C** 0,5% р-ном новокаїну
- D** 10% р-ном глюконату кальція
- E** 15% р-ном дімедролу

95

Під час госпіталізації дитини з менінгококовою інфекцією у неї почалися судоми. Який препарат слід ввести.

- A** *Седуксен 0,05% **B** Димедрол 1%
- C** 10% р-н глюконату кальція
- D** 0,9% р-н хлориду натрія
- E** 40% р-н глюкози

96

З якого препарату слід розпочати невідкладну допомогу у випадку нападу бронхіальної астми.

- A** *Беротеку
- B** Теофліну
- C** Анаприліну
- D** Папаверину
- E** Хлористого кальція

97

Які можливі негативні наслідки відсмоктування слизу з ротової порожнини та носоглотки у новонародженої дитини.

- A** *Розвиток аритмії та брадикардії
- B** Тахікардія
- C** Гіпертермія
- D** Експіраторна задишка
- E** Негативних наслідків не має

98

Які клінічні прояви характерні для катарального періоду кору

- A** *Плями Бельського-Філатова-Копліка
- B** Поетапна висипка
- C** Пігментація
- D** Геморагічні висипання на шкірі
- E** Пластинчасте лущення

99

При огляді дитини 5 років ви виявили погіршення стану, підвищення температури тіла, набряк у ділянці привушної слинної залози праворуч, відмову від їжі. Про яке захворювання слід думати?

- A** * Паротитну інфекцію
- B** Краснуху
- C** Скарлатину
- D** Кіп
- E** Вітряну віспу

100

Під час проведення первинного патронажу до новонародженого, мати поцікавилась чи треба поїти дитину кип'яченою водою і в якій кількості? Дитина здорова, молока у матері достатньо. Яку рекомендацію повинен дати фельдшер?

- A** * Нічого, крім грудного молока не давати
- B** Давати воду до 200мл на добу
- C** Давати воду до 120мл на добу
- D** Давати воду до 5мл на добу
- E** Поїти водою кожні 2 години по 20мл

101

Які втручання фельдшера при транзиторній гарячці у новонародженої дитини?

- A** *Розкрити дитину.
- B** Провести оксигенотерапію.
- C** Поставити газівідвідну трубку.
- D** Ввести спазмолітики.
- E** Зробити очисну клізму.

102

Яку дозу вітаміну Д3 слід призначити дитині з ознаками рахіту І ст. важкості?

- A** *2000 ОД на добу.
- B** 4000 ОД на добу.
- C** 3000 ОД на добу.
- D** 5000 ОД на добу.
- E** 1000 ОД на добу.

103

У флаконі 1,0 г. цефтриаксону. Його розвели 5 мл ізотонічного розчину. Скільки потрібно набрати в шприц розчину, якщо дитині призначено 300 мг препарату?

- A** *1,5 мл.
- B** 2 мл.
- C** 3 мл.
- D** 4 мл.
- E** 5 мл.

104

У крові дитини відзначається наявність незрілих бластних клітин, стан важкий, шкіра бліда, крововиливи, збільшені печінка та селезінка. Визначте попередній діагноз:

- A** *Лейкоз.
- B** Анемія.
- C** Тромбоцитопенічна перпура.
- D** Гемофілія.
- E** Геморагічний васкуліт.

105

Наявність чистого носогубного трикутника на тлі дрібноточкового висипу на фоні гіперемованої шкіри при скарлатині носить назву:

- A** *Симптом Філатова.
- B** Симптом Керніга.
- C** Симптом Копліка – Філатова – Бельського.
- D** Симптом Хвостека
- E** Симптом Брудзинського

106

Який головний чинник виникнення виразкової хвороби шлунку та 12-палої кишки?

- A** **Helicobacter pylori*.
- B** Кишкова паличка.
- C** Стафілокок.
- D** Стрептокок.
- E** Протей.

107

В якому віці вводиться перший прикорм здоровій дитині?

- A** *6 міс.
- B** 3 міс.
- C** 1 рік.
- D** 9 міс.
- E** 4 міс.

108

Ви фельдшер ФАПУ. До вас звернулась мама 6 – річної дитини зі скаргами на поганий апетит, схуднення, тривалий субфебрилітет. Об'єктивно: шкіра бліда, збільшені всі групи лімфатичних вузлів, проба Манту – папула 14 мм. Поставте попередній діагноз.

- A** *Туберкульоз невстановленої локалізації
- B** Бронхіальна астма.
- C** Хронічна пневмонія.
- D** Залізодефіцитна анемія.
- E** Гострий лейкоз.

109

Дитина, 7 років, скаржиться на головний біль, підвищення температури тіла, задишку, малопродуктивний кашель. Хворіє протягом тижня. Об'єктивно: температура тіла 39,5°C, відзначається задишка змішаного типу, вкорочення перкуторного звуку, жорстке дихання, крепітуючі хрипи. Який найвірогідніший діагноз?

- A** *Пневмонія.
- B** Бронхіт обструктивний.
- C** Бронхіт простий.
- D** Туберкульоз легень.
- E** Бронхіальна астма.

110

Дитина від доношеної вагітності народилась з масою тіла 3200 г. На 1-шу добу після народження з'явилась жовтяниця. Печінка і селезінка збільшені. Білірубін 100 мкмоль/л. Група крові матері В(III) Rh (-), дитини – О (I) Rh (+). Який діагноз у цьому випадку найбільш ймовірний?

- A** *Гемолітична хвороба новонароджених.
- B** Фізіологічна жовтяниця.
- C** Вроджений гепатит.
- D** Атрезія жовчовивідних шляхів.
- E** Сепсис новонароджених.

111

Мати 4-місячної дівчинки скаржиться на неспокій дитини, млявість, поганий апетит. Дитина народилась від других передчасних пологів. При огляді шкіра і видимі слизові оболонки бліді. Тони серця ритмічні, визначається систолічний шум. ЧСС 140 за хв. Печінка на 3 см. виступає з-під краю реберної дуги. Аналіз крові: еритроцити – $2,5 \times 10^{12}/л$, гемоглобін 80г/л. Поставте попередній діагноз.

- A** *Залізодефіцитна анемія II ступеня важкості
- B** Гемолітична анемія.
- C** Залізодефіцитна анемія I ступеня тяжкості.
- D** Залізодефіцитна анемія III ступеня тяжкості.
- E** Лейкоз.

112

Хлопчик, 13 років, звернувся до фельдшера зі скаргами на сухий кашель, задишку. Хворіє протягом 1 року. Напади задишки короточасні, 1-2 рази на місяць. Об'єктивно: неспокій, блідість шкіри, періоральний ціаноз, експіраторна задишка, частота дихальних рухів 48 за хв. Над легеньми вислуховується перкуторний звук з коробковим відтінком. Аускультативно – послаблене дихання, сухі свистячі хрипи з обох боків. Який із препаратів найдоцільніше призначити хворому?

- A** *Сальбутамол.
- B** Діазолін.
- C** Супрастин.
- D** Еуфілін.
- E** Амброксол.

113

Дитина, 7 років, захворіла гостро. З'явився біль у животі, попереку, підвищилась температура тіла до 39°C. під час огляду: позитивний симптом Пастернацького з обох боків. В аналізі сечі: лейкоцити вкривають все поле зору. Яке захворювання є найбільш імовірним?

- A** *Гострий пієлонефрит.
- B** Гострий гломерулонефрит.
- C** Грип.
- D** Гострий цистит.
- E** Сечокам'яна хвороба.

114

Хлопчик, 7 років, скаржиться на часті сечовипускання, у тому числі вночі, спрагу та вживання великої кількості рідини, схуднення, загальну слабкість. Хворіє протягом 2 тижнів. Під час об'єктивного обстеження виявлено виражену сухість шкіри та слизових оболонок, зниження тургору шкіри. Встановлено, що батько дитини з 18 – річного віку хворіє на цукровий діабет I типу. Які першочергові лабораторні дослідження необхідно призначити для встановлення діагнозу?

- A** *Рівень глікемії натще.
- B** Загальний аналіз крові.
- C** Загальний аналіз сечі.
- D** Аналіз сечі за Земницьким.
- E** Аналіз сечі за Нечипоренко.

115

Хлопчик, 6 років, 2 тижні тому перехворів ангіною. Під час звертання скаржиться на головний біль, набряки під очима, червону сечу. В аналізі сечі: білок – 1,23 г/л, еритроцити вкривають все поле зору, лейкоцити 10-15 у полі зору, гіалінові циліндри 5-6. Який Ваш попередній діагноз?

- A** *Гострий гломерулонефрит.
- B** Гострий пієлонефрит.
- C** Хронічний пієлонефрит.
- D** Цистит.
- E** Геморагічний васкуліт, нирковий синдром.

116

Дитина, 9 міс. При об'єктивному обстеженні шкіра бліда, суха, вяла. Тургор тканин значно знижений. М'язова гіпотонія. Підшкірно – жирова клітковина на животі і кінцівках відсутня. Дефіцит ваги 25%. Поставте попередній діагноз.

- A** *Гіпотрофія II ступеню.
- B** Гіпотрофія I ступеню.
- C** Гіпотрофія III ступеню.
- D** Паратрофія.
- E** Нормотрофія.

117

Який повинен бути зріст у дитини 6 років?

- A** *112 см
- B** 100 см
- C** 85 см
- D** 95 см
- E** 105 см

118

З якого віку і яку страву можна рекомендувати в якості I прикорму?

- A** *3 6міс. овочеve пюре
- B** 3 4міс. фруктовe пюре
- C** 3 4міс. молочну кашу
- D** 3 6міс. яблучний сік
- E** 3 5міс. кефір

119

У дитини 7 днів життя мати помітила кров'янисто-слизові виділення зі статевої щілини та нагрубання молочних залоз. З чим це пов'язано?

- A** *Статевою кризою
- B** Реакцією на грудне молоко
- C** Впливом зовнішніх чинників
- D** Запальними захворюваннями шкіри
- E** Сепсисом

120

Етіологічним чинником захворювання, яке розвивається у новонароджених і грудних дітей і називається пліснявкою, є:

- A** *Candida albicans
- B** Стафілокок
- C** Стрептококк
- D** Вірус звичайного герпесу
- E** Вірус вітряної віспи

121

Який із перерахованих лікарських препаратів має антигельмінтну дію?

- A** *Ворміл
- B** Персен
- C** Гемофер
- D** Фестал
- E** Піпільфен

122

Для якого захворювання характерні перераховані симптоми: поліурія, полідипсія, поліфагія, втрата маси тіла?

- A** *Цукрового діабету
- B** Гломерулонефриту
- C** Пієлонефриту
- D** Анемії
- E** Лейкозу

123

На профілактичний прийом до фельдшера прийшла мати з 4 місячною дитиною. Стан задовільний. Психомоторний і фізичний розвиток відповідає віку. Дитина здорова. Проти яких інфекційних захворювань Ви запропонуєте мамі зробити щеплення даній дитині?

- A** *Дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, гемофільної інфекції
- B** Дифтерії, кашлюку, правця, поліомієліту, кору
- C** Туберкульозу, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В
- D** Кору, краснухи, епідемічного паротиту, гемофільної інфекції, туберкульозу
- E** Дифтерії, правця, гепатиту В, поліомієліту, краснухи

124

На прийом до фельдшера ФАПу прийшла мати з дитиною 8 років. Відмічається підвищення температури тіла, блювання, загальна слабкість, біль при ковтанні. При огляді виявлено гіперемію і набряк слизових зіву, мигдалики збільшені, вкриті сірим нальотом, який важко знімається. У календарі щеплень виявлено порушення термінів введення АКДП. Ваш орієнтовний діагноз?

- A** *Дифтерія
- B** Епідемічний паротит
- C** Стоматит
- D** Ангіна
- E** Скарлатина

125

Дітям перед ревакцинацією БЦЖ проведена проба Манту. Отримано такі результати: у 8 дітей – негативна проба, у 4 дітей – сумнівна проба, у 7 дітей – позитивна проба. Скільки дітей підлягають ревакцинації?

- A** *8
- B** 4
- C** 7
- D** 12
- E** 19

126

Фельдшер запідозрив латентну форму спазмофілії. Який симптом характерний для даного захворювання?

- A** *Хвостека
- B** Керніга
- C** Брудзинського
- D** Ортнера
- E** Кера

127

На прийомі у фельдшера ФАПу мати 2-х місячної дитини запитала: «Яка прибавка маси тіла у цьому віці вважається нормою?»

- A** * 800 гр
- B** 500 гр
- C** 600 гр
- D** 750 гр
- E** 700 гр

128

Ви працюєте фельдшером ФАПу. У дитини 3 місяців асиметрія голови, пласка потилиця, велике тім'ячко 4,0 x 3,5 см., краї пом'якшені. Дані симптоми вказують на:

- A** * Рахіт
- B** Гіпервітаміноз Д
- C** Спазмофілію
- D** Нервово-артритичний діатез
- E** Ексудативно-катаральний діатез

129

Ви працюєте фельдшером в школі. У дитини 7 років t_0 – 38°C, біль в горлі, дрібно-точковий висип, блідий носо-губний трикутник, «малиновий язик». Вкажіть термін ізоляції хворого.

- A** * 22 дні
- B** 17 днів
- C** 9 днів
- D** 5 днів
- E** 25 днів

130

У 10-річної дівчинки діагностовано ревматизм. Назвіть основні великі діагностичні критерії (Кіселя-Джонса-Нестерова) даного захворювання:

- A** * Кардит, поліартрит, мала хорея, ревматичні вузлики, анулярна еритема
- B** Кардит, артралгії, мала хорея
- C** Артрит, ревматичні вузлики, висока температура тіла
- D** Кардит, поліартрит, зміни на ЕКГ
- E** Лейкоцитоз, підвищена ШОЕ, артрит

131

Ви працюєте фельдшером ФАПУ. Визначте профілактичну добову дозу вітаміну Д для здорової доношеної дитини:

- A** * 500 ОД
- B** 200 ОД
- C** 800 ОД
- D** 1000 ОД
- E** 1600 ОД

132

В якому віці дитина починає самостійно тримати голівку?

- A** * 2 місяці
- B** 4 місяці
- C** 5 місяців
- D** 6 місяців
- E** 12 місяців

133

У дитини з ГРВІ на 5 день від початку захворювання, з'явилась задишка, ціаноз носо-губного трикутника. При аускультатії тони серця глухі, вислуховується систолічний шум. Межі серця розширені вліво. Яке ускладнення можливе у дитини?

- A** * Міокардит
- B** Вогнищева пневмонія
- C** Гломерулонефрит
- D** Сироваткова хвороба
- E** Набута вада серця

134

При проведенні первинного патронажу на 2 добу після виписки з пологового будинку фельдшер виявив у дитини набряклість верхньої третини лівого плеча, там же інфільтрат. Про що слід подумати в першу чергу?

- A** * Про реакцію після вакцинації БЦЖ
- B** Про вітряну віспу
- C** Про лімфаденіт
- D** Про гострий гематогенний остеомієліт
- E** Про везикулопустульоз

135

Мати цікавиться у фельдшера ФАПУ, які щеплення необхідно провести її дитині віком 1 року?

- A** * Проти кору, краснухи, паротиту
- B** Проти туберкульозу
- C** Проти поліомієліту
- D** Проти дифтерії, коклюшу, правця
- E** Проти гепатиту В

136

Ви фельдшер ФАПУ. Для якого захворювання характерний стійкий та тривалий біль в епігастральній ділянці, що виникає натще, може бути нічним або через 2 години після їжі:

- A** * Виразкової хвороби
- B** Гострого гастриту
- C** Гострого панкреатиту
- D** Холециститу
- E** Хронічного коліту

137

Дитині 1,5 місяці. На змішаному вигодовуванні. Що застосовується з метою

догодовування дитини?

A *Адаптовані суміші

B Каші

C Овочеve пюре

D Соки

E М'ясний фарш

138

Ви фельдшер ФАПУ. До вас звернулася мати дитини 3-х місяців з питанням: Який має бути інтервал між щепленнями під час проведення вакцинації проти поліомієліту?

A *1 місяць

B 3 місяці

C 1 тиждень

D 1 день

E 2 місяці

139

Назвіть дозу розведеної паротитної вакцини для проведення щеплення:

A * 0,5 мл

B 0,1 мл

C 0,2 мл

D 1 мл

E 0,3 мл

140

Скільки сухої речовини вакцини БЦЖ вміщує 0,1 мл розчину для проведення щеплення проти туберкульозу:

A * 0,05 мг

B 0,01 мг

C 0,5 мг

D 2,0 мг

E 1,0мг

141

Визначте спадкове захворювання, що передається від хворого батька синові через здорову матір, ознакою якого є кровоточивість.

A * Гемофілія

B Анемія

C Геморагічний васкуліт

D Тромбоцитопенічна пурпура

E Лейкоз

142

Ви працюєте фельдшером ШМД. Визначте основну клінічну ознаку, характерну для нападу бронхіальної астми.

A *Задишка з утрудненим видихом **B** Задишка з утрудненим вдихом

C Порушення свідомості

D Зупинка дихання

E Зупинка серця

143

Ви працюєте фельдшером ШМД. Визначте основний симптом у дітей з дискінезією жовчних шляхів.

A *Тупий ниючий біль у правому підребер'ї

B Відрижка кислим

C Нудота і блювання

D Стійкий біль у надчереvній ділянці

E Біль у животі оперізуючого характеру

144

Хлопчик 12-ти років знаходиться на диспансерному обліку з діагнозом "виразкова хвороба шлунка". Хворіє біля 2-х років. Тиждень тому загальний стан дитини погіршився і він був госпіталізований до лікарні. Мати запитує: Яке дієтичне харчування повинна одержувати дитина?

A *Стіл № 1а

- B** Стіл № 7
- C** Стіл № 9
- D** Стіл № 5
- E** Стіл № 15

145

Визначте симптом, який характерний для кашлюка:

- A** *Спазматичний кашель
- B** Плями Бельського- Філатова
- C** Інспіраторна задишка
- D** —Гавкаючий|| кашель
- E** Висип на шкірі

146

Ви працюєте фельдшером ФАПУ. При проведенні проби Манту у дитини 5-ти років виявлена папула 7 мм. Як оцінюється проба Манту?

- A** * Позитивна проба Манту
- B** Негативна пробу Манту
- C** Гіперергічна проба Манту
- D** Сумнівна проба Манту
- E** Віраж туберкулінової проби

147

Виклик до дитини 6 років. Скарги на головний біль та біль у горлі. Температура 38,0 С, у зіві помірне почервоніння і різкий набряк слизової оболонки. Мигдалики різко збільшені, вкриті білувато-сірим нальотом. Голос гугнявий, із рота відчувається неприємний запах. Які

дослідження можуть підтвердити діагноз?

- A** * Мазок із зіву на корінебактерію дифтерії
- B** Мазок з задньої стінки глотки
- C** Змиви з носової частини горла
- D** Збір харкотиння для загального клінічного аналізу
- E** Взяття матеріалу на чашку Петрі

148

Ви працюєте фельдшером ФАПУ. Визначте метод введення туберкуліну при проведенні проби Манту.

- A** * Внутрішньошкірно
- B** Підшкірно
- C** Внутрішньовенно
- D** Перорально
- E** Внутрішньом'язово

149

Дівчина 14 років скаржиться на болі у животі, нудоту, блювання. Об'єктивно: жовтушність шкірних покривів, збільшення печінки, ахолічні випорожнення, сеча кольору —пивал. Який найбільш імовірний діагноз?

- A** * Вірусний гепатит
- B** Гострий холецистит
- C** Гострий гастрит
- D** Інфекційний мононуклеоз
- E** Жовчокам`янна хвороба

150

У дитини 3-х років температура 38,4°C, слинотеча, при прийманні їжі виникає біль. Слизова ротової порожнини гіперемійована, набрякла, на слизовій щік та язика невеликі ерозії з червоною облямівкою. Підщелепні лімфатичні вузли збільшені. Про яке захворювання слід думати?

- A** *Афтозний стоматит
- B** Катаральний стоматит
- C** Кандидозний стоматит
- D** Пліснявку
- E** Лакунарну ангіну

151

Дитина 8 міс., неспокійна, дратівлива, сон порушений, велике тім'ячко закрите. Мати скаржиться на підвищену спрагу, зригування, різке зниження апетиту. З анамнезу

відомо, що мати давала дитині вітамін «Д» протягом 3-х місяців в дозі 1000 МО щодня. Про який стан слід подумати фельдшеру?

- A** *Гіпервітаміноз «Д»
- B** Рахіт, гострий перебіг
- C** Рахіт, підгострий перебіг
- D** Цукровий діабет
- E** Гіпокальціємічний синдром

152

При огляді дитини 4-х міс. фельдшер встановив: стан дитини задовільний, шкірні покриви рожеві, тургор тканин задовільний, підшкірно-жирова клітковина зменшена на животі. Дефіцит маси тіла становить 17%. Який стан розвинувся у дитини?

- A** *Гіпотрофія I-го ступеня
- B** Полігіповітаміноз
- C** Гіпотрофія III-го ступеня
- D** Гіпостатура
- E** Гіпотрофія II-го ступеня

153

У дитини 8-ми міс. Ви спостерігаєте: кволість, на огляд реагує слабким плачем, шкіра зморшувата, з сіруватим відтінком, тургор тканин знижений, толерантність до їжі різко знижена, стілець нестійкий. Дефіцит маси тіла складає 41%. На яке захворювання вказують такі симптоми?

- A** *Гіпотрофію III-го ступеня
- B** Гіпотрофію I-го ступеня
- C** Кишковий токсикоз з ексикозом
- D** Гіпервітаміноз «Д»
- E** Гіпотрофію II-го ступеня

154

Дитині 1,5 роки. Часто хворіє ГРЗ, які мають затяжний перебіг. Перенесла 3 рази бронхопневмонію. Об'єктивно: дитина бліда, пастозна, збільшені лімфатичні вузли, аденоїдні вегетації II ст., компенсований хронічний тонзиліт. Для якого стану характерні такі проблеми?

- A** *Лімфатико-гіпопластичного діатезу
- B** Вродженого гіпотіреозу
- C** Аліментарного ожиріння
- D** Ексудативно-катарального діатезу
- E** Алергічного діатезу

155

На ФАПі внаслідок передчасних стрімких пологів народилася дитина з масою тіла 1900 г. Стан дитини важкий, крик слабкий, монотонний, відзначається вибухання великого та малого тім'ячок, тремор підборіддя, кінцівок, періодично спостерігається судомна готовність. Який стан слід діагностувати?

- A** *Внутрішньочерепна пологова травма
- B** Асфіксія новонародженого
- C** Гіпокальціємічний синдром
- D** Внутрішньоутробне інфікування
- E** Незрілість центральної нервової системи

156

Фельдшером запідозрений у 3-річної дитини ентеробіоз. Яку рекомендацію слід дати матері перед лабораторним дослідженням на цей гельмінтоз?

- A** *Вранці дитину не підмивати
- B** Увечері зробити дитині очисну клізму
- C** Підмити дитину вранці та ввечері
- D** За 2 дні до дослідження виключити з раціону м'ясні продукти
- E** Напередодні дослідження дати дитині проносне

157

Мати звернулася до фельдшера ФАПу для оцінки фізичного розвитку дитини 3-х місяців. Які антропометричні показники необхідно взяти до уваги?

- A** * Визначення маси тіла, зросту, обводу грудної клітини, голови
- B** Визначення маси тіла, обводу плеча

- C* Визначення форми грудної клітини
- D* Визначення форми стопи
- E* Визначення довжини тіла, обводу стегна

158

На патронажі до дитини 8 місяців фельдшер виявив, що дитина не сидить. У якому віці дитина починає самостійно сидіти?

- A* * 6 місяців
- B* 3,5 місяці
- C* 5 місяців
- D* 8 місяців
- E* 10 місяців

159

Які показники нервово-психічного розвитку вперше з'являються у шестимісячної дитини?

- A* * Вміння промовити склади «ба», «ма»
- B* Вміння агукати
- C* Вміння стояти
- D* Вміння тримати голову
- E* Вміння перевертатись зі спини на живіт

160

Мати звернулась до фельдшера ФАПУ з запитанням, які коливання температури тіла протягом доби допустимі для дітей перших трьох тижнів життя?

- A* * 1 – 1,5 °C
- B* 0,5 – 0,7 °C
- C* 0,3 – 0,5 °C
- D* 0,5 – 1,0 °C
- E* 1,5 – 2 °C

161

Назвіть ділянку тіла дитини для визначення тургору м'яких тканин.

- A* * Внутрішня поверхня стегна
- B* Зовнішня поверхня стегна
- C* Тильна поверхні кисті
- D* Зовнішня поверхня плеча
- E* Передня черевна стінка

162

Під час патронажу фельдшер перевіряє стан підшкірно-жирової клітковини у дитини першого року життя. Назвіть ділянку тіла, де в першу чергу спостерігається зменшення підшкірно-жирової клітковини при недогодуванні дитини:

- A* * Живіт
- B* Нижні кінцівки
- C* Спина
- D* Верхні кінцівки
- E* Обличчя

163

При обстеженні учнів у школі виявлено дитину з сильно вираженим грудним кіфозом та згладженим шийним лордозом. Як називається ця форма спини?

- A* * Кругла
- B* Нормальна
- C* Плоска
- D* Плоско-вгнута
- E* Кругло- вгнута

164

Про який стан м'язевого тонусу свідчить відсутність фази розгинання рук у грудних дітей?

- A* * Гіпертонус м'язів
- B* Гіпотонію м'язів
- C* Дистонію м'язів
- D* Атонію м'язів
- E* Нормотонію м'язів

165

Яке дихання при аускультатії легень вислуховується у здорової дитини 6-ти місяців?

- A** * Пуерильне дихання
- B** Везикулярне дихання
- C** Жорстке дихання
- D** Ослаблене дихання
- E** Бронхіальне дихання

166

Назвіть вік дитини, коли відбувається перший фізіологічний перехрест у лейкоцитарній формулі крові:

- A** * 5 днів
- B** 1 день
- C** 5 тижнів
- D** 5 місяців
- E** 5 років

167

При обстеженні дитини фельдшер виявив позитивний симптом Пастернацького. Про захворювання якого органу можна подумати?

- A** * Захворювання нирок
- B** Захворювання печінки
- C** Захворювання шлунку
- D** Захворювання жовчного міхура
- E** Захворювання сечового міхура

168

Дитина фіксує погляд на яскравих предметах, піднімає голівку лежачи на животі, видає незначні звуки (агукає), посміхається, спить близько 20 годин на добу. Якому віку дитини відповідає нервово-психічний розвиток дитини?

- A** * 1-2 місяці
- B** 7-8 місяців
- C** 5-6 місяців
- D** 4-5 місяців
- E** 4-6 місяців

169

Дитині 1 рік. Зроблено пробу Манту. Дані про проведення проби фельдшер записав у «Карту профілактичних щеплень» та журнал реєстрації проби Манту. Де ще потрібно зробити запис?

- A** * В історію розвитку дитини (форма №112о)
- B** В журнал реєстрації БЦЖ
- C** В історію хвороби
- D** В паспорт фельдшерсько-акушерського журналу
- E** В календар профілактичних щеплень

170

Дівчинці 12 р. Скарги на втомлюваність, погіршення апетиту, блідість шкіри і слизових оболонок. Шкіра суха. Волосся ламке. Задишка під час фізичного навантаження. Яке обстеження необхідно зробити в першу чергу?

- A** * Аналіз крові на Hb і колірний показник
- B** Аналіз крові на кількість тромбоцитів
- C** Аналіз крові на кількість лейкоцитів
- D** Аналіз сечі
- E** Копрологічне дослідження калу

171

Під час патронажу дитини 4-х днів фельдшер відмітив легкий ціаноз губ і кінцівок, що посилюється під час плачу. При перкусії серця встановив, що права і верхня межа серця розширена. Під час аускультатії серця вислуховується грубий систолічний шум. До якого лікаря на консультацію необхідно направити дитину?

- A** * Кардіолога
- B** Невропатолога
- C** Окуліста
- D** Пульмонолога

E Психолога

172

Дитині 6 років. Лікується з приводу гострої пневмонії. Яке позалегеневе ускладнення може розвинути?

- A** *Інфекційно-токсичний шок
- B** Пневмоторакс
- C** Гастрит
- D** Абсцес легень
- E** Пієлонефрит

173

У хлопчика 10 років після вживання великої кількості грубої їжі з'явилась нудота, а пізніше блювання, біль у животі, слабкість, млявість. Блювотні маси містять частково перетравлену їжу, температура тіла 36,8°C. Про яке захворювання можна подумати?

- A** *Гострий гастрит
- B** Апендицит
- C** Бронхіт
- D** Г.Р.В.І
- E** Ангіна

174

Виклик фельдшера до дитини 3 років, встановлено попередній діагноз: харчова токсикоінфекція. Які дії фельдшера на догоспітальному етапі?

- A** *Промивання шлунка і кишок
- B** Напоїти гарячим чаєм
- C** Розпочати дезінтоксикаційну терапію
- D** Поставити сифонну клізму
- E** Призначити послаблювальні препарати

175

Визначте препарат, яким проводять специфічну профілактику туберкульозу у дітей:

- A** *Вакцина БЦЖ
- B** Туберкулін
- C** Вакцина АҚДП
- D** Вакцина Пентаксим
- E** Вакцина Пріорікс

176

Яке найчастіше ускладнення виникає у дитини при менінгококцемії?

- A** *Недостатність надниркових залоз
- B** Пневмонія
- C** Міокардит
- D** Пієлонефрит
- E** Гіпотиреоз

177

Фельдшера ШМД викликали до дитини 4 років. У якої після укусу бджоли з'явився різкий біль у ділянці укусу, відчуття жару, брак повітря та запаморочення. При огляді: шкіра бліда, холодний липкий піт на тулубі. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика в даному випадку?

- A** *Видалити жало, негайно підшкірно ввести розчин адреналіну
- B** Видалити жало, госпіталізувати до стаціонару
- C** Видалити жало, прикласти холод
- D** Місце укусу обколоти розчином адреналіну
- E** Ввести внутрішньом'язово розчин кальцію глюконату

178

Фельдшера ШМД викликали до дитини 11 років, яка страждає на цукровий діабет I типу. Після ін'єкції інсуліну дитина не поїла. На другому уроці раптово з'явилось відчуття голоду, тремтіння в кінцівках, шкіра стала вологою. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика у даному випадку?

- A** * Дати дитині цукерку, солодкий чай
- B** Ввести внутрішньовенно 5% розчин альбуміну
- C** Госпіталізувати в дитячу лікарню

D Ввести підшкірно 0,1% розчин адреналіну

E Ввести внутрішньом'язево 25% розчин магнію сульфату

179

Фельдшер ФАПу помітив, що у дитини 5 років підвищилася температура тіла, на шкірі обличчя, тулуба з'явився висип у вигляді рожевих плям, які перетворюються на везикули. Яка найбільш доцільна першочергова протиепідемічна тактика?

A *Ізолювати дитину

B Викликати швидку допомогу

C Госпіталізація до інфекційного відділення

D Залишити в групі до приходу матері

E Обробити висипи діамантовим зеленим

180

У дитини 10 років підвищена втомлюваність, пітливість, зниження апетиту, тривалий субфебрилітет. Шкіпа бліда, лімфатичні вузли збільшені, м'якої консистенції, безболісні. У загальному аналізі крові лейкоцитоз, прискорення ШОЕ. В анамнезі – контакт з хворим на активну форму туберкульозу. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

A *Проведення проби Манту.

B Біохімічне дослідження крові.

C УЗД органів черевної порожнини.

D Взяття крові на стерильність.

E Бактеріологічне дослідження сечі.

181

У дитини 6 міс. на тім'яній ділянці голови з'явилися себорейні лусочки, на шкірі щік явища молочного струпа. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика фельдшера ФАПу в такому випадку?

A *Змащувати елементи стерильною олією за 30 хв. до гігієнічної ванни

B Регулярно проводити дитині масаж, гімнастику

C Включити до раціону дитини ягідні, морквяні, цитрусові соки

D Змащувати лусочки декілька разів на добу діамантовим зеленим

E Давати дитині за призначенням лікаря препарати заліза

182

Хвора дитина 10 років скаржиться на підвищення t до 38°C , біль в колінних суглобах та в ділянці серця. В анамнезі часті ангіни. Об'єктивно фельдшером ФАПу виявлено припухлість і різку болючість, гіперемію шкіри колінних та гомілковоступневих суглобів. Який найбільш імовірний діагноз?

A *Ревматизм

B Геморагічний васкуліт

C Скарлатина

D Лейкоз

E Гломерулонефрит

183

У 6-ти річної дівчинки після прийому ампіоксу гостро розвинулися ознаки медикаментозної алергії у вигляді кропив'янки та набряку Квінке. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика фельдшера ШМД в даному випадку?

A *Глюкокортикостероїди

B Вітаміни

C Діуретики

D Седативні

E Кальцію глюконат

184

У хлопчика 8 років, що хворіє на гемофілію, виникла носова кровотеча. Яка найбільш доцільна лікувальна тактика фельдшера ШМД в даному випадку?

A *Посадити дитину, нахилити голову вперед і притиснути крила носа

B Ввести у відповідну половину носа ватний тампон, змочений 6% розчином перекису водню

C Покласти лежачи з підвищеним головним кінцем

D Покласти міхур з льодом на потилицю

E На перенісся покласти марлеву серветку змочену у холодній воді

185

Дитина 8-ми місяців має ознаки рахіту. Фельдшер ФАПу повинен навчити маму проводити лікувальну ванну. Яка найбільш доцільна лікувальна ванна в даному випадку?

A *З додаванням морської солі.

B З додаванням відвару дубової кори.

C З додаванням відвару ромашки.

D З додаванням крохмалю.

E З додаванням відвару череди.

186

Фельдшер ФАПу повинен провести забір матеріалу з носоглотки на чашку Петрі для виявлення палички Борде-Жангу. При якому найбільш імовірному діагнозі проводиться таке дослідження?

A *При кашлюку

B При туберкульозі

C При дифтерії

D При менінгококовій інфекції

E При скарлатині

187

Під час профілактичного огляду дитини 1-го місяця, мати поскаржилась фельдшеру ФАПу на неспокій, поганий сон, почервоніння та лущення шкіри щік, появу жовтих лусочок на тім'яній ділянці голови, схильність до нестійких випорожнень. Який найбільш імовірний діагноз?

A *Алергічний діатез

B Анемія

C Гіпотрофія

D Рахіт

E Пітниця

188

Дитині 10 років поскаржилась фельдшеру ФАПу на біль у горлі під час ковтання, припухлість шиї, підвищення температури тіла до 39°C. Хворіє три доби. Під час огляду: стан дитини тяжкий, шкіра бліда. Мигдалики майже змикаються, вкриті сіруватим нальотом. На шиї у ділянці нижньої щелепи - м'яка неболюча припухлість, яка спускається до ключиці. Який найбільш імовірний діагноз?

A *Токсична форма дифтерії зіву II ступеня

B Інфекційний моноклеоз

C Дифтерія гортані

D Токсична форма дифтерії зіву III ст.

E Паратонзиліт

189

У дівчинки 5 років спостерігаються: загальна слабкість, головний біль, дратівливість, стійкий свербіж та неприємні відчуття печії в ділянці ануса. При обстеженні фельдшером ФАПу виявлені гострики. Яке дослідження найбільш інформативне для уточнення діагнозу?

A *Зішкріб на ентеробіоз

B Дослідження калу на яйця гельмінтів

C Загальний аналіз сечі

D Загальний аналіз крові

E Копрологічне дослідження.

190

При огляді фельдшер ФАПу дитини 6 років виявив лихоманку, пронос, повторне блювання, головний біль, сонливість, анорексію. Кількість дефекацій 15 разів на добу, випорожнення зі слизом, прожилками крові. Виражені тенезми і біль у животі, сигмовидна кишка палькується у вигляді тонкого тяжа. Який найбільш імовірний діагноз?

A *Дизентерія

B Сальмонельоз

- C* Ешерихіоз
- D* Токсична диспепсія
- E* Холера

191

Дитина 7 місяців, знаходиться на обліку у фельдшера ФАПу з приводу залізодефіцитної анемії. Який найбільш доцільний продукт прикорму ?

- A* *М'ясний фарш
- B* Кефір
- C* Сир
- D* Манна каша
- E* Риба

192

Ви фельдшер ФАПу проводите бесіду з матір'ю новонародженої дитини. Яка нормальна температура у новонародженої дитини?

- A* *36,5-37,5 °C
- B* 36,1-36,4 °C
- C* 30,0-32,0 °C
- D* 33,0-35,0 °C
- E* 32,2-34,5 °C

193

Ви фельдшер ФАПу і проводите патронаж новонародженої дитини. Вказати оптимальну температуру в кімнаті спільного перебування матері та новонародженої дитини:

- A* *25 °C
- B* 18 °C
- C* 23 °C
- D* 20 °C *E* 30 °C

194

Ви фельдшер ФАПу. Відбулися пологи вдома Після народження дитини спостерігають жовтяничне забарвлення навколишньооплодних вод і пупкового канатика, жовтяниця у дитини швидко наростає. У матері резус-фактор(-), у дитини (+). Який попередній діагноз можна поставити?

- A* *Жовтянична форма ГХН.
- B* Анемічна форма ГХН.
- C* набрякова форма ГХН.
- D* Сепсис новонароджених.
- E* Асфіксія новонароджених.

195

Фельдшер оглянув новонароджену дитину після пологів вдома. При огляді новонародженої дитини на першій хвилині життя ЧСС становить менше 100 ударів за хвилину, дихання нерегулярне, акроціаноз, рефлекс слабкі, тонус м'язів знижений. Який ймовірний діагноз може поставити фельдшер?

- A* *Асфіксія новонароджених.
- B* Колапс.
- C* Пологова травма.
- D* Гемолітична хвороба новонароджених.
- E* Пневмонія.

196

Виклик фельдшера до дитини 12-ти років. Після ін'єкції інсуліну у дванадцятирічної дитини змінився стан. Шкіра стала блідою, вкрилась холодним липким потом, Раптово почалися судоми. Надайте невідкладну допомогу.

- A* *Ввести 20% розчин глюкози внутрішньовенно струминно до виходу з коми.
- B* Ввести інсулін 0,1-0,2 Од на 1кг маси тіла струминно внутрішньовенно.
- C* Ввести ізотонічний розчин натрію хлориду 10 мл на 1кг маси краплинно.
- D* Ввести краплинно 4% розчин бікарбонату натрію 10 мл на 1кг маси.
- E* Ввести реополіглюкін 10мл на 1кг маси крапельно.

197

Виклик фельдшера до дитини 2-х років . Скарги на появу судом. Надайте допомогу.

A *Ввести 0,5% розчин седуксену 0,5 мг на 1кг маси тіла.

B Ввести 50% розчин аналгіну 0,1 мл на 1 рік життя

C Ввести 40% розчин глюкози 5 мл на 1 кг маси тіла.

D Ввести 1% розчин дімедролу 1 мг на 1 кг маси тіла.

E Ввести розчин преднізолону 1 мг на 1кг маси тіла.

198

Під час проведення фельдшером профілактичного щеплення проти дифтерії, коклюшу, правця у дитини запаморочилася голова, з'явилося тиснення за грудиною, шкіра вкрилася холодним потом. Яким препаратом треба обколоти місце введення вакцини?

A *0,1% розчин адреналіну.

B 50% розчин аналгіну.

C Розчин преднізолону.

D 1% розчин дімедролу.

E 20% розчин оксібутірату натрію.

199

На ФАП для профілактичного огляду принесли дитину 1 року життя. Профілактичні щеплення проводились згідно календарного плану. Дитина здорова. Вкажіть, що необхідно призначити?

A *Пробу Манту

B Ревакцинацію проти дифтерії

C Вакцинацію проти кору

D Ревакцинацію проти поліомієліту

E Вакцинацію проти епіпаротиту

200

Фельдшер у дитини 3-х місячного віку виявив такі симптоми: підвищену пітливість, облісіння потилиці, помірний краніотабес. Для якого періоду рахіту вони характерні?

A *Початковий

B Розпалу

C Залишкових явищ

D Реконвалесценції

E Термінального

201

На профілактичному огляді ви вимірюєте тиск 5 річній дитині. За якими формулами ви визначите систолічний та діастолічний тиск.

A * $90+2n$ $60+n$

B $70+2n$ $50+n$

C $100+2n$ $80+n$

D $60+2n$ $40+n$

E $90+2n$ $50+n$

202

Мати на прийомі на ФАПі з 6 місячною дитиною запитала фельдшера: «З якою метою дають овочеве пюре?». Ви поясните:

A *Для корекції мінеральних солей

B Для корекції вітамінів

C Для корекції білків

D Для корекції вуглеводів

E Для корекції жирів

203

Яке співвідношення між білками, жирами, вуглеводами у добовому раціоні дитини I півріччя життя на природному вигодовуванні:

A *1 : 3 : 6

B 1 : 2,5 : 4

C 1 : 1 : 4

D 2 : 6 : 9

E 3 : 1 : 6

204

Фельдшер прийшов на виклик до дитини 5 днів. Мати стурбована появою на пелюшці червонуватого забарвлення від сечі. Загальний стан дитини не порушений. Чим це пояснюється?

- A** *Наявністю сечокиислого інфаркту нирок
- B** Наявністю статевої кризи
- C** Наявністю захворювання нирок
- D** Наявністю транзиторної лихоманки
- E** Наявністю дизбактеріозу

205

У дитини, хворої на парагрип, з'явилися —гавкаючий кашель, захриплість голосу, ціаноз носо-губного трикутника. Для якого ускладнення характерні ці симптоми? **A**

- *Стенозуючий ларингіт
- B** Бронхіт
- C** Пневмонія
- D** Риніт
- E** Фарингіт

206

Мале тім'ячко у новонароджених дітей розташовано між кістками:

- A** * Потиличними та тім'яними
- B** Лобними та тім'яними
- C** Лобними
- D** Скроневими та тім'яними
- E** Лобними та скроневими

207

Дитині 10 днів. Мати скаржиться на періодичне зригування після годування груддю. Яка анатомо-фізіологічна особливість сприяє цьому стану?

- A** * Слабкість кардіального сфінктера шлунка
- B** Підвищена секреторна активність шлунка
- C** Знижена секреторна активність шлунка
- D** Недостатній розвиток пілоричного сфінктера шлунка
- E** Підвищена перистальтика шлунка

208

Коли повинно бути перше прикладання новонародженої здорової дитини до грудей в пологовому будинку?

- A** * Протягом першої години після народження
- B** Через 2,5 год
- C** Через 1,5 год
- D** Через 3 год
- E** Через 3,5 год

209

Дитині 6 місяців. Здорова. Знаходиться на природному вигодовуванні. В якому віці і який прикорм треба ввести дитині?

- A** * 3 6 місяців, овочеve пюре
- B** 3 5 місяців, сік фруктовий
- C** 3 4 місяців, овочеve пюре
- D** 3 6-ти місяців, кефір
- E** 3 6-ти місяців, 20% манна каша

210

Дитині 9 місяців. Знаходиться на грудному вигодовуванні, прикорм введений своєчасно. Мати запитує: «До якого віку бажано годувати груддю?»

- A** * До 2-х років
- B** До 1 року
- C** До 9 місяців
- D** До 6 місяців
- E** До 7 місяців

211

Дитина 7 років хворіє бронхіальною астмою. Які зміни характеру дихання можна виявити під час обстеження?

- A** * Експіраторну задишку
- B** Брадіпное
- C** Тахіпное
- D** Інспіраторну задишку
- E** Апноє

212

Дитина 8-ми місяців має ознаки рахіту. Яку з нижче перерахованих ванн треба обрати?

- A** * З додаванням морської солі
- B** З додаванням відвару ромашки
- C** З додаванням відвару дубової кори
- D** З додаванням крохмалю
- E** З додаванням відвару череди

213

Дитина 6 років хворіє на кір. Вкажіть ускладнення, які найчастіше трапляються при кору:

- A** * Пневмонія
- B** Ураження печінки
- C** Ангіна
- D** Міокардит
- E** Орхіт

214

Вкажіть максимальний інкубаційний період при краснусі.

- A** * 21 день
- B** 14 днів
- C** 7 днів
- D** 5 днів
- E** 2 дні

215

Назвіть термін проведення II ревакцинації поліомієлітною вакциною.

- A** * 6 років
- B** 18 місяців
- C** 8 місяців
- D** 2 роки
- E** 14 років

216

При обстеженні дівчинки 9 років спостерігаються: головний біль, біль у горлі під час ковтання, температура – 38,6°C. На шкірі дрібнокраплинний, яскраво-рожевий висип на гіперемійованому тлі шкіри, крім носо-губного трикутника; язик яскраво-червоний, сосочки гіпертрофовані. Слизові оболонки передніх піднебінних дужок м'якого піднебіння, язичка яскраво гіперемійована. Вкажіть найхарактернішу наявну проблему пацієнта, яка буде виявлена з боку шкіри при обстеженні через тиждень від появи шкірних симптомів.

- A** * Луцнення
- B** Везикули
- C** Плями
- D** Висип
- E** Пігментація

217

Який характерний симптом спостерігають на 3 день висипання у разі захворювання на вітряну віспу?

- A** * Поліморфізм висипу
- B** Плями Бельського-Філатова-Коплека
- C** Симптом Філатова
- D** Палаючий зів
- E** Афонія голосу

218

Дитині 14 років, хворіє на епідемічний паротит 5 добу. Вранці знову підвищилася температура тіла. Скарги на біль в ділянці калитки і яєчка, біль під час сечовипускання. Вкажіть найбільш ймовірний діагноз.

A * Орхіт

B Гострий пієлонефрит

C Гострий цистит

D Гостра затримка сечі

E Гідронефроз

219

У новонародженої діагностовано пухирчатку. Які заходи слід запланувати для запобігання поширенню інфекції після госпіталізації?

A * Ізоляція дитини, виділення для догляду за нею окремого персоналу

B Карантин на 21 день

C Ізолувати дитину не потрібно

D Провести щеплення проти пухирчатки

E Вологе прибирання без дезінфікуючих засобів

220

Фельдшер ФАПУ спілкується з мамою дитини 6 місяців з діагнозом «кашлюк» з приводу того, що жінка відмовляється від госпіталізації у інфекційне відділення і пояснює, що клінічний перебіг кашлюку у немовлят часто ускладнюється:

A * апное (зупинка дихання)

B нейротоксикозом

C шлунковими кровотечами

D гіпертермічним синдромом

E судомми

221

У фельдшера ФАПУ знаходиться на диспансерному обліку дитина 5 років з діагнозом «пієлонефрит». Які додаткові лабораторні дослідження необхідно провести для контролю наявної ремісії даного захворювання:

A * пробу за Нечипоренко

B цистоскопію **C** аналіз крові на стерильність

D обзорну рентгенографію органів черевної порожнини

E аналіз крові на ниркові проби

222

До фельдшера ФАПУ звернулася мати дитини 10 місяців з діагнозом: «рахіт, період розпалу, гострий перебіг», якій педіатр призначив вітамін Д. Мати запитує, як довго потрібно давати лікувальну дозу вітаміну Д:

A * протягом 35 – 40 діб

B протягом 40 – 60 діб

C протягом 5 – 10 діб

D протягом 10 – 14 діб

E протягом 2 – 5 діб

223

Фельдшер ФАПУ оглядає дитину 10 років, яка стоїть на диспансерному обліку з діагнозом: «дискінезія жовчовивідних шляхів, гіпотонічна – гіпокінетична форма». Під час проведення обстеження ознакою загострення хвороби будуть скарги на:

A * відчуття важкості у правому підребер'ї

B біль в животі натще

C постійну нудоту

D підвищення апетиту

E відригування тухлим

224

Фельдшер ФАПУ спілкується з батьками дитини, хворої на гемофілію, і на їх запитання надає пояснення, що розвиток цього захворювання пов'язаний з:

A * нестачею факторів згортання крові

- B** порушенням тонуусу дрібних кровоносних судин
- C** зниженням утворення тромбоцитів
- D** швидким руйнуванням еритроцитів
- E** надлишком тромбоцитів у кров'яному руслі

225

Фельдшер ФАПУ аналізує загальний аналіз крові дитини із залізодефіцитною анемією. Який з показників крові вказує на розвиток тільки такого виду анемії:

- A** *гіпохромія еритроцитів
- B** зниження гемоглобіну
- C** підвищення кольорового показника
- D** зміна розміру і форми еритроцитів
- E** збільшення ШОЄ

226

Фельдшер ФАПУ оглядає дитину 2 років з підозрою на травму коліна. Мати хлопчика скаржиться на появу великих сінців при незначних травмах дитини останнім часом. При огляді коліна: ознаки крововиливу в суглоб. Про яке захворювання слід подумати:

- A** *гемофілія
- B** ревматоїдний артрит
- C** тромбоцитопенічна пурпура
- D** геморагічний васкуліт
- E** лейкоз

227

Фельдшер ФАПУ проводить огляд новонародженої дитини під час першого патронажу вдома. Хлопчику 5 днів. Народився доношеним від здорових батьків. Що повинно привернути увагу фельдшера, як прояв патології:

- A** *постійне випинання тім'ячка
- B** гіпертонус згиначів рук
- C** гіпертонус згиначів ніг
- D** маса м'язів розвинута слабо
- E** активний смоктальний рефлекс

228

Фельдшер ФАПУ наглядає дитину першого місяця життя. При плановому огляді потрібно визначити середнє значення приросту маси тіла дитини на першому місяці життя:

- A** *600г
- B** 900 г
- C** 750 г
- D** 250 г
- E** 800 г

229

Фельдшер ФАПУ оглядає дитину 3 місяців, яка вчасно не була щеплена вакциною БЦЖ за наявними протипоказаннями. На даний час дівчинка здорова. Визначитеся з необхідністю щеплення дитини:

- A** *провести щеплення дитини після ретельного обстеження і негативної проби Манту
- B** негайно провести щеплення після ретельного обстеження дитини
- C** провести щеплення після наступної планової вакцинації за календарем
- D** провести щеплення дитини після ретельного обстеження і позитивної проби Манту
- E** відкласти щеплення до виповнення дитині 7 років

230

Яку формулу використає фельдшер ФАПУ для розрахунку зросту дитини до 4 років при оцінці її фізичного розвитку (п– вік дитини):

- A** * $100 - 8 \times (4 - п)$
- B** $70 \times п$
- C** $80 \times п$
- D** $100 + 6 \times (п - 4)$
- E** $10 + 2 \times п$

231

Фельдшер ФАПУ доглядає дитину 5 років в перший день захворювання на скарлатину. При огляді: температура 38,8°C, блідість носо-губного трикутника. Які клінічні прояви можна ще виявити:

- A** *«палаючий» зів, дрібно точковий висип на тлі гіперемійованої шкіри
- B** геморагічний висип зірчастої форми, судоми
- C** плями Філатова – Копліка на слизовій оболонці, гнійна нежить
- D** везикульозний висип на волосистій частині голови, схильність до носових кровотеч
- E** пустульозний висип на гіперемійованій шкірі, гепатоспленомегалія

232

Фельдшер ФАПУ оглядає хлопчика 12 років. Мати пояснює, що дитина скаржиться на біль в правому підребір'ї, жовтяничне забарвлення шкіри, темний колір сечі, знебарвлення випорожнень, швидку втомлюваність. При огляді: печінка збільшена, при пальпації рухлива, помірно болісна. Мати повідомила, що 3 місяці тому дитині видалили зуб. Про яке захворювання слід подумати:

- A** *вірусний гепатит В
- B** гострий холецистит
- C** дискінезія жовчовивідних шляхів
- D** залізодефіцитна анемія
- E** лейкоз

233

Фельдшер будинку маляти виконує щеплення. Назвіть термін початку вакцинації проти поліомієліту:

- A** *3 місяці
- B** 4 місяці
- C** 5 місяців
- D** 6 місяців
- E** 1 рік

234

Фельдшер ФАПУ наглядає дитину 3 місяців, яка народилася доношеною. Визначте, що нового з'являється в поведінці дітей у цьому віці:

- A** *стежить очима і повертає голівку за рухами яскравим предметом
- B** вмie самостійно стояти
- C** фіксує погляд на предметах, але не стежить за ними
- D** вмie відрізнити солодкі розчини від кислих
- E** пробує самостійно сидати

235

У недоношеної дитини з масою тіла при народженні 1900 г під час годування виник приступ апное, але ціанозу і брадикардії не спостерігається. Що буде першочерговим у наданні невідкладної допомоги дитині?

- A** *Тактильна стимуляція вздовж спини
- B** Негайно розпочати ШВЛ
- C** Розпочати зігрівання
- D** Перевірити рівень глюкози в крові
- E** Постійно підтримувати правильне положення

236

У 6-місячного малюка при огляді спостерігається ціаноз губ, задишка під час годування і плачу. Додаткове обстеження в кардіологічному відділенні підтвердило діагноз вродженої вади серця. В бесіді з мамою фельдшер визначає, що критичний період формування вади серця протягом вагітності становить:

- A** *2-8 тиждень
- B** Перші 2 тижні
- C** Після 12 тижнів
- D** 18-20 тижнів
- E** 30-32 тижні

237

При огляді фельдшером дитини 6 міс на волосистій частині голівки, бровах виявлені лусочки лимонно-жовтого кольору з масними кірочками. Як пояснює фельдшер цей симптом?

- A** *Гнейс
- B** Молочний струп
- C** Попрілості
- D** Пітниця
- E** Строфулюс

238

Дитина народилась недоношеною з масою тіла 1950 г. Плануючи диспансерне спостереження, фельдшер проводить профілактику рахіту. Визначити початок та добову дозу призначення вітаміну D3.

- A** *3 10-14-го дня по 500-1000 МО
- B** 3 10-20-го дня по 1000-2000 МО
- C** 3 10-го дня по 2000 МО
- D** На 2-му тижні по 4000 МО
- E** На 2-му місяці життя по 500 МО

239

У дитини 3-х місяців ви встановили діагноз гіпотрофія I ст. До комплексного лікування з метою нормалізації кишкової мікрофлори слід додати препарати:

- A** *симбітер, лактобактерин
- B** супрастин, діазолін
- C** фенобарбітал, седуксен
- D** плазму, альбумін
- E** метіонін, аргінін

240

Фельдшера ФАПУ викликали до дитини 7 років. Скарги на підвищення температури тіла до 39,0 °С, головний біль з переважною локалізацією в ділянці чола та очних яблук, ломоту по всьому тілу, біль у м'язах, суглобах. Хворіє 2-й день. Спостерігається зерниста гіперемія зіву, закладання носа, покашлювання. Клінічні симптоми характерні для:

- A** *грипу
- B** гострого бронхіту
- C** гострої пневмонії
- D** ларинготрахеїту
- E** назофарингіту

241

На прийомі ви вимірюєте АТ дівчинці 15 років з вегетосудинною дистонією. Який показник систолічного тиску буде нормальним для цього віку:

- A** 110-120 мм рт. ст.
- B** 60-80 мм рт. ст.
- C** 70-80 мм рт. ст.
- D** 130-140 мм рт. ст.
- E** 90-100 мм рт. ст.

242

Дитину 2 міс. привезли до бабусі. До цього часу годувалась грудним молоком. За сімейними обставинами мати буде відсутня протягом 1 місяця. Які рекомендації щодо годування дитини може надати фельдшер:

- A** *адаптовані суміші
- B** коров'яче молоко
- C** 5% манна каша
- D** овочеve пюре
- E** фруктове пюре

243

На диспансерному обліку знаходиться дитина 10 р. з діагнозом хронічний тонзиліт. Після чергового загострення у дівчинки з'явилося посіпування м'язів обличчя,

порушення письма, похитування при ходьбі, нечітка мова. Дитина стала плаксивою, дратівливою. На яке обстеження слід направити дитину?

- A** *біохімічний аналіз крові на ревмопроби
- B** аналіз крові на рівень глюкози
- C** аналіз крові на загальний білірубін
- D** аналіз крові на холестерин
- E** аналіз крові на АЛТ, АСТ

244

На прийомі у фельдшера ФАПу дитина одного року, маса тіла її 10 200 г, ріст 74 см. Нервово-психічний розвиток відповідає вікові. Скарг у матері немає. Дитина запланована на щеплення проти кору, краснухи, епідемічного паротиту. Яку вакцину використовуєте для щеплення?

- A** *пріорикс
- B** енджерикс
- C** пентаксим
- D** АКДП
- E** вакцина БЦЖ

245

На диспансерному обліку перебуває дитина 8 років з діагнозом бронхіальна астма. Хворіє з 2-річного віку, напади хвороби спостерігаються часто. Які симптоми дають змогу фельдшеру діагностувати у дитини хронічну дихальну недостатність:

- A** *кінцеві фаланги у вигляді барабаних паличок і нігті у вигляді годинникових скелець
- B** «серцевий горб»
- C** деформація груднини за типом «курячі груди»
- D** геморагії на шкірі
- E** збільшенні периферійних лімфовузлів

246

Хлопчик 5 років, місяць тому перехворів на епідемічний паротит. Скарги матері на те, що дитина почала багато пити рідини, підвищився апетит, збільшилось сечовиділення, буває нічне нетримання сечі. При огляді: шкіра і слизові сухі, на щоках рум'янець, язик обкладений білим налетом. Аускультативно: тони серця ослаблені, ЧСС – 110/1 хв. Печінка біля краю реберної дуги. Яке захворювання можна запідозрити в першу чергу?

- A** *цукровий діабет
- B** гастродуоденіт
- C** гострий гепатит
- D** гострий гломерулонефрит
- E** гострий пієлонефрит

247

У дитини 8 років, важкий загальний стан, спостерігається системне ураження лімфатичних вузлів, збільшені печінка і селезінка. Які найбільш інформативні показники аналізу крові?

- A** *лейкемічний провал
- B** лейкоцитоз
- C** пойкилоцитоз
- D** зсув лейкоцитарної формули вліво
- E** еозинофілія

248

У дитини, 12 років, важкий загальний стан. Спостерігається інспіраторна задишка, кашель поступово втрачає гучність до повної афонії голосу. Наявні симптоми характерні для:

- A** *дифтерії гортані
- B** гострого стенозуючого ларинготрахеїту
- C** вогнищевої пневмонії
- D** обструктивного бронхіту
- E** набряку Квінке

249

У дитини, 8 років, у перший день захворювання спостерігається симптом Філатова. Які клінічні ознаки можна ще виявити?

- A** *палаючий зів, дрібно точковий висип на гіперемійованій шкірі
- B** елементи висипу зірчастої форми
- C** плями Філатова-Бельського-Копліка на слизовій оболонці рота
- D** везикули, наповнені серозною рідиною на шкірі тулуба та волосистій частині голови
- E** пустули з гнійним вмістом

250

Під час патронажу до новонародженої дитини фельдшер виявив на шкірі сідниць, стегон, природних складок дрібні поверхневі пухирці до 2-3 мм в діаметрі з каламутним вмістом. Загальний стан задовільний. Встановіть попередній діагноз.

- A** *Везикулопустульоз
- B** Псевдофурункульоз
- C** Пухирчатка новонароджених
- D** Ексфоліативний дерматит Ріттера
- E** Попрілості

251

У дитини 12 років гостро розвинулася набряк по всьому тілу, систолічний АТ 140 мм рт. ст., діурез різко зменшився. Які показники аналізу сечі будуть характерними для такого стану?

- A** * Макрогематурія, протеїнурія
- B** Піурія, бактеріурія
- C** Оксалатурія, ацетонурія
- D** Глюкозурія, холестеринурія
- E** Піурія, альбумінурія

252

Батьки, дитина яких народилась передчасно з масою 1600 г, цікавляться коли вона досягне рівня фізичного розвитку однолітків, що народилися доношеними?

- A** *У 2-3 роки
- B** В 1 рік
- C** В 4 роки
- D** В 5-6 років
- E** В 6-7 років

253

Виклик фельдшера ФАПу до дитини 4х років, яка хворіє 5й день. Скарги на кашель, світлобоязнь, слезотечу, t 38,2 °С. На слизовій оболонці щік білі крапкові плями, на піднебінні червоні плями. Який висип з'явиться у дитини при подальшому розвитку хвороби?

- A** *Поетапний плямисто-папульозний
- B** Пустульозний
- C** Поліморфний
- D** Геморагічний
- E** Одномоментний плямисто-папульозний

254

В школі фельдшером ФАПу діагностовано скарлатину. Дитина госпіталізована. Накладений карантин. Контактні обстежені, на них заведені листи спостереження. Скільки днів триватиме карантин?

- A** *7 днів
- B** 21 день
- C** 14 днів
- D** 10 днів
- E** 3 дні

255

Перша допомога фельдшером ФАПу при апное у малюка хворого на кашлюк починається з:

- A** *звільнення ротової порожнини від харкотиння та слизу

- B** Введення спазмолітичних препаратів
- C** Проведення закритого масажу серця
- D** Проведення інгаляцій з протеолітичними ферментами
- E** Штучна вентиляція легень методом «рот в рот»

256

Де спостерігається стоншення підшкірно-жирової клітковини в разі гіпотрофії II ступеня?

- A** *На тулубі та кінцівках
- B** На животі
- C** На тулубі, кінцівках, обличчі
- D** Тільки на кінцівках
- E** Тільки на тулубі